

## Неопределенный интеграл

ДЗ: 1635, 1643, 1646 (вспомнить сумму кубов), 1650, 1656, 1659, 1667, 1672.

ДЗ: найти  $\operatorname{th}^{-1}(y)$ ,  $\operatorname{cth}^{-1}(y)$  и посчитать их производные.

**Задача 1. (Д1635)**

$$\int \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}} dx$$

□

$$\begin{aligned} \int \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}} dx &= \int \frac{1-3x+3x^2-x^3}{x\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} - 3\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} + 3x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{5}{3}} dx = \\ &= -3\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{9}{2}x^{\frac{2}{3}} + \frac{9}{5}x^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{10}x^{\frac{8}{3}} + C = -\frac{3}{\sqrt[3]{x}} \left(1 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{8}x^3\right) + C \end{aligned}$$

■

**Задача 2. (Д1643)**

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^4-1}} dx$$

□ Поскольку деление на корень из  $x^4 - 1$ , то промежуток подразумевается  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ :

$$\begin{aligned} \sqrt{x^4-1} &= \sqrt{x^2-1} \cdot \sqrt{x^2+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \int \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^4-1}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx - \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \\ &= \ln \left| x + \sqrt{x^2-1} \right| - \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right| + C = \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2-1}}{x + \sqrt{x^2+1}} \right| + C \end{aligned}$$

■

**Задача 3. (Д1646)**

$$\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx$$

□

$$\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx = \int \frac{e^x + 1}{e^x + 1} \cdot (e^{2x} - e^x + 1) dx = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x + x + C$$

■

**Задача 4. (Д1650)**

$$\int \operatorname{tg}^2 x dx$$

□

$$\int \operatorname{tg}^2 x dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx - x + C = \operatorname{tg} x - x + C$$

■

**Задача 5. (Д1656)**

$$\int (2x+3)^{10} dx$$

□

$$\int (2x+3)^{10} dx = \int \frac{1}{2} (2x+3)^{10} d(2x+3) = \frac{1}{22} y^{11} + C = \frac{1}{22} (2x+3)^{11} + C$$

■

**Задача 6. (Д1659)**

$$\int \frac{dx}{(5x-2)^{\frac{5}{2}}}$$

□

$$\int \frac{dx}{(5x-2)^{\frac{5}{2}}} = \int \frac{1}{5} \frac{dy}{y^{\frac{5}{2}}} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot y^{-\frac{3}{2}} + C = -\frac{2}{15} (5x-2)^{-\frac{3}{2}} + C$$

■

**Задача 7. (Д1667)**

$$\int \frac{dx}{\sin^2 \left( 2x + \frac{\pi}{4} \right)}$$

□

$$\int \frac{dx}{\sin^2 \left( 2x + \frac{\pi}{4} \right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dy}{\sin^2(y)} = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg} y + C = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg} \left( 2x + \frac{\pi}{4} \right) + C$$

■

**Задача 8. (Д1672)**

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 \frac{x}{2}}$$

□

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 \left( \frac{x}{2} \right)} = 2 \int \frac{dy}{\operatorname{ch}^2 y} = 2 \operatorname{th} y + C = 2 \operatorname{th} \left( \frac{x}{2} \right) + C$$

■

Найдем обратную для  $\operatorname{th} x$  функцию. Заметим, что  $\operatorname{th} x \in (-1, 1)$ :

$$y = \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \Rightarrow y(e^x + e^{-x}) = e^x - e^{-x} \Rightarrow y(e^{2x} + 1) = e^{2x} - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ye^{2x} - e^{2x} = -1 - y \Rightarrow e^{2x} = -\frac{1+y}{y-1} = \frac{1+y}{1-y} \Rightarrow x = \operatorname{th}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1+y}{1-y} \right), |y| < 1$$

Аналогично для  $\operatorname{cth} x$ . Заметим, что  $\operatorname{cth} x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ :

$$y(e^{2x} - 1) = e^{2x} + 1 \Rightarrow e^{2x} = \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow x = \operatorname{cth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{y+1}{y-1} \right), |y| > 1$$

Найдем их производные. Для аретангенса:

$$(\operatorname{th}^{-1}(x))' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1+y}{1-y}} \cdot \frac{(1-y) + (1+y)}{(1-y)^2} = \frac{1}{1-y^2}$$

Для ареакотангенса:

$$(\operatorname{cth}^{-1}(x))' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{y+1}{y-1}} \cdot \frac{(y-1) - (y+1)}{(y-1)^2} = -\frac{1}{y^2-1} = \frac{1}{1-y^2}$$