

Интегрирование трансцендентных функций

Задача 1. (Д2066)

$$\int P(x)e^{ax} dx$$

□ Поскольку функции разнородные, то будем интегрировать по частям.

$$e^{ax} = \left(\frac{e^{ax}}{a}\right)' \Rightarrow \int P(x)e^{ax} dx = e^{ax} \cdot \frac{P(x)}{a} - \frac{1}{a} \int P'(x)e^{ax} dx$$

То есть, мы получили шаг индукции. Тогда можем получить общую формулу:

$$\int P(x)e^{ax} dx = e^{ax} \cdot \left(\frac{P(x)}{a} - \frac{P'(x)}{a^2} + \frac{P''(x)}{a^3} - \dots + \frac{(-1)^n P^{(n)}(x)}{a^{n+1}} \right) + C$$

■

Нам удобно интегрировать функции, зависящие от действительной переменной, но принимающая значения в комплексной плоскости:

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, F(x) = f(x) + ig(x) \Rightarrow F'(x) = f'(x) + ig'(x)$$

$$\int F(x)dx = \int f(x)dx + i \int g(x)dx$$

Мы проверяли следующее:

$$\begin{aligned} e^{(\alpha+i\beta)x} &= e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \Rightarrow \\ \Rightarrow \operatorname{Re} (e^{(\alpha+i\beta)x}) &= e^{\alpha x} \cos \beta x, \operatorname{Im} (e^{(\alpha+i\beta)x}) = e^{\alpha x} \sin \beta x \end{aligned}$$

Посчитаем производную у каждой части экспоненты:

$$(\operatorname{Re} (e^{(\alpha+i\beta)x}))' = e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x),$$

$$(\operatorname{Im} (e^{(\alpha+i\beta)x}))' = e^{\alpha x} (\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x)$$

тогда:

$$(e^{(\alpha+i\beta)x})' = e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) + ie^{\alpha x} (\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) = (\alpha + i\beta) \cdot e^{(\alpha+i\beta)x}$$

Таким образом, для интеграла эти же правила будут работать \Rightarrow формула из задачи 2066 будет работать и тогда, когда число a - комплексное.

Задача 2. (Д2067) (только одна часть)

$$\int P(x) \cos(ax) dx$$

□ Снова будем интегрировать по частям:

$$\int P(x) \cos(ax) dx = \sin(ax) \cdot \frac{P(x)}{a} - \frac{1}{a} \int P'(x) \cdot \sin(ax) dx$$

Проинтегрируем по частям ещё раз:

$$\sin(ax) \cdot \frac{P(x)}{a} - \frac{1}{a} \int P'(x) \cdot \sin(ax) dx = \sin(ax) \cdot \frac{P(x)}{a} + \cos(ax) \cdot \frac{P'(x)}{a^2} - \frac{1}{a^2} \int P''(x) \cos(ax) dx$$

Таким образом, мы получили шаг индукции и формула итоговая будет выглядеть так:

$$\begin{aligned} \int P(x) \cos(ax) dx &= \frac{\sin(ax)}{a} \cdot \left(P(x) - \frac{P''(x)}{a^2} + \frac{P^{(4)}(x)}{a^4} - \dots + (-1)^k \frac{P^{(2k)}(x)}{a^{2k}} \right) + \\ &+ \frac{\cos(ax)}{a^2} \left(P'(x) - \frac{P'''(x)}{a^2} + \dots + \frac{(-1)^m P^{(2m+1)}(x)}{a^{2m}} \right) + C \end{aligned}$$

где $k = \left[\frac{n}{2} \right]$ и $m = \left[\frac{n-1}{2} \right]$ - такое, чтобы $2m+1 < n$. Также заметим, что:

$$\int P(x) \cos(ax) dx = \operatorname{Re} \left(\int P(x) e^{iax} dx \right)$$

поскольку косинус можно связать с комплексными экспонентами следующим образом:

$$\cos(ax) = \operatorname{Re}(e^{iax}) \vee \cos(ax) = \frac{1}{2}(e^{iax} + e^{-iax})$$

Таким образом, можно взять разложение экспоненты и взять действительную часть:

$$\begin{aligned} \int P(x) e^{iax} dx &= e^{iax} \cdot \left(\frac{P(x)}{ia} + \frac{P'(x)}{a^2} - \frac{P''(x)}{ia^3} - \dots + \frac{(-1)^n P^{(n)}(x)}{(ia)^{n+1}} \right) + C = \\ &= (\cos(ax) + i \sin(ax)) \cdot \left(\frac{P(x)}{ia} + \frac{P'(x)}{a^2} - \frac{P''(x)}{ia^3} - \dots + \frac{(-1)^n P^{(n)}(x)}{(ia)^{n+1}} \right) + C \end{aligned}$$

■

Применим результаты теоретических задач, решенных выше.

Задача 3. (Д2068)

$$\int x^3 e^{3x} dx$$

□

$$\int x^3 e^{3x} dx = e^{3x} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{3^2} + \frac{6x}{3^3} - \frac{6}{3^4} \right) + C$$

■

Задача 4. (Д2076)

$$\int x e^x \sin x dx$$

□ Заметим, что $e^x \sin x = \operatorname{Im}(e^x(\cos x + i \sin x)) = \operatorname{Im}(e^{(1+i)x})$, следовательно:

$$\int x e^x \sin x dx = \operatorname{Im} \left(\int x e^{(1+i)x} dx \right) = \operatorname{Im} \left(e^{(1+i)x} \left(\frac{x}{1+i} - \frac{1}{(1+i)^2} \right) + C \right)$$

$$\begin{aligned}
e^{(1+i)x} \left(\frac{x}{1+i} - \frac{1}{(1+i)^2} \right) &= (e^x \cos x + ie^x \sin x) \cdot \left(\frac{x(1-i)}{2} - \frac{(1-i)^2}{4} \right) = \\
&= (e^x \cos x + ie^x \sin x) \cdot \left(\frac{x-xi}{2} - \frac{1-2i-1}{4} \right) = (e^x \cos x + ie^x \sin x) \cdot \left(\frac{x-xi}{2} + \frac{i}{2} \right) = \\
&= e^x \cos x \cdot \frac{x}{2} + e^x \sin x \cdot \frac{(x-1)}{2} + i \cdot \left(e^x \cos x \cdot \frac{(1-x)}{2} + e^x \sin x \cdot \frac{x}{2} \right) \Rightarrow \\
&\Rightarrow \operatorname{Im} \left(\int x e^{(1+i)x} dx \right) = e^x \cos x \cdot \frac{(1-x)}{2} + e^x \sin x \cdot \frac{x}{2} + C
\end{aligned}$$

■

Rm: 1. Заметим, что задачу можно было решить только методом интегрирования по частям, но это было бы сложнее.

Короткое напоминание про комплексные числа

$$z = x + iy = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) = r \cdot e^{i\varphi}, \operatorname{Re}(z) = x, \operatorname{Im}(z) = y$$




Рис. 1: Визуализация комплексного числа.

$$\begin{aligned}
e^{\alpha+i\beta} &= e^{\alpha} \cdot (e^{i\beta}) = e^{\alpha} \cdot (\cos \beta + i \sin \beta) \\
e^{i\beta_1} \cdot e^{i\beta_2} &= e^{i(\beta_1+\beta_2)}
\end{aligned}$$

В следующем семестре мы докажем:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Обобщение для комплексных чисел будет выглядеть так:

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$$

Если записать ряды для косинуса и синуса, то мы будем иметь:

$$\begin{aligned}
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots
\end{aligned}$$

Если мы просуммируем ряд косинуса и ряд синуса, умноженный на i , то мы получим ряд e^{ix} :

$$\cos x + i \sin x = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i \frac{x^5}{5!} - \dots = e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \dots$$

Задача 5. (Д2073)

$$\int x^2 e^{\sqrt{x}} dx$$

□ Сделаем замену $t = \sqrt{x}$, тогда:

$$x = t^2, dx = 2t dt$$

$$\int x^2 e^{\sqrt{x}} dx = \int t^4 e^t 2t dt = 2 \int t^5 e^t dt = 2e^t (t^5 - 5t^4 + 20t^3 - 60t^2 + 120t - 120) + C, t = \sqrt{x}$$

■

Заметим, в похожих задачах с синусами или косинусами надо понижать степень, например:

$$\cos^2 bx = \frac{1 + \cos 2bx}{2}, \sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \Rightarrow \sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin(3x)}{4}$$

Таким образом, похожие задачи решаются одними формулами с многочленами выше, но чтобы к ним свести надо либо использовать комплексные числа, либо интегрировать по частям, либо делать замены переменной, либо тригонометрические преобразования.

Интегралы с экспонентами**Задача 6. (Д2082)**

$$\int \frac{dx}{(1 + e^x)^2}$$

□ Сделаем замену переменных:

$$t = e^x, x = \ln t, dx = \frac{dt}{t}$$

$$\int \frac{dx}{(1 + e^x)^2} = \int \frac{dt}{t(1 + t)^2} = \int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t + 1} + \frac{C}{(t + 1)^2} \right) dt = \int \frac{A(t + 1)^2 + Bt(t + 1) + Ct}{t(t + 1)^2} dt$$

Заметим, что если снизу линейные множители, то сверху просто константа, поскольку ориентация на степень множителя, а не на общую степень.

$$A = 1, A + B = 0 \Rightarrow B = -1, 2A + B + C = 0 \Rightarrow C = -1$$

$$\int \frac{A}{t} + \frac{B}{t + 1} + \frac{C}{(t + 1)^2} dt = \ln t - \ln(t + 1) - \frac{1}{t + 1} + C = x - \ln(e^x + 1) - \frac{1}{e^x + 1} + C$$

■

Задача 7. (Д2087)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}}$$

□ Сделаем замену переменных (уберем то, что не очень нравится):

$$t = \sqrt{e^x - 1} \Rightarrow t^2 = e^x - 1 \Rightarrow x = \ln(1 + t^2), dx = \frac{2t}{1 + t^2} dt$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}} = \int \frac{2t}{1 + t^2} \cdot \frac{1}{t} dt = 2 \operatorname{arctg} t + C = 2 \operatorname{arctg}(\sqrt{e^x - 1}) + C$$

■

В таких задачах часто надо сделать просто правильную замену. Но оказывается, что могут появляться и неберущиеся интегралы, то есть они не выражаются через элементарные функции. Введём функцию интегрального логарифма:

$$\operatorname{li}(x) = \int \frac{dx}{\ln x}$$

с той поправкой, что справа стоит множество функций и мы берём конкретного представителя. Рассмотрим следующую задачу.

Задача 8. (Д2091)

$$\int R(x)e^{ax} dx, \quad R(x) = \frac{P(x)}{(x-x_1)^{k_1} \dots (x-x_m)^{k_m}}$$

$R(x)$ - рациональная функция, знаменатель которой имеет лишь действительные корни. Необходимо показать, что такой интеграл выражается через элементарные функции и $\operatorname{li}(e^{ax})$.

□ Мы знаем, что для вида $R(x)$ есть разложение на простейшие дроби:

$$R(x) = \frac{P(x)}{(x-x_1)^{k_1} \dots (x-x_m)^{k_m}} = \frac{A_1}{x-x_1} + \frac{A_2}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{A_{k_1}}{(x-x_1)^{k_1}} + \dots$$

Если мы научимся интегрировать $e^{ax} \frac{A_k}{(x-x_i)^k}$, то тогда мы сможем интегрировать всё выражение.

$$\begin{aligned} \forall k \geq 2, \quad \frac{1}{(x-b)^k} &= \left(\frac{1}{(x-b)^{k-1}(1-k)} \right)' \Rightarrow \\ \Rightarrow \int \frac{e^{ax}}{(x-b)^k} dx &= \frac{1}{1-k} \cdot \frac{e^{ax}}{(x-b)^{k-1}} - \frac{1}{1-k} \int \frac{e^{ax}}{(x-b)^{k-1}} dx \end{aligned}$$

Следовательно, можно интегрировать по индукции до тех пор, пока не остановимся на функции:

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{ax}}{x-b} dx &= |t = x-b| = \int \frac{e^{a(t+b)}}{t} dt = e^{ab} \int \frac{e^{at}}{t} dt = \left| y = e^{at}, t = \frac{1}{a} \ln y, dt = \frac{1}{y} dy \right| = \\ &= e^{ab} \int \frac{y}{\frac{1}{a} \ln y} \cdot \frac{1}{ay} dy = e^{ab} \int \frac{dy}{\ln y} = e^{ab} \operatorname{li}(y) + C = e^{ab} \operatorname{li}(e^{a(x-b)}) + C \end{aligned}$$

■

Интегрирование по частям

Задача 9. (Д2098)

$$\int \ln^n x dx$$

□ Вспомним, что мы считали такой интеграл для $n = 1$:

$$\int \ln x dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

В общем случае:

$$I_n = \int \ln^n x dx = \int 1 \cdot \ln^n x dx = x \ln^n x - \int x \cdot n \cdot \ln^{n-1} x \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$\begin{aligned}
&= x \ln^n x - \int n \cdot \ln^{n-1} x dx = x \ln^n x - n \cdot I_{n-1} \Rightarrow \\
&\Rightarrow I_n = x \ln^n x - n (x \ln^{n-1} x - (n-1) \cdot (x \ln^{n-2} x - \dots)) = \\
&= x \ln^n x - nx \ln^{n-1} x + n(n-1)x \ln^{n-2} x - \dots + (-1)^n n!x + C
\end{aligned}$$

Далее можно проверить это выражение по индукции. Базу уже проверяли, сделать шаг индукции и проверить, что выполняется рекуррентное соотношение. ■

Задача 10. (Д2110)

$$\int \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) dx$$

□ Проинтегрируем выражение по частям:

$$\begin{aligned}
\int 1 \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) dx &= x \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(1+x)^2}}} \cdot \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}(1+x) - 2\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx = \\
&= x \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) - \int \frac{1+x}{|1-x|} \cdot \frac{(1-x)\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx = x \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) - \int \frac{\pm\sqrt{x}}{(1+x)} dx
\end{aligned}$$

Если $x \in [0, 1) \Rightarrow +$, $x \in [1, +\infty) \Rightarrow -$. Сделаем замену:

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{x} dx}{1+x} &= |\sqrt{x} = t, x = t^2, dx = 2t dt| = \int \frac{2t^2}{1+t^2} dt = 2t - 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt = 2\sqrt{x} - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{x} + C \Rightarrow \\
&\Rightarrow \int \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) dx = x \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) \mp 2(\sqrt{x} - \operatorname{arctg} \sqrt{x}) + C
\end{aligned}$$

Также можно было сделать немного другое интегрирование по частям:

$$\begin{aligned}
\int 1 \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) dx &= (x+1) \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) - \int (x+1) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(1+x)^2}}} \cdot \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}(1+x) - 2\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx = \\
&= (x+1) \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) - \int \frac{1+x}{|1-x|} \cdot \frac{(1-x)}{\sqrt{x}(1+x)} dx = (x+1) \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) \mp \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \\
&= (x+1) \cdot \arcsin \left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x} \right) \mp 2\sqrt{x} + C
\end{aligned}$$

Задача 11. (Д2113)

$$\int x \operatorname{arctg} x \cdot \ln(1+x^2) dx$$

□ Вспомним, как решать следующую задачу:

$$\int x \operatorname{arctg} x dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$$

Проинтегрируем по частям исходное выражение:

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{arctg} x \cdot \ln(1+x^2) dx &= \left(\frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \right) \cdot \ln(1+x^2) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \int ((x^2+1) \operatorname{arctg} x - x) \frac{2x}{1+x^2} dx \\ \frac{1}{2} \int ((x^2+1) \operatorname{arctg} x - x) \frac{2x}{1+x^2} dx &= \int x \operatorname{arctg} x dx - \int \frac{x^2}{1+x^2} dx\end{aligned}$$

То есть интегралы, которые только что посчитали. ■

Задача 12. (Д2165)

$$\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx$$

□ Попробуем упростить дробь с помощью формул половинного угла:

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \Rightarrow 1 + \sin x = \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 \\ \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \Rightarrow 1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}\end{aligned}$$

Похоже, что это не сильно поможет и надо интегрировать по частям (решение со следующего семинара):

$$\begin{aligned}\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx &= \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x - \int e^x \frac{\cos x(1+\cos x) + (1+\sin x) \sin x}{(1+\cos x)^2} dx \\ \int e^x \frac{\cos x(1+\cos x) + (1+\sin x) \sin x}{(1+\cos x)^2} dx &= \int e^x \frac{1+\cos x + \sin x}{(1+\cos x)^2} dx \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1+\cos x + \sin x}{(1+\cos x)^2} &= \frac{1}{1+\cos x} + \frac{\sin x}{(1+\cos x)^2} = \frac{1}{1+\cos x} + \left(\frac{1}{1+\cos x} \right)' \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(e^x \frac{1+\cos x + \sin x}{(1+\cos x)^2} \right)' &= \frac{e^x}{1+\cos x} + e^x \left(\frac{1}{1+\cos x} \right)' \Rightarrow \\ \Rightarrow \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx &= e^x \frac{\sin x}{1+\cos x} + C\end{aligned}$$
■

Rm: 2. Как получилось додуматься до решения? Заметели следующее:

$$\frac{1+\cos x + \sin x + \sin x \cos x}{(1+\cos x)^2} = \frac{(1+\cos x)(1+\sin x)}{(1+\cos x)^2}$$

Обозначим:

$$I = \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx \Rightarrow \int e^x \frac{\cos x(1+\cos x) + (1+\sin x) \sin x}{(1+\cos x)^2} dx = I - \int \frac{\sin x \cos x}{(1+\cos x)} e^x dx$$

А дальше накидывать производную на дробь - не очень хорошая идея, поскольку будет нарастать знаменатель, поэтому логично было бы убрать производную отсюда. Тогда выделяя множитель:

$$\frac{\sin x}{(1+\cos x)^2} = \left(\frac{1}{1+\cos x} \right)'$$

Следовательно, производная перебрасывается на $e^x \cos x$, тогда снова появляется I и сокращается.

ДЗ: В этот раз без конкретики, но были заданы упражнения 2077, 2093.