

## Ряды с неотрицательными слагаемыми

Ряды с неотрицательными слагаемыми полезно сравнивать друг с другом.

**Следствие 1.** Пусть, начиная с некоторого номера, выполнено:

$$\forall n, c_1 b_n \leq a_n \leq c_2 b_n$$

где  $c_1, c_2 > 0$  - фиксированы  $\Rightarrow$  ряды  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  сходятся и расходятся одновременно.

Мы рассмотрели наборы примеров, один из которых это геометрическая прогрессия. Докажем несколько простых наблюдений, которые по сути своей состоят в сравнении данного ряда с геометрической прогрессией.

**Утв. 1. (Признак Даламбера)** Пусть  $a_n > 0$ , тогда:

- (1) Если  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$ , то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится;
- (2) Если  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1$ , то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится;
- (3) Если  $q = 1$ , то ничего сказать нельзя;

□ Вспомним, что  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k > n} c_k$  и  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k > n} c_k$ . Тогда:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{k > n} \frac{a_{k+1}}{a_k} \right) = q < 1 \Rightarrow$  некая последовательность точных верхних граней сходится к некоторому числу  $q < 1$ . Тогда пусть  $q < q_0 < 1$ , получим:

$$\exists n_0: \forall n > n_0, \sup_{k > n} \frac{a_{k+1}}{a_k} < q_0 < 1 \Rightarrow \forall k > n_0 + 1, \frac{a_{k+1}}{a_k} < q_0 < 1$$

Поскольку точная верхняя грань меньше, чем  $q_0$ , то все такие элементы  $\frac{a_{k+1}}{a_k}$  тем более меньше, чем  $q_0$ . Отбросим элементы  $a_1, a_2, \dots, a_{n_0+1}$ . Далее считаем что  $\forall k, \frac{a_{k+1}}{a_k} < q_0 < 1$ . Тогда:

$$a_n = a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq a_1 \cdot q_0 \cdot q_0 \cdot \dots \cdot q_0 = a_1 \cdot q_0^{n-1}$$

Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q_0^{n-1}$  сходится  $\Rightarrow$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  тоже сходится;

- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k > n} \frac{a_{k+1}}{a_k} \right) = q > 1 \Rightarrow$  тогда выпишем формально:

$$\exists n_0: \forall n > n_0, \inf_{k > n} \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1 \Rightarrow \forall k > n_0 + 1, \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1 \Rightarrow a_{k+1} > a_k \Rightarrow a_k \nrightarrow 0$$

Последовательность положительных чисел не может возрастать и одновременно стремиться к нулю. И таким образом, необходимое условие сходимости не выполняется;

■

**Утв. 2. (Признак Коши)** Пусть  $a_n \geq 0$ , тогда:

- (1) Если  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1$ , то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится;
- (2) Если  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q > 1$ , то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится;
- (3) Если  $q = 1$ , то ничего сказать нельзя;

**Rm: 1.** При расходимости в качестве  $q$  вполне допустима  $+\infty$ .

**Rm: 2.** Всё доказательство сведется к неравенству  $a_n \leq q^n$  для какого-то  $q$ . Но лучше писать  $\sqrt[n]{a_n} \leq q$  потому что корень из  $n$  асимптотически убывает любой множитель при  $q^n$ . Например, при  $a_n \leq nq^n$  можно увидеть, что асимптотически ничего не меняется:  $\sqrt[n]{a_n} \leq q \cdot \sqrt[n]{n}$ , где  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ .

□

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{k > n} \sqrt[k]{a_k} \right) = q < 1$ . Тогда будет верно следующее:

$$\exists q_0 < 1 \wedge n_0: \forall n > n_0, \sup_{k > n} \sqrt[k]{a_k} < q_0 < 1 \Rightarrow \forall k > n_0 + 1, \sqrt[k]{a_k} < q_0 < 1 \Rightarrow a_k < q_0^k$$

Тем самым, начиная с некоторого номера члены ряда мажорируются чистой геометрической прогрессией  $\Rightarrow$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится;

- (2) Верхний предел это наибольший из частичных пределов, тогда:

$$\exists \{n_k\}: \sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q > 1$$

В частности:

$$\exists K: \forall k > K, \sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1$$

Это в точности означает, что  $a_n \not\rightarrow 0$

■

**Rm: 3.** Между критериями есть взаимосвязь: признак Даламбера  $\Rightarrow$  признак Коши. При этом есть ряды, которые по признаку Даламбера не исследуется, но исследуется по признаку Коши. Типичный пример:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \dots$$

Поскольку будут иметься такие члены  $a_n$ , что отношение  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  при больших  $n$  будет уходить в бесконечность и признак Даламбера не даст адекватного результата.

## Бесконечные произведения

Пусть  $\{b_n\}$  - числовая последовательность.

**Опр: 1.** Выражение  $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$  называется бесконечным произведением, где  $b_n$  называются множителями.

**Опр: 2.** Выражение  $\prod_N = \prod_{n=1}^N b_n$  называется частичным произведением.

**Опр: 3.** Если существует конечный, отличный от нуля, предел  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_N$ , то говорят, что произведение сходится и равно этому пределу:  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_N \neq 0$ .

**Опр: 4.** Если  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_N = 0$ , то говорят, что произведение расходится к нулю. В остальных случаях говорят, что произведение расходится.

**Утв. 3. (Необходимое условие сходимости)** Если  $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$  сходится, то  $b_n \rightarrow 1$ .

□ Поскольку бесконечное произведение сходится  $\Rightarrow$  не к нулю  $\Rightarrow$  среди  $b_n$  нулей нет и частичные произведения точно отличны от нуля. Возьмем следующее отношение:

$$b_n = \frac{\prod_n}{\prod_{n-1}} = \frac{\prod_{k=1}^n b_k}{\prod_{k=1}^{n-1} b_k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\prod_{k=1}^{\infty} b_k}{\prod_{k=1}^{\infty} b_k} = 1$$

■

**Rm: 4.** Поскольку  $b_n$  в сходящихся бесконечных произведениях стремятся к единице, то начиная с некоторого номера они точно больше 0. Точно также, как и в рядах можно отбрасывать конечное число множителей если они не нулевые, потому что делим фиксированные суммы на число или умножаем на фиксированное число.

**Теорема 1.** Пусть  $b_n > 0$ , тогда  $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$  сходится  $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n$  сходится. В случае сходимости имеют место равенства:

$$e^{\sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n} = \prod_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$\ln \left( \prod_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n$$

□ Функции  $e^x$ ,  $\ln x$  - непрерывные, верны формулы  $e^{\sum_{n=1}^N \ln b_n} = \prod_{n=1}^N b_n$  и  $\ln \left( \prod_{n=1}^N b_n \right) = \sum_{n=1}^N \ln b_n$ . Здесь важно, что мы запретили произведению сходиться к нулю.

( $\Rightarrow$ ) Если  $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$  - сходится, то по определению  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N b_n = C > 0$ . Так как  $\ln x$  непрерывен на  $(0, +\infty)$ , то верно следующее  $\ln \left( \prod_{n=1}^N b_n \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \ln C$ , но  $\ln \left( \prod_{n=1}^N b_n \right) = \sum_{n=1}^N \ln b_n \Rightarrow$  ряд из  $\ln b_n$  - сходится.

( $\Leftarrow$ ) Если  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln b_n$  - сходится, то по определению  $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \ln b_n = C$ . Так как  $e^x$  непрерывна на  $\mathbb{R}$ , то верно следующее  $e^{\sum_{n=1}^N \ln b_n} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^C$ , но  $e^{\sum_{n=1}^N \ln b_n} = \prod_{n=1}^N b_n \Rightarrow$  бесконечное произведение из  $b_n$  - сходится. ■

Мы знаем, что  $b_n \rightarrow 1$ , это можно записать как  $b_n = 1 + \beta_n$ ,  $\beta_n \rightarrow 0$ . Предполагаем, что  $b_n > 0$ , но это вовсе не означает, что  $\beta_n > 0$ . Согласно предыдущей теореме, исследование сходимости бесконечного произведения свелось бы к исследованию ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \beta_n)$$

Из прошлой лекции мы знаем, что знакопеременный ряд нельзя проверять асимптотическими методами по первому приближению. Нужен знакпостоянный ряд.

**Утв. 4.** Следующий ряд  $\sum_n |\ln(1 + \beta_n)|$  - сходится  $\Leftrightarrow \sum_n |\beta_n|$  - сходится. В частности, если сумма модулей  $\sum_n |\beta_n|$  - сходится, то и бесконечное произведение  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \beta_n)$  - сходится.

□ Мы знаем, что:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\ln(1+x)}{x} \right| = 1$$

Пусть  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ , тогда:

$$\exists \delta > 0: \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}, -\frac{1}{2} \leq \left| \frac{\ln(1+x)}{x} \right| - 1 \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \forall x \in (-\delta, \delta), \frac{1}{2}|x| \leq |\ln(1+x)| \leq \frac{3}{2}|x|$$

Далее рассматриваем только случай  $\beta_n$  стремящегося к нулю (так получится для доказательства в обе стороны по необходимому условию сходимости).

$$\exists n_0: \forall n > n_0, \frac{1}{2}|\beta_n| \leq |\ln(1 + \beta_n)| \leq \frac{3}{2}|\beta_n|$$

Таким образом, слагаемые одного ряда оцениваются слагаемыми другого с константами  $\Rightarrow$  по следствию сходимости рядов с неотрицательными слагаемыми оба ряда сходятся и расходятся одновременно  $\Rightarrow$  требуемое - выполнено. ■

**Rm: 5.** Заметим, что модуль убрать нельзя, иначе сыграют слагаемые более глубокого разложения логарифма (второго порядка).

**Упр. 1.** Доказать, что из сходимости рядов  $\sum_n \beta_n$  и  $\sum_n \beta_n^2$  следует сходимость ряда  $\sum_n \ln(1 + \beta_n)$ .

**Указание:**  $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ .

□ Воспользуемся разложением ряда Тейлора функции  $\ln(1+x)$ :

$$\ln(1+\beta_n) = \beta_n - \frac{\beta_n^2}{2} + o(\beta_n^2) \Rightarrow \beta_n - \ln(1+\beta_n) = \frac{\beta_n^2}{2} + o(\beta_n^2)$$

Рассмотрим предел следующего отношения:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\beta_n - \ln(1+\beta_n)|}{\beta_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{\beta_n^2}{2} + o(\beta_n^2) \right|}{\beta_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} + \frac{o(\beta_n^2)}{\beta_n^2} \right| = \frac{1}{2}$$

Таким образом, по следствию из прошлой лекции ряды  $\beta_n^2$  и  $|\beta_n - \ln(1+\beta_n)|$  сходятся одновременно. Первый ряд по условию сходится  $\Rightarrow$  ряд  $\beta_n - \ln(1+\beta_n)$  сходится абсолютно  $\Rightarrow$  сходится. Таким образом:

$$\exists \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (\beta_n - \ln(1+\beta_n)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \beta_n - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \ln(1+\beta_n)$$

А поскольку ряд  $\sum_n \beta_n$  сходится, то существует предел частичной суммы  $\Rightarrow$  существует предел частичной суммы второго слагаемого в правой части выше  $\Rightarrow$  ряд  $\sum_n \ln(1+\beta_n)$  также будет сходиться. ■

**Упр. 2.** Привести пример, когда обратное утверждение не верно. То есть ряд  $\sum_n \ln(1+\beta_n)$  сходится, но ряды  $\sum_n \beta_n$  и  $\sum_n \beta_n^2$  расходятся.

□ Рассмотрим следующий ряд:  $\forall n \in \mathbb{N}, \beta_{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}, \beta_{2n} = -\frac{1}{\sqrt{n}}$ .

Ряд  $\sum_{n=1}^{2N} \beta_n = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow$  расходится.

Аналогично,  $\beta_{2n-1}^2 + \beta_{2n}^2 = \frac{2}{n} + \frac{2}{n\sqrt{n}} + \frac{1}{n^2} \geq \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$  и таким образом, ряд  $\sum_{n=1}^{2N} \beta_n^2 \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \Rightarrow$  по следствию из прошлой лекции, ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n^2$  расходится вместе с рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ .

Рассмотрим  $\prod_n (1+\beta_n)$ , если этот ряд сходится, то  $\sum_n \ln(1+\beta_n)$  также будет сходиться. Верно следующее:

$\forall n \in \mathbb{N}, (1+\beta_{2n-1})(1+\beta_{2n}) = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n\sqrt{n}} = 1 - \frac{1}{n\sqrt{n}}$ , следовательно получим:

$$\prod_{n=1}^{2N} (1+\beta_n) = \prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{1}{n\sqrt{n}}\right) = \prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$$

Поскольку ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \right|$  сходится, то сходится и правая часть уравнения выше, а значит и  $\prod_n (1+\beta_n)$ . ■

## Разложение $\sin x$ в бесконечное произведение

Пусть  $P(x)$  - многочлен и  $x_1, \dots, x_n$  - его корни. Тогда разложим многочлен на множители:

$$P(x) = A(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

Если раскладывать по аналогии  $\sin x$ , то получим:

$$\sin x = A \prod_n (x - \pi n)$$

но такое произведение не является сходящимся. Преобразуем разложение многочлена:

$$P(x) = (-1)^n A x_1 \cdot \dots \cdot x_n \cdot \left(1 - \frac{x}{x_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{x}{x_n}\right) = C \cdot \left(1 - \frac{x}{x_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{x}{x_n}\right)$$

Представим аналогичным способом разложение синуса. Учитывая что  $n$  бегает по всем целым, соберем разность квадратов и получим следующее разложение:

$$\sin x = (x - 0) \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right) = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right)$$

**Rm: 6.** Такое разложение возможно не только для функции  $\sin x$ , в комплексном анализе рассматриваются целые классы функции раскладывающиеся по нулям.

**Теорема 2. (Эйлера)**

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right)$$

**Rm: 7.** Выражение в правой части сходится при всех  $x \neq \pi n$ , а при  $x = \pi n$  расходится к нулю. Поэтому можно считать, что равенство имеет место для всех  $x \in \mathbb{R}$ .

□ Мы знаем из школы, что  $\sin(2N+1)t = \sin t \cdot P_N(\sin^2 t)$ , где  $P_N(x)$  - многочлен степени  $N$ .

**Упр. 3.** Доказать данное выражение по индукции, рассмотрев сумму:  $\sin(2N+3)t + \sin(2N-1)t$ .

□ Воспользуемся формулой сложения синусов и косинуса двойного угла:

$$\sin(2N+3)t + \sin(2N-1)t = 2 \sin(2N+1)t \cdot \cos 2t = 2 \sin(2N+1)t \cdot (1 - 2 \sin^2 t)$$

База:  $\sin 3t = \sin t \cdot P_1(\sin^2 t)$ , разложим  $\sin 3t$ :

$$\begin{aligned} \sin 3t &= \sin 2t + t = \sin 2t \cdot \cos t + \cos 2t \cdot \sin t = (2 \sin t \cdot \cos t) \cdot \cos t + (1 - 2 \sin^2 t) \cdot \sin t = \\ &= 2 \sin t \cdot (1 - \sin^2 t) + (1 - 2 \sin^2 t) \cdot \sin t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t = \sin t \cdot (3 - 4 \sin^2 t) = \sin t \cdot P_1(\sin^2 t) \end{aligned}$$

Или, используя формулу выше при  $N = 0$ , получим аналогичное:

$$\sin 3t + \sin(-t) = 2 \sin t \cdot (1 - 2 \sin^2 t) \Rightarrow \sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t$$

Шаг: пусть выражение верно для  $N$ :  $\sin(2N+1)t = \sin t \cdot P_N(\sin^2 t)$ , рассмотрим случай  $N+1$ :

$$(2(N+1)+1)t = (2N+3)t \Rightarrow \sin(2N+3)t = 2 \sin(2N+1)t \cdot (1 - 2 \sin^2 t) - \sin(2N-1)t$$

По индукции верно:  $\sin(2N-1)t = \sin t \cdot P_{N-1}(\sin^2 t)$  и  $\sin(2N+1)t = \sin t \cdot P_N(\sin^2 t)$ , тогда получим:

$$\sin(2N+3)t = 2 \sin t \cdot P_N(\sin^2 t) \cdot (1 - 2 \sin^2 t) - \sin t \cdot P_{N-1}(\sin^2 t) = \sin t \cdot (P_{N+1}(\sin^2 t) - P_{N-1}(\sin^2 t))$$

где последнее равенство верно, поскольку умножение многочлена степени  $N$  на многочлен степени 1 дает новый многочлен степени  $N+1$ , тогда:

$$\sin(2N+3)t = \sin t \cdot (P_{N+1}(\sin^2 t))$$

где последнее верно в силу того, что степени многочленов различны и максимальная степень равна  $N+1$ . Таким образом, получили требуемое. ■

Перепишем исходное выражение в следующем виде:

$$\frac{\sin(2N+1)t}{\sin t} = P_N(\sin^2 t)$$

Корни этого многочлена можно найти из равенства нулю левой части:

$$(2N+1)t = \pi n \Rightarrow t = \frac{\pi n}{2N+1} \Rightarrow \sin^2 \left( \frac{\pi n}{2N+1} \right)$$

Теперь, когда  $n$  будет пробегать  $1, 2, \dots, N$  наберём как раз  $N$  различных корней, а потом он пойдет на повтор (поскольку от 0 до  $\frac{\pi}{2}$  квадрат синуса возрастает). Следовательно, можно будет многочлен разложить на множители:

$$\frac{\sin(2N+1)t}{\sin t} = P_N(\sin^2 t) = C_N \cdot \prod_{n=1}^N \left( 1 - \frac{\sin^2 t}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right)$$

Как найти константу? Пусть  $t \rightarrow 0$  тогда слева будет стремление к  $2N+1$  по замечательному пределу, а справа к  $C_N$ . Следовательно, получим что  $C_N = (2N+1)$ .

Возьмем  $t = \frac{x}{2N+1}$ , тогда получим:

$$\sin x = (2N+1) \cdot \sin \frac{x}{2N+1} \cdot \prod_{n=1}^N \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right)$$

**Эвристически:** Устремляем  $N \rightarrow \infty$  и пользуемся замечательными пределами  $\Rightarrow$  получим требуемое. Но проблема в том, что нельзя устремлять  $N$  и в множителях, и в их количестве. Поэтому этот предельный переход требует обоснования.

**(Продолжение доказательства из лекции 3):** Разделим полученный многочлен на главную и хвостовую части:

$$\sin x = \left[ (2N+1) \cdot \sin \frac{x}{2N+1} \cdot \prod_{n=1}^J \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right) \right] \cdot \prod_{n=J+1}^N \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right)$$

Поскольку тождество верно  $\forall N$ , устремим  $N \rightarrow \infty$ , тогда:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (2N+1) \cdot \sin \frac{x}{2N+1} = x, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^J \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right) = \prod_{n=1}^J \left( 1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

У первой части тождества есть конечный предел, значит есть конечный предел и у второй части тождества, обозначим его  $R_J$ :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=J+1}^N \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right) = R_J$$

Нам необходимо как-то этот предел оценить, поскольку мы хотим получить бесконечное произведение. Если покажем, что  $\lim_{J \rightarrow \infty} R_J = 1$ , то всё будет доказано. Мы получили, что  $\forall J$  верно:

$$\sin x = x \cdot \prod_{n=1}^J \left( 1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right) \cdot R_J$$

Очевидна оценка сверху (поскольку идет перемножение членов, меньше единицы):

$$\prod_{n=J+1}^N \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right) \leq 1$$

Найдем оценку снизу. Вспоминая, что если угол  $x$  был в интервале  $(0, \frac{\pi}{2})$ , то  $\sin x \leq x$ . И поскольку  $\sin x$  на этом интервале это выпуклая функция, то она больше секущей на нём  $\Rightarrow \sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ .




Рис. 1: Оценка функции  $\sin x$  на интервале  $(0, \frac{\pi}{2})$ .

Таким образом:

$$\forall x \in (0, \frac{\pi}{2}), \quad \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$$

Возьмем  $J$  достаточно большим так, чтобы  $\forall N > J, \frac{|x|}{2N+1} \in (0, \frac{\pi}{2})$ , тогда:

$$\frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \leq \frac{\frac{x^2}{(2N+1)^2}}{\frac{4\pi^2 n^2}{\pi^2 (2N+1)^2}} = \frac{x^2}{4n^2}$$

Следовательно, получили оценку снизу для достаточно больших  $J$ :

$$\prod_{n=J+1}^N \left( 1 - \frac{x^2}{4n^2} \right) \leq \prod_{n=J+1}^N \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2N+1}}{\sin^2 \frac{\pi n}{2N+1}} \right) \leq 1$$

Перейдем к пределу по  $N$ , поскольку  $\sum_n \left| \frac{x^2}{4n^2} \right|$  сходится, то произведение  $\prod_n \left( 1 - \frac{x^2}{4n^2} \right)$  сходится и мы получим следующие неравенства:

$$\prod_{n=J+1}^{\infty} \left( 1 - \frac{x^2}{4n^2} \right) \leq R_J \leq 1$$



Устремим  $J \rightarrow \infty$ , тогда получим:

$$\lim_{J \rightarrow \infty} \prod_{n=J+1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4n^2}\right) = \lim_{J \rightarrow \infty} \frac{\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4n^2}\right)}{\prod_{n=1}^J \left(1 - \frac{x^2}{4n^2}\right)} = 1 \Rightarrow \lim_{J \rightarrow \infty} R_J = 1$$

Следовательно, используя сходимость  $\sum_n \left| \frac{x^2}{4n^2} \right|$ , получим требуемое:

$$\sin x = \lim_{J \rightarrow \infty} \left( x \cdot \prod_{n=1}^J \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right) \cdot R_J \right) = x \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right) \cdot 1 = x \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right)$$

■