

Измеримые функции

Опр: 1. Измеримым пространством или ИП будем называть тройку (X, \mathcal{M}, μ) , где \mathcal{M} - σ -алгебра с единицей X , а μ - σ -аддитивная мера. Если μ - конечная, то пространство будем называть конечным, если μ - σ -конечна, то σ -конечным.

Опр: 2. Пусть (X, \mathcal{M}, μ) - измеримое пространство (ИП), $E \in \mathcal{M}$ - некоторое множество и задана функция: $f: E \rightarrow \mathbb{R}^1 \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$, тогда она называется измеримой на E (или можно сказать измеримом пространстве (E, \mathcal{M}, μ)) в том и только в том случае, если:

$$\forall c \in \mathbb{R}^1, f^{-1}((c, +\infty]) = \{x \in E: f(x) \in (c, +\infty]\} \in \mathcal{M}$$

Rm: 1. Также можно сказать $f^{-1}((c, +\infty]) \in \mathcal{M} \cap E$ вместо $f^{-1}((c, +\infty]) \in \mathcal{M}$.

Rm: 2. Поскольку если (X, \mathcal{M}, μ) это ИП и $E \in \mathcal{M}$, то $(E, \mathcal{M} \cap E, \mu)$ также ИП, в определении можно считать, что f задана на X .

Rm: 3. Если $f(x)$ определена на открытом или замкнутом подмножестве $A \subseteq \mathbb{R}^1$ и $f \in C(A)$, то есть f непрерывна на A , то f измерима на $(A, \mathcal{M} \cap A, \mu)$, где \mathcal{M} это классическая Лебеговская σ -алгебра, а μ это классическая мера Лебега. Это следует из следующего факта:

$$\forall c, f^{-1}((c, +\infty]) = f^{-1}((c, +\infty)) = A \cap B$$

где B - открытое множество, а все открытые множества измеримы относительно классической меры Лебега (см. теорему с прошлой лекции, что любое открытое множество представимо в виде дизъюнктного объединения интервалов, которые измеримы относительно классической меры Лебега по её определению, смотри лекцию 3).

Опр: 3. Пусть (X, \mathcal{M}, μ) это ИП и $E \in \mathcal{M}$, тогда будем говорить, что некоторое свойство $(*)$ выполнено почти всюду на E (п.в. на E) $\Leftrightarrow \exists E_0 \in \mathcal{M}, E_0 \subseteq E \wedge \mu(E \setminus E_0) = 0$, а свойство $(*)$ выполнено $\forall x \in E_0$.

Опр: 4. Функции $f(x)$ и $g(x)$ совпадающие п.в. на $E \in \mathcal{M}$ будем называть эквивалентными на E .

Далее, везде (X, \mathcal{M}, μ) это ИП и f измеримая на $X \Leftrightarrow f$ измеримая на (X, \mathcal{M}, μ)

Лемма 1. Пусть $f(x)$ измерима на ИП (X, \mathcal{M}, μ) , тогда:

$$f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathcal{M}, f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{M}, f^{-1}(\mathbb{R}^1) \in \mathcal{M}, \forall a, b \in \mathbb{R}^1, f^{-1}((a, b)) \in \mathcal{M}$$

то есть, все такие множества - измеримы.

□ Представим $f^{-1}(\{+\infty\})$ в виде:

$$f^{-1}(\{+\infty\}) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((n, +\infty])$$

где $f^{-1}((n, +\infty]) \in \mathcal{M}$ по определению $\Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((n, +\infty]) \in \mathcal{M}$, поскольку \mathcal{M} это σ -алгебра. Аналогично, представим $f^{-1}(\{-\infty\})$ в виде:

$$f^{-1}(\{-\infty\}) = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}((-n, +\infty])$$

$$\forall n, f^{-1}((-n, +\infty]) \in \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}((-n, +\infty]) \in \mathcal{M} \Rightarrow X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}((-n, +\infty]) \in \mathcal{M}$$

Аналогично, представим $f^{-1}(\mathbb{R}^1)$ в виде:

$$f^{-1}(\mathbb{R}^1) = X \setminus (f^{-1}(\{+\infty\}) \cup f^{-1}(\{-\infty\}))$$

$$f^{-1}(\{+\infty\}) \cup f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{M} \Rightarrow X \setminus (f^{-1}(\{+\infty\}) \cup f^{-1}(\{-\infty\})) \in \mathcal{M}$$

Затем, $\forall b \in \mathbb{R}^1$ рассмотрим полный прообраз: $f^{-1}([b, +\infty])$:

$$f^{-1}([b, +\infty]) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((b - \frac{1}{n}, +\infty]) \in \mathcal{M} \Rightarrow f^{-1}((a, b)) = f^{-1}((a, +\infty]) \setminus f^{-1}([b, +\infty]) \in \mathcal{M}$$

где измеримость первого слагаемого $f^{-1}((a, +\infty])$ вытекает из определения. ■

Теорема 1. Пусть функция $f(x)$ измерима и конечна на X ($f: X \rightarrow \mathbb{R}^1$), тогда для любого борелевского множества $B \subseteq \mathbb{R}^1$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$.

□ Рассмотрим $\Sigma = \{A \subseteq \mathbb{R}^1: f^{-1}(A) \in \mathcal{M}\}$. По предыдущей лемме $\mathbb{R}^1 \in \Sigma$. Если $A, C \in \Sigma$, то:

$$f^{-1}(A \cap C) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(C), f^{-1}(A) \in \mathcal{M}, f^{-1}(C) \in \mathcal{M} \Rightarrow f^{-1}(A) \cap f^{-1}(C) \in \mathcal{M}$$

Аналогично, получим:

$$f^{-1}(A \Delta C) = f^{-1}(A) \Delta f^{-1}(C), f^{-1}(A) \in \mathcal{M}, f^{-1}(C) \in \mathcal{M} \Rightarrow f^{-1}(A) \Delta f^{-1}(C) \in \mathcal{M}$$

В результате, $A \cap C \in \Sigma$, $A \Delta C \in \Sigma \Rightarrow \Sigma$ это алгебра (поскольку $\mathbb{R}^1 \in \Sigma$). Если $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \Sigma$, то в этом случае:

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(A_i), \forall i, f^{-1}(A_i) \in \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(A_i) \in \mathcal{M} \Rightarrow f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \in \Sigma$$

В результате, Σ это σ -алгебра. Согласно предыдущей лемме любой интервал $(a, b) \in \Sigma \Rightarrow$ воспользуемся теоремой 4 с прошлой лекции, получим, что любое открытое $G \in \Sigma \Rightarrow \Sigma$ это σ -алгебра, содержащая все открытые множества, а борелевская это минимальная σ -алгебра, содержащая все открытые, следовательно борелевская σ -алгебра $\mathcal{B} \subset \Sigma$. ■

Рм: 4. Для любого измеримого по Лебегу, относительно классической меры Лебега, множества его полный прообраз не обязательно будет измеримым. Это не верно даже когда f будет непрерывной. На семинарах разбирается пример непрерывной функции и измеримого по Лебегу множества, относительно классической меры Лебега такого, что его полный прообраз уже будет неизмерим.

Лемма 2. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ измеримы на X , тогда измеримы множества:

$$A = \{x \in X: f(x) > g(x)\}, B = \{x \in X: f(x) = g(x)\}$$

□ Пусть \mathbb{Q} - все рациональные числа на \mathbb{R}^1 , тогда множество A можно представить так:

$$A = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} f^{-1}((r, +\infty]) \cap g^{-1}([-\infty, r))$$

Измеримость $f^{-1}((r, +\infty])$ вытекает из определения, измеримость $g^{-1}([-\infty, r))$ вытекает из того, что $g^{-1}([-\infty, r)) = X \setminus g^{-1}([r, +\infty)) \Rightarrow A \in \mathcal{M}$. Аналогично, $B = X \setminus (\{f > g\} \cup \{g > f\}) \Rightarrow B \in \mathcal{M}$. ■

Теорема 2. Пусть $f(x)$ измерима на X , открытое множество $G \subseteq \mathbb{R}^1$, $f: X \rightarrow G$ и функция $\varphi(t)$ непрерывна на G , тогда композиция: $\varphi(f(x))$ измерима на X .

□ Пусть $c \in \mathbb{R}^1$ и $B_c = \varphi^{-1}((c, +\infty)) = \{t \in G: \varphi(t) > c\}$, тогда в силу непрерывности φ множество B_c это открытое множество $\Rightarrow B_c$ - борелевское. Но при этом выполняется:

$$(\varphi(f))^{-1}((c, +\infty)) = (\varphi(f))^{-1}((c, +\infty)) = \{x \in X: f(x) \in B_c\} = f^{-1}(B_c) \in \mathcal{M}$$

где последнее верно по теореме 1. ■

Rm: 5. Заметим, что композиция двух измеримых функций не обязательно будет измеримой. Более того, если в теореме поменять ролями f и φ , то композиция $f(\varphi)$ не обязана быть измеримой, поскольку есть непрерывные функции, которые множество меры нуль переводят не в множество меры нуль.

Следствие 1. Пусть $f(x)$ измерима и конечна на X , тогда измеримы функции:

$$\forall a \in \mathbb{R}^1, a \cdot f(x), f^2(x), f(x) + a$$

И если $f(x) \neq 0$ на X , то $\frac{1}{f(x)}$ тоже измерима.

□ Следует непосредственно из теоремы 2 подбором непрерывных функций. ■

Следствие 2. Если функции $f(x)$ и $g(x)$ измеримы на X и конечны (запрещаем бесконечные значения), то верны следующие утверждения:

- 1) $f(x) + g(x)$ измерима на X ;
- 2) $f(x) \cdot g(x)$ измерима на X ;
- 3) Если $g(x) \neq 0$ на X , то $\frac{f(x)}{g(x)}$ измерима на X ;

□

- 1) Пусть $c \in \mathbb{R}^1$, тогда:

$$(f + g)^{-1}((c, +\infty)) = \{x \in X: f(x) + g(x) > c\} = \{x \in X: f(x) > c - g(x)\}$$

поскольку $f(x)$ измерима и $c - g(x)$ измерима по следствию 1, то $(f + g)^{-1}((c, +\infty))$ измеримо по лемме 2;

- 2) Представим $f(x) \cdot g(x)$ следующим образом:

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{1}{4}((f(x) + g(x))^2 - (f(x) - g(x))^2)$$

пользуясь леммой 2 и следствием 1 снова получаем измеримую функцию;

- 3) Представим $\frac{f(x)}{g(x)}$ следующим образом:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$$

пользуясь следствием 1 и вторым пунктом данной теоремы, снова получаем измеримую функцию; ■

Rm: 6. Условия конечности функций $f(x)$ и $g(x)$ можно изменить на:

- 1) Определить операции с точками: $\pm\infty$, например, очевидные представления:

$$a + \infty = +\infty, \quad a - \infty = -\infty, \quad a > 0, \quad a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, \quad a < 0, \quad a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$$

Договорные представления:

$$\infty - \infty = 0, \quad 0 \cdot \infty = 0$$

В этом случае можно не требовать конечности, подразумевая, что мы так определяем операции;

- 2) Если мера μ - полна, то можно потребовать конечности $f(x)$ и $g(x)$ п.в. на X . В этом случае неважно, как определены операции на множестве меры 0.

Измеримость пределов и точных граней последовательности функций. Измеримость производной функции

Теорема 3. Пусть $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ это последовательность измеримых функций на X , тогда следующие функции измеримы на X :

$$\varphi(x) = \sup_n f_n(x), \quad \psi(x) = \inf_n f_n(x), \quad h(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad g(x) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Кроме того, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ измерима на множестве своего существования E , то есть на $(E, \mathcal{M} \cap E, \mu)$.

Rm: 7. Множество своего существования может оказаться пустым.

□ Если $c \in \mathbb{R}^1$, то будет верно:

$$\{x \in X : \varphi(x) > c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in X : f_n(x) > c\}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \{x \in X : f_n(x) > c\} \in \mathcal{M} \Rightarrow \{x \in X : \varphi(x) > c\} \in \mathcal{M}$$

Аналогично для других функций:

$$\{x \in X : \psi(x) > c\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in X : f_n(x) > c + \frac{1}{m}\} \in \mathcal{M}$$

$$h(x) = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} f_k(x)$$

Взятие верхней и нижней граней последовательности измеримых функций не изменяет измеримости, то отсюда будет вытекать измеримость $h(x)$. Аналогично для функции $g(x)$. Рассмотрим множество E :

$$E = \{x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\} = \{x \in X : h(x) = g(x)\} \in \mathcal{M}$$

Это то множество, где верхний предел совпадает с нижним, при этом две измеримые функции равны друг другу на измеримом множестве по лемме 2. Кроме того, на E функция $f(x) = h(x)$, а $h(x)$ измерима на E , поскольку она измерима на всём X . ■

Теорема 4. Пусть $f(x) \in C((a, b))$, где $(a, b) \subset \mathbb{R}^1$, тогда её производная измерима относительно классической меры Лебега на множестве своего существования.

□ Введем функции:

$$\forall x \in (a, b), \bar{f}'(x) = \overline{\lim_{h \rightarrow 0}} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \underline{f}'(x) = \underline{\lim_{h \rightarrow 0}} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Тогда $\forall c \in \mathbb{R}^1$ можем записать:

$$\{x \in (a, b): \bar{f}' > c\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{0 < |h| < \frac{1}{n}} \{x \in (a, b): x+h \in (a, b) \wedge \frac{1}{h} \cdot (f(x+h) - f(x)) > c + \frac{1}{m}\}$$

Если обозначим множество в скобках за $E_{c,h,m}$, то так как $f(x) \in C((a, b))$, $\forall c, h, m$, $E_{c,h,m}$ - открытое множество $\Rightarrow \bigcup_{0 < |h| < \frac{1}{n}} E_{c,h,m}$ - тоже будет открытым, а далее операции - счётные и следовательно:

$$\{x \in (a, b): \bar{f}' > c\} \in \mathcal{M}$$

Аналогично проверяется непрерывность нижней производной. Тогда:

$$A = \{x \in (a, b): \exists f'(x)\} = \{x \in (a, b): \bar{f}'(x) = \underline{f}'(x)\}$$

где последнее множество измеримо по лемме 2. И отметим, что на A , $f'(x) = \bar{f}'(x)$, которая измерима, поэтому на множестве существования наша функция измерима. ■

Rm: 8. Заметим, что под существованием производной полагаем существование любой производной: конечной или бесконечной. То есть $f'(x)$ может равняться $\pm\infty$, это не запрещено. Согласно лемме 1, в частности измеримо то множество, на котором $f'(x)$ конечна (прообраз \mathbb{R}^1) \Rightarrow можно изменить эту теорему так, чтобы конечная $f'(x)$ была измеримой на множестве своего существования.

Rm: 9. Этот результат справедлив и для любой измеримой функции, вместо непрерывных функций.

Rm: 10. Равенство множеств проверяется тем, что если точка принадлежит левой части, то она принадлежит правой и наоборот.

Сходимость по мере и её свойства

В теории вероятности эта сходимость ещё называется сходимостью по вероятности. Пусть у нас есть измеримое пространство (X, \mathcal{M}, μ) .

Опр: 5. Пусть последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ и $f(x)$ измеримы и конечны на X . Тогда говорят, что $f_n(x)$ сходится по мере на X к $f(x)$ в том и только в том случае, когда:

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X: |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0$$

Или подробнее:

$$\forall \varepsilon > 0, \gamma > 0, \exists N: \forall n \geq N, \mu(\{x \in X: |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \gamma$$

Обозначение: $f_n \xrightarrow{\mu} f$ или $f_n \xrightarrow{\mu, X} f$.

Rm: 11. Здесь мы требуем конечности в каждой точке, но также возможно требовать измеримости функций на X и конечности почти всюду на X , а мера у нас полна.

Утв. 1. Предел по мере единственен с точностью до эквивалентности, то есть если:

$$f_n \xrightarrow{\mu} f, f_n \xrightarrow{\mu} g$$

то f эквивалентна g (то есть они совпадают почти всюду).

□ Пусть $k \in \mathbb{N}$, рассмотрим множество: $E_k = \{x \in X : |f(x) - g(x)| > \frac{1}{k}\}$, можно сказать:

$$\forall n, E_k \subseteq \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{2k}\} \cup \{x \in X : |f_n(x) - g(x)| > \frac{1}{2k}\}$$

Это вытекает из того, что в случае отрицания мы получаем, что обе разности меньше $\frac{1}{2k}$, тогда:

$$|f(x) - g(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x) - g(x)| \leq \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k} = \frac{1}{k}$$

Следовательно, отсюда мы получим:

$$\forall n, \mu(E_k) \leq \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{2k}\}) + \mu(\{x \in X : |f_n(x) - g(x)| > \frac{1}{2k}\}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Тогда $\mu(E_k) = 0$ и наконец:

$$A = \{x \in X : |f(x) - g(x)| > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \Rightarrow \mu(A) = 0$$

то есть функции отличаются друг от друга на множестве меры нуль \Rightarrow эквивалентны. ■

Теорема 5. Пусть $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}, f(x), \{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}, g(x)$ - измеримы и конечны на X , $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $g_n \xrightarrow{\mu} g$, тогда: $f_n(x) + g_n(x) \xrightarrow{\mu} f(x) + g(x)$.

□ Заметим, что $\forall \varepsilon > 0$ имеет место включение множества:

$$\begin{aligned} E_{f+g, \varepsilon, n} &= \{x \in X : |(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| > \varepsilon\} \subseteq \\ &\subseteq \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{x \in X : |g_n(x) - g(x)| > \frac{\varepsilon}{2}\} = E_{f, \frac{\varepsilon}{2}, n} \cup E_{g, \frac{\varepsilon}{2}, n} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \mu(E_{f+g, \varepsilon, n}) \leq \mu(E_{f, \frac{\varepsilon}{2}, n}) + \mu(E_{g, \frac{\varepsilon}{2}, n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow f_n + g_n \xrightarrow{\mu} f + g \end{aligned}$$
■

Пример: Пусть $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$, $x \in \mathbb{R}^1$, тогда $f_n(x) \xrightarrow{\mathbb{R}^1} f(x) = x \Rightarrow$ тем более $f_n(x) \xrightarrow{\mu, \mathbb{R}^1} f(x)$, где μ это классическая мера Лебега.

Пример: Рассмотрим $f_n^2(x) = x^2 + \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}$ и $f^2(x) = x^2$, следовательно: $f_n^2(x) - f^2(x) = \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}$, тогда:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mu(\{x \in \mathbb{R}^1 : |f_n^2(x) - f^2(x)| > 1\}) = \mu(\{x \in \mathbb{R}^2 : |\frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}| > 1\}) = \infty$$

где последнее верно в силу того, что независимо от отсечки, хвосты больше 1 находятся на множестве бесконечной меры. Таким образом, этот пример показывает, что тривиальной теоремы о сходимости произведения последовательностей для сходимости по мере - нет.