

Nmatrix (level 0) in KB

- $\mathcal{D} = \{4,5,6,7\}$

Subformulas

- $(\varphi_0) p$
- $(\varphi_1) \Diamond p$
- $(\varphi_2) \Box \Diamond p$
- $(\varphi_3) (p \rightarrow \Box \Diamond p)$

Id	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3
(1)	0	3	4	7
(2)	0	1	0	7
(3)	0	0	0	7
(4)	1	4	3	7
(5)	1	4	1	7
(6)	1	4	1	6
(7)	1	4	0	6
(8)	1	6	3	7
(9)	1	6	1	7
(10)	1	6	1	6
(11)	1	6	0	6
(12)	1	7	4	6
(13)	1	7	6	7
(14)	1	7	6	6
(15)	1	7	7	7
(16)	2	2	5	5
(17)	3	4	3	7
(18)	3	4	1	6
(19)	3	4	0	4

Id	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3
(20)	3	6	3	7
(21)	3	6	1	6
(22)	3	6	0	4
(23)	3	7	4	4
(24)	3	7	6	6
(25)	3	7	7	7
(26)	4	3	4	7
(27)	5	2	5	5
(28)	6	7	4	6
(29)	6	7	6	7
(30)	6	7	6	6
(31)	6	7	7	7
(32)	7	7	4	4
(33)	7	7	6	6
(34)	7	7	7	7