Nmatrix (level 0) in KT45

- $\mathcal{D} = \{\mathbf{t}, \mathbf{T}\}$

Subformulas

- (φ_0) p
- (φ_1) q
- (φ_2) $(p{\to}q)$
- (φ_3) $\Box p$
- (φ_4) $\Box q$
- (φ_5) $\Box(p{\to}q)$
- (φ_6) $(\Box p{\to}\Box q)$
- (φ_7) $(\Box(p{\to}q){\to}(\Box p{\to}\Box q))$

Id	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5	φ_6	φ_7
(1)	F	F	T	F	F	T	T	T
(2)	F	f	T	F	F	T	T	T
(3)	F	t	T	F	F	T	T	T
(4)	F	T	T	F	T	T	T	T
(5)	f	F	t	F	F	F	T	T
(6)	f	f	T	F	F	T	T	T
(7)	f	f	t	F	F	F	T	T
(8)	f	t	T	F	F	T	T	T
(9)	f	t	t	F	F	F	T	T
(10)	f	T	T	F	T	T	T	T
(11)	t	F	f	F	F	F	T	T
(12)	t	f	f	F	F	F	T	T
(13)	t	t	T	F	F	T	T	T
(14)	t	t	t	F	F	F	T	T
(15)	t	T	T	F	T	T	T	T

Id	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5	φ_6	φ_7
(16)	T	F	F	T	F	F	F	T
(17)	T	f	f	T	F	F	F	T
(18)	T	t	t	T	F	F	F	T
(19)	T	T	T	T	T	T	T	T