

Curso : Probabilidad y Estadística
Sigla : EAS200A
Pauta : Control 1
Profesores : Rafael Águila (Sec 01), Victor Correa (Sec 02),
Osvaldo Ferreiro (Sec 03) y Ricardo Olea (Sec 04)

En una ciudad se publican tres periódicos (A , B y C) con líneas editoriales distintas. Una encuesta de opinión, entregó los siguientes porcentajes

- El 10 % declara leer el periódico A .
- El 20 % declara leer el periódico B .
- El 30 % declara leer el periódico C .
- El 5 % declara leer el periódico A y además el B .
- El 3 % declara leer el periódico A y además el C .

No se registraron casos, que leyeran los periódicos B y C , por tener públicos objetivos totalmente distintos.

Justificando cada una de sus afirmaciones y utilizando la información de la encuesta como probabilidades teóricas, calcule:

- (a) [1.0 Ptos.] La probabilidad que un habitante de la ciudad lea los tres periódicos.
- (b) [1.5 Ptos.] La probabilidad que un habitante de la ciudad lea el periódico A y al menos uno de los otros dos.
- (c) [3.5 Ptos.] La probabilidad que un habitante de la ciudad solo lea uno de los tres periódicos.

Solución

- (a) Definamos los siguientes eventos (o sucesos):

A : Un habitante lee periódico A .

B : Un habitante lee periódico B .

C : Un habitante lee periódico C .

Del enunciado se deducen las siguientes probabilidades

$$P(A) = 0.1, \quad P(B) = 0.2, \quad P(C) = 0.3, \quad P(A \cap B) = 0.05, \quad P(A \cap C) = 0.03, \quad P(B \cap C) = 0 \quad [0.4 \text{ Ptos}]$$

Tenemos que

$$[0.2 \text{ Ptos}] \quad (A \cap B \cap C) \subseteq (B \cap C) \Rightarrow 0 \leq P(A \cap B \cap C) \leq P(B \cap C) = 0 \quad [0.2 \text{ Ptos}]$$

Por lo tanto

$$P(A \cap B \cap C) = 0 \quad [0.2 \text{ Ptos}]$$

(b) Se pide

$$\begin{aligned}P(A \cap [B \cup C]) &= P([A \cap B] \cup [A \cap C]), \quad \text{por ley distributiva} \quad [0.4 \text{ Ptos}] \\&= P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C), \quad \text{por ley aditiva} \quad [0.4 \text{ Ptos}] \\&= P(A \cap B) + P(A \cap C), \quad \text{por (a)} \quad [0.4 \text{ Ptos}] \\&= 0.05 + 0.03 \quad [0.2 \text{ Ptos}] \\&= 0.08 \quad [0.1 \text{ Ptos}]\end{aligned}$$

(c) Se pide

$$\begin{aligned}P([A \cap \overline{B} \cap \overline{C}] \cup [\overline{A} \cap B \cap \overline{C}] \cup [\overline{A} \cap \overline{B} \cap C]) &= P(A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) + P(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) + P(\overline{A} \cap \overline{B} \cap C), \quad \text{por ser eventos disjuntos} \quad [0.5 \text{ Ptos}] \\&= P(A \cap \overline{[B \cup C]}) + P(B \cap \overline{[A \cup C]}) + P(C \cap \overline{[A \cup B]}), \quad \text{por Morgan} \quad [0.5 \text{ Ptos}] \\&= \{P(A) - P(A \cap [B \cup C])\} + \{P(B) - P(B \cap [A \cup C])\} + \\&\quad \{P(C) - P(C \cap [A \cup B])\} \quad [1.0 \text{ Ptos}] \\&= P(A) + P(B) + P(C) - P([A \cap B] \cup [A \cap C]) - \\&\quad P([A \cap B] \cup [B \cap C]) - P([A \cap C] \cup [B \cap C]) \quad [0.5 \text{ Ptos}] \\&= P(A) + P(B) + P(C) - 2P(A \cap B) - 2P(A \cap C) - \\&\quad 2P(B \cap C) + 3P(A \cap B \cap C) \quad [0.5 \text{ Ptos}] \\&= 0.1 + 0.2 + 0.3 - 2 \cdot 0.05 - 2 \cdot 0.03 - 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \quad [0.3 \text{ Ptos}] \\&= 0.44 \quad [0.2 \text{ Ptos}]\end{aligned}$$

+ 1 Punto Base