



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
TAV 2023

Álgebra Lineal - MAT1203 Pauta Interrogación 4

1. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ las bases de los espacios vectoriales V y W respectivamente. Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal con la propiedad

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{d}_1 - 5\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_2) = -\mathbf{d}_1 + 6\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{d}_2$$

Determine la matriz para T respecto a \mathcal{B} y \mathcal{D} .

Solución La matriz T respecto a \mathcal{B} y \mathcal{D} es

$$[T] = \begin{bmatrix} [T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{D}} & [T(\mathbf{b}_2)]_{\mathcal{D}} & [T(\mathbf{b}_3)]_{\mathcal{D}} \end{bmatrix}.$$

Calculamos cada columna: $[T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{D}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, $[T(\mathbf{b}_2)]_{\mathcal{D}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$, $[T(\mathbf{b}_3)]_{\mathcal{D}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$. Por lo tanto

$$[T] = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -5 & 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

Puntaje

- 1,5 puntos por cada columna correcta (4,5 puntos en total)
- 1,5 puntos por escribir la matriz completa.

2. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

- (a) Si A es una matriz diagonalizable, entonces también es invertible.
- (b) Existen matrices de la forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ con $b \neq 0$ cuyos valores propios son 2 y 3.

Solución

- (a) Falso. La matriz nula es diagonalizable y no invertible.
- (b) Falso. Si $b \neq 0$ entonces sus valores propios son $\lambda = a \pm ib$ lo que corresponde a números complejos. Por lo tanto 2 y 3 no pueden ser valores propios.

Puntaje

- 1 punto por determinar correctamente si es verdadera o falsa cada afirmación (2 puntos en total).
- 2 puntos por justificar correctamente cada respuesta (4 puntos en total).

3. Sean $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $W = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

- (a) Encuentre la proyección de \mathbf{y} al plano W .
(b) Encuentre la distancia de \mathbf{y} al plano W .

Solución

- (a) Los vectores \mathbf{u}_1 y \mathbf{u}_2 son ortogonales. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \text{proy}_W(\mathbf{y}) &= \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|^2} \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{\begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}}{9 + 25 + 1} \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{\begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}{9 + 4 + 1} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- (b) La distancia de \mathbf{y} a W está dada por $\|\mathbf{y} - \text{proy}_W(\mathbf{y})\|$. Así:

$$\mathbf{y} - \text{proy}_W(\mathbf{y}) = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

por lo que

$$\|\mathbf{y} - \text{proy}_W(\mathbf{y})\| = \sqrt{4 + 0 + 36} = \sqrt{40}.$$

Puntaje

- 0,5 puntos por escribir una fórmula para calcular la proyección.
- 1 punto por calcular la proyección sobre cada vector de la base de W de manera correcta (2 en total)
- 0,5 puntos por calcular $\text{proy}_W(\mathbf{y})$ correctamente.
- 1 punto por establecer que la distancia corresponde a $\|\mathbf{y} - \text{proy}_W(\mathbf{y})\|$.
- 1 punto por encontrar el vector $\mathbf{y} - \text{proy}_W(\mathbf{y})$
- 1 punto por calcular correctamente la distancia.

4. Sean $A = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

- (a) Compruebe que \mathbf{v}_1 y \mathbf{v}_2 son vectores propios de A .
- (b) Identifique un tercer vector propio de A recordando que este debe ser ortogonal a los dos anteriores.
- (c) Diagonalice ortogonalmente la matriz A .

Solución

- (a) Notamos que

$$A\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix} = 10\mathbf{v}_1$$

y

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_2.$$

Esto significa que \mathbf{v}_1 es un vector propio de A asociado al valor propio 10 y \mathbf{v}_2 es un vector propio de A asociado al valor propio 1.

- (b) Un vector \mathbf{u} ortogonal a \mathbf{v}_1 y \mathbf{v}_2 cumple que $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u} = 0$ y $\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u} = 0$, es decir,

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y resolviendo el sistema tenemos $\mathbf{u} = \alpha \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, un vector ortogonal a los dos anteriores es $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$. Comprobamos ahora que \mathbf{v}_3 es también un vector propio de A :

$$A\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_3.$$

Por lo tanto \mathbf{v}_3 es otro valor vector propio de A asociado al valor propio 1.

- (c) Como $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ son una base ortogonal de vectores propios de A , basta definir P como la matriz cuyas columnas son los vectores normalizados y D la matriz diagonal de valores propios correspondientes, es decir,

$$P = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{18} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \\ 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} \end{bmatrix} \text{ y } D = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

para que $A = PDP^T$.

Puntaje

- 1 punto por comprobar que cada vector dado es un vector propio. Considerar también si el/la estudiante usa polinomio característico y calcula los espacios propios correspondientes (2 puntos en total).
- 2 puntos por determinar un vector ortogonal a los vectores dados. Considerar también si lo hace mediante Gram-Schmidt al ortogonalizar una base de un espacio propio.
- 1 punto por definir correctamente P . Asignar sólo 0,5 puntos si olvida normalizar.
- 1 punto por definir correctamente D .