


MAT1630 ★ Cálculo III
 Solución Interrogación 1

1. Sea C la curva de todos los puntos (x, y) en el primer cuadrante de \mathbb{R}^2 que satisfacen lo siguiente: [distancia entre (x, y) y el eje y] = [distancia entre (x, y) y el punto $(1, 2)$]. Escriba de manera paramétrica la curva C y bosquejela.

Solución. Notemos que

$$\begin{aligned} C &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, [\text{distancia entre } (x, y) \text{ y el eje } y] = [\text{distancia entre } (x, y) \text{ y el punto } (1, 2)]\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x = \frac{y^2 - 4y + 5}{2}\} \end{aligned}$$

Es una parábola, y su bosquejo está dado por:



Y una parametrización puede ser

$$x(t) = \frac{t^2 - 4t + 5}{2}, \quad y(t) = t, \quad t \in [0, +\infty[.$$

2. Si C es una curva plana parametrizada por $(2 \cos^3(\theta), 2 \sin^3(\theta))$, $\theta \in [0, \pi/2]$, encuentre el área de la superficie obtenida al rotar la curva C en torno al eje x .

Solución. Calculamos la norma del vector tangente a la curva dada,

$$\begin{aligned} T(\theta) &= 2(-3 \cos(\theta)^2 \sin(\theta), 3 \sin(\theta)^2 \cos(\theta)) . \\ \|T(\theta)\| &= 6|\sin(\theta) \cos(\theta)|. \end{aligned}$$

Notamos que la distancia de la curva con respecto al eje x corresponde a $2 \sin(\theta)^3$.

Por tanto el área de la superficie de revolución que se genera al rotar la curva con respecto al eje x es

$$A = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin(\theta)^3 6 |\sin(\theta) \cos(\theta)| d\theta = 24\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\theta)^4 \cos(\theta) d\theta = 24\pi \int_0^1 x^4 dx = \frac{24\pi}{5}.$$

3. a) Considere la curva $C = \{(x, 1/x) : x \geq 1\}$. Sea V el sólido obtenido al rotar el área bajo la curva C en torno al eje x . ¿Es el volumen de este sólido finito o infinito?. Sea S la superficie de revolución obtenida al rotar la curva C en torno al eje x . ¿Es el área de esta superficie finita o infinita?. Justifique su respuesta.
- b) Sea C la curva en polares parametrizada por $r = e^{-\theta}, \theta \geq 0$. Bosqueje la curva. ¿Es el largo de esta curva finito o infinito? Si es infinito demuéstrela, si es finito calcule el largo de la curva.

Solución:

- a) Considerando la curva paramétrica dada, con parámetro x , el volumen de el sólido V es:

$$\text{Vol}(V) = \int_C \pi y^2 dx = \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \pi \int_1^R \frac{1}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} -\frac{1}{R} + 1 = 1.$$

Por otro lado, el elemento de arco de la curva C es


$$ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx.$$

Y el area de la superficie de rotación S es:

$$\begin{aligned} \text{Area}(S) &= \int_C 2\pi y ds = 2\pi \int_1^\infty \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx \\ &\geq 2\pi \int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} 2\pi \int_1^R \frac{1}{x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} 2\pi \ln(R) - 0 = \infty \end{aligned}$$

Donde la desigualdad se cumple ya que $\frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} \geq \frac{1}{x}$ para todo $x > 0$, en particular en todo el intervalo de integración. Por lo tanto el area de S es infinita.

- b) La curva C es un espiral que comienza en $(1, 0)$ y al aumentar el ángulo θ el radio disminuye hacia 0.



Para calcular el largo calculamos el elemento de arco que en coordenadas polares es


$$ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = \sqrt{e^{-2\theta/2\pi} + \frac{e^{-2\theta/2\pi}}{4\pi^2}} d\theta = \sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} e^{-\theta/2\pi} d\theta$$

Así el largo de curva es

$$\begin{aligned} L(C) &= \int_C ds = \int_0^\infty \sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} e^{-\theta/2\pi} d\theta = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} e^{-\theta/2\pi} d\theta \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} -\sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} \frac{e^{-R/2\pi}}{2\pi} + \sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} \frac{e^0}{2\pi} = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}}}{2\pi}. \end{aligned}$$

4. Bosqueje la curva plana parametrizada en polares como $r = 1 + \cos(\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi]$ y calcule el área encerrada por esta curva.

Solución. La curva es una cardiode, la gráfica de la curva se muestra a continuación.



Ahora bien, el área encerrada por la curva es

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [1 + \cos \theta]^2 d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1}{2} (1 + \cos(2\theta)) \right) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \theta + 2 \sin \theta + \frac{1}{4} \sin(2\theta) \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3}{2} \pi.
 \end{aligned}$$

5. a) (4pts) Encuentre una representación paramétrica de la curva obtenida al intersectar el casquete esférico de radio 2 centrado en el origen, con la superficie parametrizada por $\{(t \cos(t), t \sin(t), z) : t > 0, z > 0\}$.
- b) (2pts) Calcule el vector tangente a la curva de a) en el punto $(0, \pi/2, \sqrt{4 - \pi^2/4})$.

Solución.

- a) Los puntos $P(x, y, z)$ de la curva deben satisfacer simultaneamente $x = t \cos(t)$, $y = t \sin(t)$, $z = z$ con $t > 0$, $z > 0$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Una parametrización obvia es $\vec{r}(t) = (t \cos(t), t \sin(t), \sqrt{4 - t^2})$.

La curva baja sobre el casquete esférico desde $(0, 0, 2)$ hasta $(2 \cos(2), 2 \sin(2), 0)$, sin incluir los extremos, por lo tanto $t \in (0, 2)$.

- b) Para esta parametrización el punto $\left(0, \frac{\pi}{2}, \sqrt{4 - \frac{\pi^2}{4}}\right)$ se obtiene para $t = \frac{\pi}{2}$.

Se tiene que $\vec{r}'(t) = \left(\cos(t) - t \sin(t), \sin(t) + t \cos(t), -\frac{t}{\sqrt{4 - t^2}}\right)$,

por lo tanto $\vec{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(-\frac{\pi}{2}, 1, \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{4 - \frac{\pi^2}{4}}}\right)$ es un vector tangente en el punto dado.

6. Reparametrizar la curva $r(t) = (\cosh(t), \sin(t), \cos(t))$ respecto a la longitud de arco medida desde $(1, 0, 1)$ en la dirección en que se incrementa t .

Solución. Tenemos que

$$r'(t) = (\sinh(t), \cos(t), -\sin(t)), \quad \|r'(t)\| = \sqrt{\sinh^2(t) + 1},$$

como $\cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$ y $\cosh(t) \geq 0$, obtenemos que $\|r'(t)\| = \cosh(t)$.

Luego, como $r(0) = (1, 0, 1)$, calculamos la función longitud de arco:

$$s(t) = \int_0^t \|r'(u)\| du = \int_0^t \cosh(u) du = \sinh(t).$$

Así,

$$t(s) = \sinh^{-1}(s) = \operatorname{arcsinh}(s) = \ln(s + \sqrt{s^2 + 1}).$$

Por lo tanto, la parametrización por longitud de arco o la arcoparametrización de la curva es:

$$r(s) = (\cosh(\operatorname{arcsinh}(s)), \sin(\operatorname{arcsinh}(s)), \cos(\operatorname{arcsinh}(s))), \quad s \in [0, \infty).$$