

MAT1610 ★ Cálculo I
 Interrogación 3
 Solución

1. a) Mediante la interpretación de la integral definida como área y sus propiedades, en un intervalo cerrado. Calcule

$$\int_{-a}^a \left\{ |x| + 2\sqrt{a^2 - x^2} - \sin(x) + 1 \right\} dx$$

- b) Aplicando la definición de la integral de Riemann y sin calcular el límite ni la sumatoria, demuestre


$$\int_0^a x^p dx = a^{p+1} \int_0^1 x^p dx$$

Ayuda: Divida el intervalo $[0, a]$ en n partes iguales.

Solución.

a)

$$\int_{-a}^a \left\{ |x| + 2\sqrt{a^2 - x^2} - \sin(x) + 1 \right\} = \int_{-a}^a |x| dx + 2 \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx - \int_{-a}^a \sin(x) dx + \int_{-a}^a dx$$



Así resulta

$$\int_{-a}^a \left\{ x + 2\sqrt{a^2 - x^2} - \sin(x) + 1 \right\} = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}\pi a^2 - 0 + 1[a - (-a)] = a^2 + \pi a^2 + 2a$$

- b) Demostración.

Efectuando la partición de $[0, a]$ en n partes iguales, se tiene $\Delta x = \frac{a}{n}$, entonces

$$\int_0^a x^p dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k^p \frac{a}{n}$$

$$\text{donde : } x_k = k\Delta x = \frac{ka}{n}, \text{ así}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{ka}{n} \right)^p \frac{a}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^p \frac{a^{p+1}}{n}$$

$$= a^{p+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^p \frac{1}{n} = a^{p+1} \int_0^1 x^p dx$$

donde en esta última integral se tiene que: $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_k = \frac{k}{n}$.

Criterios para la asignación de puntaje.

a)

Criterio 1 (a) (0.5 ptos.) por separar en cuatro integrales, por propiedad de la suma.

(Criterio 2 (a) (0.5 ptos.) por el valor de la primera integral.

Criterio 3 (a) (0.5 ptos.) por el valor de la segunda integral.

Criterio 4 (a) (0.5 ptos.) por el valor de la tercera integral. .

Criterio 5 (a) (0.5 ptos.) por el valor de la cuarta integral.

Criterio 6 (a) (0.5 ptos.) por el valor correcto de la integral.

(no asignar este puntaje si no a justificado los criterios anteriores y recuerde que no puede justificar con antiderivadas.)

b)

Criterio 1 (b) (1.0 pto.) Por escribir correctamente la integral de Riemann, tomando la subdivisión sugerida es decir $\Delta x = \frac{a}{n}$.

Criterio 2 (b) (0.5 pto.) Por indicar el x_k para esta partición del intervalo $[0, a]$.

Criterio 3 (b) (1.0 pto.) Por extraer el factor común a^{p+1} y la integral resultante.

Criterio 4 (b) (0.5 pto.) Por indicar el x_k para la partición del intervalo $[0, 1]$

2. a) Calcule

$$i) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x t \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) dt}{2x - x^2 - 1} \quad ii) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{2x}}$$

b) Considere que: $0 \leq \cos(x) \leq 1, \forall x \in [0, 1]$, para demostrar que

$$\ln(2) \leq \int_0^1 \frac{1 + \cos x}{1 + x} dx \leq \ln(4)$$

Solución.

a) i)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x t \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) dt}{2x - x^2 - 1} \left(\frac{0}{0}\right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{2 - 2x} \left(\frac{0}{0}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cdot \frac{\pi}{2}}{-2} = \frac{0 - 1 \cdot 1 \cdot \frac{\pi}{2}}{-2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

ii)

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{2x}} \Leftrightarrow \ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{2x}} \\ \ln L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \operatorname{sen} x)}{2x} \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \operatorname{sen} x} \\ \ln L &= \frac{1}{2} \Rightarrow L = e^{1/2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{2x}} = \sqrt{e} \end{aligned}$$

b) Dado que $0 \leq \cos(x) \leq 1 \Rightarrow 1 \leq 1 + \cos(x) \leq 2$

y que $1 + x > 0, \forall x \in [0, 1]$ entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &\leq \frac{1 + \cos(x)}{1+x} \leq \frac{2}{1+x} \\ \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx &\leq \int_0^1 \frac{1 + \cos(x)}{1+x} dx \leq 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\ \ln(1+x) \Big|_0^1 &\leq \int_0^1 \frac{1 + \cos(x)}{1+x} dx \leq 2 \ln(1+x) \Big|_0^1 \\ \ln(2) &\leq \int_0^1 \frac{1 + \cos(x)}{1+x} dx \leq 2 \ln(2) \\ \ln(2) &\leq \int_0^1 \frac{1 + \cos(x)}{1+x} dx \leq \ln(4) \end{aligned}$$

Criterios para la asignación de puntaje.

a)

Criterio 1 (a)i (0.5 ptos.) por aplicar correctamente la regla de L'Hopital ($\frac{0}{0}$), incluído el T. fundamental.

(Criterio 2 (a)i (0.5 ptos.) por L'Hopital ($\frac{0}{0}$), nuevamente, y la segundas derivadas correctas.

Criterio 3 (a)i (0.5 ptos.) por la evaluación correcta del límite y su resultado.

Criterio 4 (a)ii (0.5 ptos.) por notar que es de la forma (1^∞) y aplicar logaritmo.

Criterio 5 (a)ii (0.5 ptos.) por aplicar L'Hopital con las derivadas correctas.

Criterio 6 (a)ii (0.5 ptos.) por la evaluación correcta del límite y su resultado.

b)

Criterio 1 (b) (1.0 pto.) Por establecer la desigualdad que acota entre dos funciones a la función del integrando.

Criterio 2 (b) (1.0 pto.) Por aplicar la propiedad e integrar la desigualdad establecida, en el intervalo $[0, 1]$.

Criterio 3 (b) (1.0 pto.) Por el cálculo correcto de la antiderivada y llegar a la demostración pedida.

3. Calcule las siguientes integrales

a) $\int x \arctan(x) dx$

b) $\int \frac{x-1}{(x+1)(x^2+1)} dx$

c) $\int \frac{1-x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$, hacer $x = \sin(t)$

Solución.

a) Por partes, tomando cómo

$$u = \arctan(x) \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2}.$$
$$dv = x dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$$

se tiene:

$$\int x \arctan(x) dx = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

ahora para la integral

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan(x)$$

finalmente

$$= \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2}(x - \arctan(x)) + C.$$

b) Por fracciones parciales

$$\frac{x-1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$
$$x-1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)$$

de donde obtenemos: $A = -1$; $B = 1$; $C = 0$ y por tanto queda

$$\int \frac{x-1}{(x+1)(x^2+1)} dx = \int \left[\frac{-1}{x+1} + \frac{x}{x^2+1} \right] dx$$
$$= -\ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

c) Haciendo $x = \sin(t) \Rightarrow dx = \cos(t)dt$, resulta

$$\int \frac{1-x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1-\sin^3 t}{\sqrt{1-\sin^2 t}} \cos(t) dt$$
$$= \int (1 - \sin^3(t)) dt = \int dt - \int \sin^2(t) \sin(t) dt$$

ahora sea: $\cos(t) = u \Rightarrow -\sin(t)dt = du$, entonces

$$= t - \int (1-u^2)(-du) = t + u - \frac{u^3}{3} + C$$
$$= \arcsen(x) + \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{3} \left(\sqrt{1-x^2} \right)^3 + C$$

Criterios para la asignación de puntaje.

a)

Criterio 1 (a) (0.5 pto.) Por establecer la elección de las partes.

Criterio 2 (a) (0.5 pto.) Por la diferencial du y el valor correcto de la integral de dv .

Criterio 3 (a) (0.5 pto.) Por la integral de udv .

Criterio 4 (a) (0.5 pto.) Por el resultado final correcto , de la integral en cuestión, incluye la constante(si no coloca la constante no asignar los 0.5 ptos).

b)

Criterio 1 (b) (0.5 pto.) Por el cálculo correcto de las constantes, por separar en sus fracciones parciales.

Criterio 2 (b) (0.5 pto.) Por el resultado correcto de la primera integral.

Criterio 3 (b) (0.5 pto.) Por el resultado correcto de la segunda integral.

Criterio 4 (b) (0.5 pto.) Por el resultado final correcto, incluye la constante(si no coloca la constante no asignar los 0.5 ptos). c)


Criterio 1 (c) (0.5 pto.) Por usar el cambio de variable sugerido.

Criterio 2 (c) (0.5 pto.) Por obtener $t - \int \sin^3 t \, dt$.

Criterio 3 (c) (0.5 pto.) Por la integral del $\sin^3 t$.

Criterio 4 (c) (0.5 pto.) Por el resultado final correcto, incluye la constante(si no coloca la constante no asignar los 0.5 ptos)

4. Considere la región encerrada entre la curva $y = \text{sen}(x)$, $\forall x \in [0, \pi]$ y el eje X ,



para calcular

- El área de la región.
- El volumen del sólido que se genera al girar la región en torno al eje X .
- El volumen del sólido que se genera al girar la región en torno al eje Y .

Solución.

a)

$$\text{Área} = \int_0^{\pi} \text{sen}(x) dx = -\cos(x) \Big|_0^{\pi} = -(-1 - 1) = 2$$

b)

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^{\pi} \text{sen}^2(x) dx = \pi \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[x - \frac{\text{sen}(2x)}{2} \right] \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2} (\pi - 0) = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

$$\text{c) } V_y = 2\pi \int_0^{\pi} x \text{sen}(x) dx$$

Integrando por partes : $u = x \Rightarrow du = dx$

$$dv = \text{sen}(x) dx \Rightarrow v = -\cos(x)$$

$$\begin{aligned} v_y &= 2\pi \left(-x \cos(x) \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos(x) dx \right) \\ &= 2\pi (-\pi(-1) + \text{sen}(x) \Big|_0^{\pi}) \\ &= 2\pi^2 \end{aligned}$$

Criterios para la asignación de puntaje.

a)

Criterio 1 (a) (0.5 pts.) por expresar la integral que calcula el área en cuestión.

Criterio 2 (a) (1.0 pto.) por el cálculo correcto de la integral.

Criterio 3 (a) (0.5 pts.) por el valor correcto del área.

b)

Criterio 1 (b) (0.5 pts.) por expresar la integral que calcula el volumen en cuestión.

Criterio 2 (b) (1.0 pto.)por el cálculo correcto de la integral.

Criterio 3 (b) (0.5 ptos.) por el valor correcto del volumen V_x .

c)

Criterio 1 (c) (0.5 ptos.) por expresar la integral que calcula el área en cuestión.

Criterio 2 (c) (1.0 pto.)por el cálculo correcto de la integral.

Criterio 3 (c) (0.5 ptos.) por el valor correcto del volumen V_y .