

第八章 卒中康复管理

续表

		指南推荐内容	推荐级别	证据级别
卒中功能 障碍的康 复	构音障碍	各种测验与各类仪器以及软件结合使用更能够客观地描述构音障碍,以便确定更加有效的治疗方法	a类推荐	B级证据
		运动性言语障碍的干预应个体化,包括针对下列目标的行为学技术和策略:言语的生理学支持,包括呼吸、发声、发音和共鸣;言语生成的全局方面,例如音量、语速和韵律	类推荐	B级证据
		辅助性和替代性交流装置和治 疗方法应被用作言语治疗的补 充手段	类推荐	C级证据
		可考虑环境调整,包括听众教育,以改善交流效果	a类推荐	C级证据
		可考虑使用促进社交参与和提 高社会心理健康的活动	a类推荐	C级证据
		当面对面评估不可能或不切实 际时, 远程康复是合理的	a类推荐	A级证据
		使用个体化干预措施治疗认知 交流障碍是合理的,治疗目标 包括:影响韵律、理解力、言语 表达和语言运用的明显交流障碍;伴随或引起交流障碍(包括 注意力、记忆力和执行功能)的 认知缺陷	a类推荐	B级证据
		推荐对失语症患者进行失语症 康复治疗	类推荐	A级证据
		强化治疗很可能是有必要的,但关于最佳数量、强度、分布或 持续时间尚未达成共识	a类推荐	B级证据
		计算机治疗可作为言语和语言 治疗的补充手段	a类推荐	B级证据