

מבנים אלגבריים 2, 80446 — בכי לקראת מבחן

18 ביולי 2025



תוכן עניינים

1	מלא הגדרות ונגזרותיהן	3
1.1	הרחבות אלגבריות	3
1.2	שדות סגורים אלגברית	3
1.3	חבורת האוטומורפיזמים של הרחבת שדות	3
1.4	שדה פיצול של פולינום	4
1.5	הרחבות ספרביליות	4
1.6	הרחבות נורמליות	5
2	איך נעה מפרקת	6
3	דוגמאות	7
3.1	הרחבות פרידות והרחבות אי־פרידות	7
3.2	הרחבות לא נורמליות ונורמליות	7
4	משפטים להוכחה במבחן	8
4.1	תנאים שקולים להרחבה נוצרת סופית	8
4.2	לכל שדה קיים סגור אלגברי	9
4.3	שדה המרוכבים הוא סגור אלגברית	10
4.4	על פרובניוס ושדות סופיים מחזקות p	11
4.5	כל הרחבה ספרבילית סופית היא פרימיטיבית	12
4.6	משפט ארטין	13
4.7	התאמת גלואה	14
4.8	הלמה השנייה של גאוס	15
4.9	טענה 8.4.2 ברשומות של מיכאל	16
4.10	טענה על הרחבות ציקלוטומיות תחת תנאי יפה	17

1 מלא הגדרות ונגזרותיהן

1.1 הרחבות אלגבריות

הגדרה 1.1 (איבר אלגברי, איבר טרנסצנדנטי): בהינתן הרחבה E/F ו- $\alpha \in E$, נגיד ש- α אלגברי מעל F אם קיים $f(t) \in F[t]$ כך שמתקיים $f(\alpha) = 0$, אחרת נגיד ש- α נקרא טרנסצנדנטי מעל E .
אם $\text{char}(E) = 0$ אז $\alpha \in E$ אלגברי או טרנסצנדנטי אם הוא אלגברי או טרנסצנדנטי מעל \mathbb{Q} .
נשים לב לתנאי טוב עבור אלגבריות:

$$\alpha \text{ אלגברי מעל } F \iff [F(\alpha) : F] < \infty$$

הגדרה 1.2 (פולינום מינימלי): הפולינום המינימלי של m_α של α מעל שדה הוא הפולינום המתוקן בעל המעלה המינימלית בתוך שדה הפולינומים שלנו שמאפס את α .

כדי להראות שפולינום הוא מינימלי, צריכה להתקיים השלשה הבאה:

1. $f_{\alpha/F}(\alpha) = 0$

2. f פולינום מתוקן

3. f אי-פריק

הגדרה 1.3 (הרחבה אלגברית): הרחבת שדות E/F נקראת אלגברית אם כל $\alpha \in E$ הוא אלגברי מעל F (אחרת ההרחבה נקראת טרנסצנדנטית).

הגדרה 1.4 (הרחבה נוצרת סופית): הרחבה E/F נקראת נוצרת סופית אם קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in E$ כך שמתקיים $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$

משפט 1.1 (תנאים שקולים להרחבה נוצרת סופית): תהי E/F הרחבת שדות אז הבאים שקולים

1. E/F סופית

2. E/F נוצרת סופית ואלגבריות

3. $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ אלגבריים

טענה 1.1 (אריתמטיקה של אלגבריים):

1. אם α, β אלגבריים מעל F ו- $\beta \neq 0$ אז גם $\alpha \cdot \beta, \alpha \pm \beta, \frac{\alpha}{\beta}$ אלגבריים מעל F

2. אם α, β אלגבריים מעל F אז $\deg(\alpha + \beta) \leq \deg(\alpha) \cdot \deg(\beta)$ (זה נובע מהדרגה של הרזולטנטה)

3. אם $K/F, L/K$ הרחבות אלגבריות של שדות אז גם L/F הרחבה אלגברית

הגדרה 1.5 (הרחבה פרימיטיבית): הרחבה E/F נקראת הרחבה פרימיטיבית/פשוטה אם היא נוצרת על-ידי איבר אחד, והאיבר הזה ייקרא האיבר הפרימיטיבי של ההרחבה.

1.2 שדות סגורים אלגברית

הגדרה 1.6: שדה סגור אלגברית (algebraically closed)

[נגיד כי שדה F סגור אלגברית אם לכל פולינום ממעלה גדולה מ-1 ב- $F[x]$ יש שורש ב- F (כלומר, אם השדה סגור אלגברית אז כל פולינום ניתן לפירוק).

אם f פולינום מתפרק לגורמים לינאריים נגיד שהוא מתפצל לחלוטין.)

הגדרה 1.7 (סגור אלגברי (algebraic closure)): השדה E הוא סגור אלגברי של F אם E/F הרחבה אלגברית ו- E סגור אלגברית.

1.3 חבורת האוטומורפיזמים של הרחבת שדות

הגדרה 1.8: חבורת האוטומורפיזמים של הרחבת שדות

L/K הרחבת שדות

$$\text{Aut}(L/K) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) \mid \forall x \in K \sigma(x) = x\}$$

טענה 1.2 (חבורת האוטומורפיזמים של הרחבות אלגבריות פשוטות):

1. אם $L = K(\alpha)$ הרחבת שדות פשוטה אז כל $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ נקבע לחלוטין על-ידי $\sigma(\alpha)$
2. $L = K(\alpha)$ הרחבת שדות אלגברית פשוטה ו- $m_\alpha \in K[x]$ הפולינום המינימלי של α מעל K , אז
 1. לכל $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ התמונה $\sigma(\alpha)$ היא שורש מתוך L של הפולינום המינימלי m_α
 2. לכל β שורש של m_α ב- L קיים ויחיד $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ כך ש- $\sigma(\alpha) = \beta$
3. L/K הרחבה אלגברית פשוטה אז $|\text{Aut}(L/K)| \leq [L : K]$ ויש שיויון אם ורק אם הפולינום המינימלי m_α מתפצל לגורמים לינאריים שונים ב- L

הגדרה 1.9 (שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n): יהי $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq n$. **שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n** הוא שורש יחידה שלכל $1 \leq m < n$ מתקיים $\xi^m \neq 1$.

טענה 1.3 (חבורת האוטומורפיזמים של הרחבות צקלוטומיות): ניקח K שדה ו- \bar{K} הסגור האלגברי שלו.

- עבור $n \geq 2$, $\exists \xi \in \bar{K}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n בתוך \bar{K} הוא $\xi \in \bar{K}$ שמקיים $\xi^n = 1$ אבל $\xi^m \neq 1$ לכל $1 \leq m < n$.
- נניח שיש $\xi \in \bar{K}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n וניקח $L = K(\xi)$, הרחבה זאת נקראת **הרחבה ציקלוטומית**.
1. כל אוטומורפיזם $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ שולח את ξ לאיבר מהצורה ξ^a עם $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (חבורת היחידות/כפלית של החוג $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)
 2. $\text{Aut}(L/K) \simeq G \leq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

1.4 שדה פיצול של פולינום

הגדרה 1.10 (שדה פיצול): יהי $f \in K[x]$. שדה ההרחבה L/K ייקרא **שדה פיצול** של f אם

1. f מתפצל ב- L (מתפרק לחלוטין לגורמים לינאריים)
2. L מינימלי עם תכונה זו ביחס להכלת שדות (אם $K \subseteq L' \subseteq L$ ו- f מתפצל כבר מעל L' אז $L' = L$)
3. שדה פיצול של פולינום הוא יחיד עד-כדי איזומורפיזם

1.5 הרחבות ספרביליות

הגדרה 1.11 (שורש פשוט): נאמר ש- $\alpha = \alpha_i \in L$ הוא **שורש פשוט (simple root)** של f אם הוא מופיע בידיוק פעם אחת בפיצול. כלומר, $(t - \alpha) \nmid f$ אבל $(t - \alpha)^2 \nmid f$.

הגדרה 1.12 (שורש מרובה): נאמר ש- $\alpha = \alpha_i \in L$ הוא **שורש מרובה (multiple root)** של f אם הוא מופיע בפיצול לכל הפחות פעמיים. כלומר אם $(t - \alpha)^2 \mid f$.

הגדרה 1.13 (פולינום ספרבילי): הפולינום $f \in K[t]$ נקרא **ספרבילי/פריד** אם אין לו שורשים מרובים בשדה ההרחבה L בו הוא מתפצל.

טענה 1.4 (תנאים לספרביליות):

1. פולינום הוא ספרבילי אם ורק אם $\gcd(f, f') = 1$
2. בשדה ממצוין 0 כל פולינום אי-פריק הוא ספרבילי

הגדרה 1.14 (איבר ספרבילי): $\alpha \in L$ ייקרא **ספרבילי/פריד** מעל K אם הפולינום המינימלי שלו מעל K הוא ספרבילי.

הגדרה 1.15 (הרחבה ספרבילית): הרחבה L/K שכל איבריה ספרביליים תקרא **הרחבה ספרבילית**.

טענה 1.5 (טענות על הרחבות ספרביליות):

1. בשדה ממצוין 0, כל הרחבה אלגברית היא הרחבה ספרבילית
2. ספרביליות היא תכונה טרנזיטיבית – אם L/K הרחבה ספרבילית ו- $K \subseteq M \subseteq L$ הוא שדה ביניים אז M/K , L/M הן הרחבות ספרביליות
3. אם אנחנו במצוין $p \neq 0$ ו- $\gcd([L : K], p) = 1$ אז L/K הרחבה ספרבילית
4. תנאים שקולים לספרביליות
 1. ההרחבה L/K היא ספרבילית
 2. יש קבוצת יוצרים של L מעל K שכל איבריה ספרביליים
 3. כל קבוצת יוצרים של L מעל K מורכבת מאיברים ספרביליים
 5. פיצול של פולינום ספרבילי הוא הרחבה ספרבילית
 6. כל הרחבה סופית פרידה היא פרימיטיבית

1.6 הרחבות נורמליות

הגדרה 1.16 (הרחבת שדות נורמלית): הרחבת שדות אלגברית L/K נקראת נורמלית אם כל פולינום אי־פריק מעל K עם שורש ב־ L מתפצל לחלוטין ב־ L .

בדומה לכך שנורמליות של חבורות זו לא תכונה טרנזיטיבית, גם נורמליות של הרחבות איננה טרנזיטיבית (יש מקרים תחת תנאים מסויימים שכן, כמו לדוגמה שאם L/K הרחבה נורמלית סופית ו־ M שדה ביניים אז גם L/M הרחבה נורמלית)

2 איך נעה מפרקת

באלימות ובמכות, אבל לפעמים יש גם שיטות הגיוניות.

3 דוגמאות

3.1 הרחבות פרידות והרחבות אי-פרידות

3.2 הרחבות לא נורמליות ונורמליות

דוגמה 3.1: נבנה הרחבות נורמליות $F/K, L/F$ כך שהרחבה L/K לא נורמלית. נבחר $K = \mathbb{Q}, F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$. אנחנו כבר יודעים ש- $F/K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ היא נורמלית (הרחבה ריבועית היא נורמלית) וגם $L/K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ היא איננה נורמלית כי הפולינום המינימלי של ההרחבה הוא $x^4 - 2$ ולא כל השורשים נמצאים בהרחבה $(i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2})$. נטען כעת שהרחבה $L/F = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ היא נורמלית. נסתכל על הפולינום $x^2 - \sqrt{2}$ הוא אי-פריק מעל $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ושורשיו הם $\pm\sqrt[4]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ וזו בדיקת ההגדרה לנורמליות (כי הוא מתפצל לחלוטין עכשיו ב- L), ולכן L/F הרחבה נורמלית.

4 משפטים להוכחה במבחן

4.1 תנאים שקולים להרחבה נוצרת סופית

משפט 4.1: תהי E/F הרחבת שדות אז הבאים שקולים

1. E/F סופית

2. E/F נוצרת סופית ואלגברית

3. $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ אלגבריים

הוכחה:

$1 \Rightarrow 2$ מהסופיות ברור שמתקיים (מהגדרה)

$$[F(\alpha) : F] < \infty \iff \alpha \text{ אלגברי מעל } F$$

ולכן זו הרחבה אלגברית (בפרט לכל $\alpha \in E$ מתקיים $[F(\alpha) : F] \leq [E : F]$) ולכן $[E : F] = n$ אז $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ בסיס של E מעל F ולכן $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

$2 \Rightarrow 3$ אם E/F נוצרת סופית ואלגברית אז יש לה קבוצת יוצרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ והיות וההרחבה אלגברית בפרט $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ אלגבריים.

$3 \Rightarrow 1$ נסמן n_1, \dots, n_k הדרגות של $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ בהתאמה, עלינו להראות $[E : F] \leq n_1 n_2 \dots n_k$.

לכל $1 \leq i \leq k$ נסמן $E_i = F(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$ וכן $E_0 = F$, נשים לב כי אם מתקיים $[E_i : E_{i-1}] \leq n_i$ אז מכפלות הדרגה נקבל

$$[E : F] = [E_k : E_{k-1}] \cdot [E_{k-1} : E_{k-2}] \cdot \dots \cdot [E_2 : E_1] \cdot [E_1 : E_0] \leq n_k \cdot n_{k-1} \cdot \dots \cdot n_2 \cdot n_1$$

נזכר ש- $[E_i : E_{i-1}]$ זו הדרגה של הפולינום המינימלי של g_i מעל E_{i-1} , אבל $m_{\alpha_i}(x)$ הוא הפולינום המינימלי של α_i מעל F הוא בפרט

פולינום מעל השדה E_{i-1} (שמכיל את F) ומתקיים $g_i \mid m_{\alpha_i}$ ובפרט $[E_i : E_{i-1}] = \deg(g_i) \leq \deg(m_{\alpha_i}) = n_i$ □

4.2 לכל שדה קיים סגור אלגברי

משפט 4.2: לכל שדה K קיים סגור אלגברי \overline{K}/K .

הוכחה: נוכיח תחילה למה:

למה 4.1: נניח כי שדה K שדה ו- L/K הרחבה אלגברית, אזי $\kappa = |K|$. אזי $|L| \leq \max\{\kappa, \aleph_0\}$.
 לכן, המקרה היחיד שיתקיים $|L| > |K|$ זה כאשר K סופית ו- L בת-מנייה.
 הוכחה: נבחן את $K[t]$. קבוצת הפולינומים מדרגה לכל היותר d היא מעוצמה של κ^{d+1} .
 אם K אינסופית, אז $\kappa^n = \kappa$ משיקולי עוצמות וזה נכון גם במקרה שבו אנחנו עושים איחוד בן-מנייה של κ , ולכן $|K[t]| = \kappa$.
 אם K סופית אזי $|K[t]| = \aleph_0$ (ראינו גם בתורת הקבוצות).
 נגדיר העתקה $K[t] \rightarrow L$ על-ידי $\alpha \mapsto f_{\alpha/K}$ (כל $\alpha \in L$ ממופה לפולינום המינימלי שלו).
 נשים לב שהעתקה זאת ממפה לסיבים סופיים (שכן המקור של כל פולינום $f \in K[t]$ מכיל את כל השורשים שלו ב- L), ולכן

$$|L| \leq \aleph_0 \cdot \max\{\kappa, \aleph_0\} = \max\{\kappa, \aleph_0\}$$

□

כעת, ניזכר בהגדרה ממבנים 1:

הגדרה 4.1 (סיב): תהיינה A, B קבוצות ו- $f: A \rightarrow B$. סיב (fiber) של הפונקציה הוא תת-קבוצה של A שהיא קבוצת המקורות של איבר ב- B , כלומר תת-קבוצה מהצורה

$$f^{-1}(b) = \{a \in A \mid f(a) = b\}$$

ניזכר שראינו במבנים 1 שלמת הגרעין (למה 3.13 בספר) אומרת במילים אחרות שהסיבים של הומומורפיזם $\varphi: G \rightarrow H$ הם בידיוק המחלקות של הגרעין N ולכן G/N יש מבנה של חבורה.

נבחר $K \subset U$ כך ש- $|U| > \max\{|K|, \aleph_0\}$ (כאשר U מלשון universe).
 נבחן את \mathcal{V} , קבוצת כל השלשות $(L, +, \cdot)$ משמע קבוצת כל תתי-קבוצות $K \subseteq L \subset U$ ופעולות $L^2 \rightarrow L$ ו- $L^2 \rightarrow R$, כך שהפעולות הופכות את L לשדה ואפילו להרחבה אלגברית L/K ובפרט $\cdot|_K = \cdot_K, +|_K = +_K$.
 נסדר באמצעות יחס-סדר חלקי $(L, +, \cdot) \leq (F, +, \cdot)$ אם $L \subseteq F$ והפעולות על F מסכימות עם הפעולות על L (משמע F/L הרחבת שדות ולא רק הרחבת קבוצות) ולכן \mathcal{V} היא קבוצה סדורה חלקית.
 נניח בנוסף כי $\{(L_i, +, \cdot)\}_{i \in I} \mathcal{V}$ שרשרת של שדות ולכן קיים לה חסם עליון $L = \bigcup_{i \in I} L_i$ (ואכן, כל $a, b \in L$ מוכל ב- L_i עבור i כלשהו, ונגדיר $a +_L b = a +_{L_i} b$ ובאותו אופן נגדיר מכפלה ואז נקבל כי L הוא שדה וכל $a \in L$ מוכל ב- L_i כלשהו ולכן אלגברי מעל K).
 לפי הלמה של צורן, קיים איבר מקסימלי $(\overline{K}, +, \cdot) \in \mathcal{V}$ ונטען כי \overline{K} הוא סגור אלגברי ולכן אלגברי מעל K : נניח שלא כך, ולכן קיימת הרחבה אלגברית לא טריוויאלית L/\overline{K} . היות ו- $|L| < |U|$, מהלמה לעיל נובע שקיים שיכון (של קבוצות) $\varphi: L \hookrightarrow U$ שמרחיב את ההכלה $\overline{K} \subset U$ אבל אז $(\varphi(L), +, \cdot)$ הוא האיבר המקסימלי, ב- \mathcal{V} וזו סתירה להנחה כי L חסם-עליון.

4.3 שדה המרוכבים הוא סגור אלגברית

משפט 4.3: השדה \mathbb{C} הוא סגור אלגברית.

הוכחה: נזכר בשתי טענות:

1. לכל $f \in \mathbb{R}[t]$ מדרגה אי-זוגית יש שורש ב- \mathbb{R} – זה נובע ממשפט ערך הביניים: f רציפה ומתקיים $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \infty$, $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = -\infty$ ולכן בפרט יש שורש.

2. השדה \mathbb{C} סגור להוצאת שורש

כעת, נניח שלא כך ולכן יש L/\mathbb{C} הרחבה אלגברית ולכן גם L/\mathbb{R} אלגברית.

היות ו- $\text{char}(\mathbb{R}) = \text{char}(\mathbb{C}) = 0$ נובע שכל פולינום אי-פריק הוא ספרבילי ולכן ההרחבה היא ספרבילית ולכן ניקח $L^{\text{gal}}/\mathbb{R}$ ונגדיר $G = \text{Gal}(L^{\text{gal}}/\mathbb{R})$.

ניקח $H \leq G$ תת-חבורה 2-סילו ולכן $\{e\} \leq H \leq G$ ונקבל שיש שדה ביניים $L^{\text{gal}}/F/\mathbb{R}$ כאשר $F = (L^{\text{gal}})^H$. אז $[F : \mathbb{R}] = \frac{|G|}{|H|}$ מספר אי-זוגי, זה מכיוון ש- H חבורת 2-סילו ולכן לכל $\alpha \in F$ מתקיים $\deg(f_{\alpha/\mathbb{R}})$ אי-זוגי, שכן

$$\deg(f_{\alpha/\mathbb{R}}) = [\mathbb{R}(\alpha) : \mathbb{R}] \mid [F : \mathbb{R}]$$

לכל פולינום כזה יש שורש ב- \mathbb{R} מהטענה הראשונה מתהזכורת ולכן יש ל- f_{α} שורש ב- \mathbb{R} ולכן $\alpha \in \mathbb{R}$ (אחרת, f_{α} פריק בסתירה להנחה).

אז $F = \mathbb{R}$, $H = G$ ולכן $L^{\text{gal}}/\mathbb{R}$ היא הרחבה מסדר זוגי $|G| = 2^n$ ולכן יש סדרה

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_n = G \quad (|G_i| = 2^i)$$

מהצד השני, מהתאמת גלואה קיבלנו

$$K_n \supset \dots \supset K_2 \supset K_1 \supset \mathbb{R} \quad ([K_i : K_{i-1}] = 2)$$

נניח ש- $n \leq 2$ (בהכרח מתקיים $n \geq 1$ כי $\mathbb{C} \subset L^{\text{gal}}$), אבל זו סתירה כי אז נקבל

$$\mathbb{R} \neq K_1 = \mathbb{R}(\sqrt{a})$$

אבל $a \in \mathbb{R}$ ולכן בהכרח $a < 0$ ואז $K_1 = \mathbb{C}$, אבל $K_2 = \mathbb{C}(\sqrt{a+bi}) \neq K_1$ אבל זו סתירה לטענה השנייה מהתזכורת, ולכן בהכרח $n = 1$ \square

$L = \mathbb{C}$ בסתירה לכך ש- L לא טריוויאלית, כנדרש.

4.4 על פרובניוס ושדות סופיים מחזקות p

TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

4.5 כל הרחבה ספרבילית סופית היא פרימיטיבית

משפט 4.4: נניח כי L/K הרחבה סופית ונניח בנוסף שהרחבה פרידה (ספרבילית). אז היא פרימיטיבית (קיים $\alpha \in L$ כך ש- $L = K(\alpha)$) ו- α נקרא איבר פרימיטיבי.

הוכחה: תחילה נוכיח למה:

למה 4.2: (משפט האיבר הפרימיטיבי חלק 1): תהיי L/K הרחבה סופית. אז L/K היא הרחבה פרימיטיבית אם ורק אם יש כמות סופית של שדות ביניים.

הוכחה: \Leftarrow תהיי L/K פרימיטיבית, כלומר $K = L(\alpha)$ ויהי F שדה ביניים. אז $f_{\alpha/F} = \sum_{i=1}^n a_i t^i$. יהי $K(a_0, \dots, a_n) = E \subset F \subset L$ אז $f_{\alpha/F} \in E[t]$ ולכן $f_{\alpha/F} \mid f_{\alpha/E}$ ובפרט הם שווים. לכן $[L : E] = \deg(f_{\alpha/E}) = \deg(f_{\alpha/F}) = [L : F]$ ולכן $E = F$ (כי $\frac{[L:E]}{[L:F]} = 1$). אז $F = K(a_1, \dots, a_n)$ נקבע ביחידות על-ידי $f_{\alpha/F}$ ואנחנו יודעים ש- $f_{\alpha/K} \mid f_{\alpha/F}$ ולכן יש רק כמות סופית של אפשרויות ל- $f_{\alpha/F}$ (מקסימום $2^{[L:K]} = 2^{\deg(f_{\alpha/K})}$ כי $f_{\alpha/K} = \prod_{i=1}^n (t - \alpha_i) \in \overline{K}[t]$ ואם אני רוצה פולינום שיחלק, צריך לבחור קבוצה כלשהי של שורשים ויש 2^n אפשרויות לכל היותר).

\Rightarrow נניח שיש כמות סופית של שדות ביניים, עבור $1 \leq i \leq m$ $K \subset F_i \subset L$

אם K סופי, אז אנחנו יודעים ש- L/K פרימיטיבית, אז נניח ש- K אינסופי ונוכיח באינדוקציה על $[L : K]$:

הבסיס של דרגה 1 הוא טריוויאלי ולכן נניח שהטענה מתקיימת לכל הרחבה מדרגה הקטנה ל- $[L : K]$.

נכתוב $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ הרחבה סופית וכן $E = K(\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1})$ (ואז $L = E(\alpha_r)$).

נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $L \neq E$ (אחרת נזרוק את α_r כי הוא מיותר).

מהנחת האינדוקציה, $E = K(\beta)$ כי ל- K יש רק מספר סופי של תתי-שדות.

ניקח סדרה אינסופית (מהנחה ש- K אינסופי) $c_1, c_2, \dots \in K$ וניקח $\gamma_i = \alpha + \beta c_i$ (צירופים לינאריים שונים של α, β).

נגדיר $F_j = K(\gamma_j)$ וקיימים $j \neq \ell$ כך ש- $F_j = F_\ell$ (כי יש כמות סופית של שדות ביניים וכמות אינסופית של איברים).

מתקיים $\beta = \frac{(\alpha + \beta c_\ell) - (\alpha + \beta c_j)}{c_\ell - c_j} = \frac{\gamma_\ell - \gamma_j}{c_\ell - c_j} \in F_j = F_\ell$ ולכן $\beta \in F_\ell$ ואז $\alpha = \gamma_\ell - c_\ell \beta \in F_\ell$ ואם $\alpha, \beta \in F_j$ כלומר

$$L = K(\alpha, \beta) \subset F_j = K(\alpha + c_j \beta) = K(\gamma_j)$$

וזה בדיקת אומר ש- L/K פרימיטיבית. □

אם כך, מספיק להוכיח שיש כמות סופית של שדות ביניים נסתכל על סגור גלואה L^{gal}/K (הסגור הנורמלי הוא סגור גלואה כי L/K פרידה) ומספיק להוכיח של- L^{gal}/K יש כמות סופית של שדות ביניים (כי $L \subset L^{\text{gal}}$).

מהתאמת גלואה לכל $K \subset F \subset L^{\text{gal}}$ מתקיים $F = L^{\text{Gal}(L/F)}$ ולכן F נקבע ביחידות על-ידי $\text{Gal}(L/F) \leq \text{Gal}(L/K)$ ויש כמות סופית כזאת □

כי $\text{Gal}(L/K)$ היא חבורה סופית.

4.6 משפט ארטין

משפט 4.5: L שדה ו- $H \leq \text{Aut}(L)$ חבורת אוטומורפיזמים סופית כלשהי, נסמן $F = L^H$. אז L/F הרחבת גלואה ו- $H = \text{Gal}(L/F)$.

הוכחה: יהי $\alpha \in L$ ונגדיר $\mathcal{C}_\alpha = H\alpha = \{\sigma(\alpha)\}_{\sigma \in H}$ ונגדיר $f_\alpha = \prod_{\alpha \in \mathcal{C}_\alpha} (t - \alpha)$.

כל $\sigma \in H$ מחליף גורמים ב- f_α ולכן $\sigma(f_\alpha) = f_\alpha$ כלומר $f_\alpha \in F[t]$ או $f_\alpha \mid f_{\alpha/F}$ ולכן $f_{\alpha/F}$ הוא פריד מדרגה חסומה על-ידי $|\mathcal{C}_\alpha|$.
נשאר להראות $|H| \leq [L : F]$: נניח שלא, אז $[L : F] > |H|$.

L/F אלגברית (כי H סופית ומתנאים שקולים) ופרידה, ולכן יש תת-הרחבה סופית $F \subset E \subset L$ כך שמתקיים $|H| > [E : F] > \infty$ ולכן לפי משפט האיבר הפרימיטיבי $E = F(\alpha)$.

אבל $\deg(f_{\alpha/F}) \leq |H|$ בסתירה להנחה.

אז $[L : F] \leq |H|$ וגם $H \leq \text{Aut}(L/F)$ אבל תמיד מתקיים $[L : F] \leq |\text{Aut}(L/F)|$ ולכן יש שיוויון, אבל שיוויון מתקיים אם ורק אם L/F היא הרחבת גלואה והכל שיוויונות ולכן $H = \text{Gal}(L/F)$, $[L : F] = |H|$.
□

4.7 התאמת גלואה

TOD00000000000000000000

4.8 הלמה השנייה של גאוס

משפט 4.6: כל פולינום פרימיטיבי $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ שהוא אי-פריק ב- $\mathbb{Z}[x]$ הוא גם אי-פריק ב- $\mathbb{Q}[x]$.

הוכחה: נזכר בשתי הגדרות

הגדרה 4.2 (תכולה): עבור פולינום $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ (תזכורת: $f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i$) נגדיר תכולה של f להיות

$$\text{cont}(f) = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n)$$

הגדרה 4.3 (פולינום פרימיטיבי): פולינום $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ יקרא פרימיטיבי אם $\text{cont}(f) = 1$.

הערה: לכל פולינום f יש פירוק ב- $\mathbb{Z}[t]$ הנתון על-ידי $f = \text{cont}(f) \cdot f_0(t)$ כאשר $f_0(t)$ הוא פולינום פרימיטיבי.

וניזכר בלמת גאוס הראשונה:

משפט 4.7 (למת גאוס הראשונה): אם $f, g \in \mathbb{Z}[t]$ אזי $\text{cont}(fg) = \text{cont}(f) \cdot \text{cont}(g)$. בפרט, fg פרימיטיבי אם ורק אם f ו- g פרימיטיביים.

הוכחה: מההערה לעיל מתקיים $f \cdot g = \text{cont}(f) \cdot \text{cont}(g) f_0 \cdot g_0$ ולכן מספיק להוכיח כי $f_0 \cdot g_0$ הוא פרימיטיבי:

נניח שלא ולכן קיים $p \in \mathbb{N}$ ראשוני כך שמתקיים $p \mid \text{cont}(f_0 \cdot g_0)$ אבל $p \nmid \sum_{i=0}^n a_i t^i, \sum_{j=0}^m b_j t^j$ הם פולינומים פרימיטיביים (ולכן פרימיטיביים

לא כל a_i, b_j מתחלקים ב- p ולכן נוכל לבחור m, n מינימליים כך ש- $p \nmid a_n$ ו- $p \nmid b_m$.

נסתכל על המקדם של $c = \sum_{k=0}^{m+n} a_k b_{m+n-k}$ של t^{m+n} ב- $f_0 \cdot g_0$, נכתוב אותו מפרשות:

$$\underbrace{a_0 b_{m+n} + \dots + a_{n-1} b_{m+1}}_{\text{מתחלקים ב־} p \text{ לִכֵּל } k < n} + a_n b_m + \underbrace{a_{n+1} b_{m-1} + \dots + a_{m+n} b_0}_{\text{מתחלקים ב־} p \text{ לִכֵּל } k > n}$$

אבל $a_n b_m$ זר לחלוקה ב- p ולכן $p \nmid c$ וזאת סתירה.

נוכיח למה שהייתה חלק מלמת גאוס השנייה:

למה 4.3: יהי $f \in \mathbb{Z}[t]$ פולינום לא קבוע. נזכור כי $\mathbb{Q}[t]$ הוא $\text{Frac}(\mathbb{Z})$, שדה השברים של $\mathbb{Z}[t]$.

אם $f = g \cdot h$ פירוק ב- $\mathbb{Q}[t]$ אזי קיים $c \in \mathbb{Q}^\times$ כך ש- $c \cdot g, c^{-1} \cdot h \in \mathbb{Z}[t]$ ולכן $f = (c \cdot g) \cdot (c^{-1} \cdot h)$ פירוק ב- $\mathbb{Z}[t]$

הוכחה: ניקח את הפירוק $f = g \cdot h$ עבור $g, h \in \mathbb{Q}[t]$ וניקח $0 < m, n \in \mathbb{Z}$ כך ש- $m \cdot g, n \cdot h \in \mathbb{Z}[t]$ ואז נקבל פירוק $m \cdot n \cdot f = m \cdot g \cdot n \cdot h$

$n \cdot h$ נסמן $\ell = \text{cont}(f)$, $\alpha = \text{cont}(m \cdot g)$, $\beta = \text{cont}(n \cdot h)$ מלמת גאוס הראשונה נקבל עם כפלויות התכולה

$$\text{cont}(m \cdot n \cdot f) = m \cdot n \cdot \ell = \alpha \cdot \beta = \text{cont}(m \cdot g \cdot n \cdot h)$$

□ $\cdot f = \ell \frac{m}{\alpha} \cdot g \cdot \frac{n}{\beta} \cdot h$ משמע $\frac{1}{\ell} \cdot f = \frac{m \cdot n \cdot f}{m \cdot n \cdot \ell} = \underbrace{\frac{m}{\alpha} \cdot g \cdot \frac{n}{\beta} \cdot h}_{\in \mathbb{Z}[t]}$ ונקבל $m \cdot n \cdot \ell = \alpha \beta$ ונחלק ב- $\alpha \beta$ $m \cdot n \cdot f = m \cdot g \cdot n \cdot h$ ניקח כך, ניקח

נשאר רק להוכיח את הטענה שלנו: נניח כי f אי-פריק ב- $\mathbb{Z}[t]$ ולכן $f = \text{cont}(f) \cdot \frac{f}{\text{cont}(f)}$ פירוק טריוויאלי ונשים לב $\deg\left(\frac{f}{\text{cont}(f)}\right) > 0$ ולכן $\text{cont}(f)$ הפיד ולכן f פרימיטיבי.

נניח ש- f פריק ב- $\mathbb{Q}[t]$ ולכן יש $f = g \cdot h$ כך ש- $\deg(g), \deg(h) > 0$ ולכן מהלמה לעיל נקבל $f = c \cdot g \cdot c^{-1} \cdot h$ עם דרגות גדולות מ-0 ב- $\mathbb{Z}[t]$ משמע הוא פריק בו, וזאת סתירה.

4.9 טענה 8.4.2 ברשומות של מיכאל

משפט 4.8 (8.4.2): יהי $n \in K^\times$, $\mu_n \subset K$ ו- L/K הרחבה ציקלית, אז קיים $\alpha \in L$ כך שמתקיים $L = K(\alpha)$ ו- $\alpha^n \in K$.

הוכחה: ניזכר בהגדרה

הגדרה 4.4 (חבורת μ_n , חבורת שורשי היחידה מסדר n): עבור K שדה ו- $n \in \mathbb{N}$ שדה $1 \leq n$ נגדיר

$$\mu_n(K) = \{\xi \in K \mid \xi^n = 1\}$$

$$\mu_\infty(K) = \bigcup_n \mu_n(K)$$

נשים לב ש- $\mu_n(K)$ היא תת-חבורה של K^\times מסדר המחלק את n (זוהי כמובן חבורה אבלית עם כפל).

עבור K שדה ו- $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq n$, אם $x^n - 1$ מתפצל לחלוטין ב- K נסמן $\mu_n(K) = \mu_n$ (שכן היא לא תשתנה תחת הרחבה של K) ונגיד במקרה זה ש- μ_n מתפצל ב- K .

נעבור להוכחה:

מכך שההרחבה ציקלית אנחנו יודעים שההרחבה וסופית ושמתיקים $G = \text{Gal}(L/K) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ולכן יש שיוצרת את ההרחבה. נזכר שמהגדרה

$$G = \text{Gal}(L/K) = \text{Aut}(L/K) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) \mid \forall x \in K \sigma(x) = x\}$$

נסתכל על ה- $L \rightarrow L$: הזאת כאופרטור K -לינארי (כלומר, מכבד את המבנה של K , משמע לכל $a, b \in K$ ולכל $x, y \in L$ מתקיים $\sigma(ax + by) = a\sigma(x) + b\sigma(y)$).

ניקח את $f_\sigma(t) = f_\sigma(t)$ הפולינום המינימלי של σ . היות וההרחבה סופית מדרגה n אז אנחנו יודעים מטעמי סדר שיתקיים $\sigma^n = 1$ ומכך ש- $\mu_n \subset K$, אנחנו מקבלים שהפולינום $t^n - 1$ מתפצל לחלוטין ב- K .

מכך ש- σ הוא אופרטור K -לינארי, מתקיים $\sigma^n - 1 = 0$ ולכן לפולינום $t^n - 1$ יש שורש שהוא σ .

מהגדרת הפולינום המינימלי הוא מחלק גם את $t^n - 1$ (כי σ שורש שלו).

מכך ש- $t^n - 1$ מתפצל לחלוטין ב- K אז הוא מהצורה

$$t^n - 1 = (t - \xi_0)(t - \xi_1) \cdots (t - \xi_{n-1})$$

ובהכרח השורשים שלו (שורשי היחידה) הם שונים זה מזה, כי $(t^n - 1)' = nt^{n-1}$, אבל השורש היחיד של nt^{n-1} הוא רק עבור $t = 0$ ($n \neq 0$). אז לפי טענה שראינו נובע שאין לו שורשים מרובים ולכן כל השורשים שלו שונים זה מזה, אז כל השורשים שונים זה מזה והפיצול שראינו לעיל הוא פיצול לינארי.

ניזכר שבלינארית ראינו שאופרטור הוא אלכסוני מעל שדה אם קיים בסיס של המרחב הוקטורי שמכיל את כל הוקטורים העצמיים של האופרטור, ובמקרה שלנו זה שקול ללהגיד שהפולינום המינימלי של האופרטור מתפצל לחלוטין מעל השדה - כפי שמצאנו.

לכן יש לנו בסיס של וקטורים עצמיים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ עבור הערכים העצמיים $\xi_1, \dots, \xi_n \in \mu_n$ בהתאמה כך שמתקיים $\sigma(\alpha_i) = \xi_i \alpha_i$.

נראה כי ה- ξ_i יוצרים את μ_n : ציקלית, ולכן גם כל תת-חבורה שלה ציקלית אז $\langle \xi_i, \dots, \xi_n \rangle = \mu_m$ עבור $m \leq n$ אז $\xi_i^m = 1$ אבל נשים לב שמתקיים אם כך לכל i

$$\sigma^m(\alpha_i) = \xi_i^m \alpha_i = 1 \cdot \alpha_i = \alpha_i$$

ולכן בהכרח $m = n$ ובעצם $\langle \xi_1, \dots, \xi_n \rangle = \mu_n$.

מכך ש- ξ_1, \dots, ξ_n יוצרים את μ_n והיא חבורה ציקלית לכן נוצרת על-ידי איבר אחד, ξ , נובע שהוא צריך להיות צירוף לינארי שלהם, אז לכל i נתאים את ℓ_i כך שיתקיים $\xi_i = \prod_{j=1}^n \xi_j^{\ell_i}$, נגדיר $\alpha = \prod_{i=1}^n \alpha_i^{\ell_i}$ ונקבל

$$\sigma(\alpha) = \sigma\left(\prod_{i=1}^n \alpha_i^{\ell_i}\right) = \prod_{i=1}^n \sigma(\alpha_i^{\ell_i}) = \prod_{i=1}^n \xi_i^{\ell_i} \alpha_i^{\ell_i} = \prod_{i=1}^n \xi_i^{\ell_i} \prod_{i=1}^n \alpha_i^{\ell_i} = \xi \alpha$$

במילים אחרות, α הוא וקטור עצמי של הערך עצמי ξ , אבל ξ הוא שורש פרימיטיבי מסדר n , אז הקבוצה $\{\alpha, \xi\alpha, \xi^2\alpha, \dots, \xi^{n-1}\alpha\}$ היא בעלת n איברים שונים - זאת אומרת ל- α יש n צמודים מעל K ונטען שזה מסיים: נסמן $L = K(\alpha)$, ואם נבחר $a = \alpha^n$ אז עבור כל $\sigma_i \in G$ נקבל

$$\sigma_i(a) = \sigma_i(\alpha^n) = (\sigma_i(\alpha))^n = (\xi_i \alpha)^n = \alpha^n = a$$

וזה בידיוק אומר ש- $\{x \in L \mid \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\} = L^G$, אבל זה בידיוק אומר ש- $a \in K$, כי כל איבר ב- K נשמר תחת כל

האוטומורפיזמים של G כי G מהגדרתה מכילה את כל האוטומורפיזמים שמשאירים את K במקום.

□

4.10 טענה על הרחבות ציקלוטומיות תחת תנאי יפה

משפט 4.9: אם $n \in K^\times$ אז קיים שורש פרימיטיבי $\xi_n \in \overline{K}$ מסדר n , ההרחבה $K(\xi_n)/K$ היא גלואה וישנו שיכון $\text{Gal}(K(\xi_n)/K) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

הוכחה: נניח ש- $n \in K^\times$, הפולינום $x^n - 1$ הוא ספרבילי ולכן ל- \overline{K} יש n שורשי יחידה שונים.

ראינו שאם ל- \overline{K} יש n שורשי יחידה שונים זה מזה, אז $\mu_n \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, זו חבורה ציקלית ולכן יש לנו שורש יחידה פרימיטיבי ξ_n שיוצר אותה.

$K(\xi_n)/K$ הוא שדה הפיצול של הפולינום שלנו ולכן ההרחבה נורמלית וספרבילית ולכן זו הרחבת גלואה.

כל $\sigma \in G(L/K)$ נקבע ביחידות על-ידי $\sigma(\xi) = \xi^a$ ולכן אנחנו מקבלים שיכון $\text{Gal}(L/K) \hookrightarrow \text{Aut}(\mu_n)$ על-ידי $\sigma \mapsto \sigma|_{\mu_n}$.

נגדיר $\lambda : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Aut}(\mu_n)$ על-ידי $a \mapsto \sigma_a$ כאשר $\sigma_a(\xi) = \xi^a$ לכל $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ והעתקה הזאת מגדירה את השיכון $\text{Gal}(L/K) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

□