

פתרון מטלה 04 – פונקציות מרוכבות, 80519

25 בנובמבר 2025



שאלה 1

תהי $f(z) = \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$, הרבה של העתקת מוביוס ופונקציית השורש.

סעיף א'

תת-סעיף א'

נסמן $G_1 = \mathbb{C} \setminus (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. נראה כי העתקת מוביוס ממפה את G_1 אל $\mathbb{C} \setminus [0, \infty)$.
הוכחה: נסמן $m(z) = \frac{1+z}{1-z}$ ונניח בשלילה שקיים $z \in G_1$ כך שמתקיים $m(z) \in [0, \infty)$.
אז $t = \frac{1+z}{1-z} \geq 0 \iff 1+z = t(1-z) \iff z(1-t) = -(t+1) \iff z = \frac{t+1}{t-1}$
1. אם $t > 1$ אז $\frac{t+1}{t-1} > 1$ כלומר $z \in (1, \infty)$
2. אם $0 \leq t < 1$ אז $\frac{t+1}{t-1} \leq -1$ ולכן $x \in (-\infty, -1]$
3. אם $t = 0$ אז $z = -1$
4. לא ייתכן ש- $t = 1$ כי אז $z = \infty$
בחלק המקרים מתקיים $z \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$, אבל $z \in G_1$ ולכן זו סתירה ולכן $m(G_1) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$.
נשאר להראות את ההכלה בכיוון השני, עבור $\mathbb{C} \setminus [0, \infty) \subseteq m(G_1)$ כדי לקבל שיוויון.
לכל $w \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$ נסמן

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

שמוגדר היטב מהתחום של w .
נניח ש- $z \notin G_1$ ולכן $z \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ אבל אז $m(z) = w$ אבל אמרנו ש- $w \notin [0, \infty)$ ולכן זו סתירה וקיבלנו את ההכלה בכיוון השני.

הראנו הכלה דו-כיוונית ולכן $m(G_1) = \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$.

תת-סעיף ב'

ניקח את הענף מהתרגול ונראה ש- f היא חד-חד ערכית ועל וממפה את הקטע $(-1, 1)$ אל הישר $\{Re(z) = 0\}$.
הוכחה: בתרגול לקחנו את הענף

$$l(z) = \text{Log}(e^{i\pi} z) + i\pi$$

כדי להגדיר

$$f(z) = e^{\frac{1}{2}l(\frac{1+z}{1-z})}$$

מהסעיף הקודם נובע ש- m היא העתקה חד-חד ערכית ועל בין G_1 לבין $\mathbb{C} \setminus [0, \infty)$.

שאלה 2

יהי $\sigma \in \mathbb{C}$.

סעיף א'

באמצעות הענף הראשי של הלוגריתם, נחשב את $\frac{d^n}{dz^n}(1+z)^\sigma$.

פתרון: לפי הגדרה שראינו בהרצאה מתקיים עבור הענף הראשי של הלוגריתם

$$(1+z)^\sigma = \exp(\sigma \operatorname{Log}(1+z))$$

שאנליטית לכל $z \notin (-\infty, -1]$ זאת מכיוון שמהגדרה

$$\operatorname{Log}(w) = \log|w| + i \operatorname{Arg} w$$

אבל אנחנו יודעים שהארגומנט איננו רציף בקטע זה (הוא קופץ מ- π ל- $-\pi$), ולכן בפרט הפונקציה שלנו לא אנליטית מהרכבה בתחום הזה. בשאר התחומים, היא אנליטית כהרכבה של אנליטיות. נחשב

$$\frac{d}{dz}(1+z)^\sigma = \frac{d}{dz} \exp(\sigma \log(1+z)) = \exp(\sigma \log(1+z)) \cdot \left(\sigma \cdot \frac{1}{1+z} \right) = \sigma(1+z)^{\sigma-1}$$

בפרט, גם הפונקציה הזאת אנליטית כמכפלה של פונקציה אנליטית (מהרכבה) וקבוע אז נוכיח באינדוקציה: בסיס – הוכחנו, נניח כי הטענה נכונה עבור k פעמים שגזרנו, כלומר

$$\frac{d^k}{dz^k}(1+z)^\sigma = \sigma(\sigma-1) \cdot \dots \cdot (\sigma-k+1)(1+z)^{\sigma-k}$$

שוב יש לנו מכפלה של פונקציה אנליטית עם קבוע, ולכן אנליטית, נגזור

$$\frac{d^{k+1}}{dz^{k+1}}(1+z)^\sigma = \sigma(\sigma-1) \cdot \dots \cdot (\sigma-k+1)(\sigma-k)(1+z)^{\sigma-k-1}$$

כלומר לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים מעיקרון האינדוקציה

$$\frac{d^n}{dz^n}(1+z)^\sigma = \sigma(\sigma-1) \cdot \dots \cdot (\sigma-n+1)(1+z)^{\sigma-n}$$

□

סעיף ב'

נסיק שלכל z עם $|z| < 1$ מתקיים

$$(1+z)^\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\sigma}{n} z^n$$

פתרון: התנאי של $|z| < 1$ הכרחי בשביל האנליטיות (כי יש נקודת אי-רציפות עבור $z = -1$), אבל מהיות $|z| < 1$ אז הכל אנליטי. אנחנו מחשבים טור טיילור סביב $a = 0$ ולכן במקרה שלנו לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$f^n(0) = \sigma(\sigma-1) \cdot \dots \cdot (\sigma-n+1)(1+0)^{\sigma-n} = \sigma(\sigma-1) \cdot \dots \cdot (\sigma-n+1)$$

כלומר

$$a_n = \frac{f^n(0)}{n!} = \frac{\sigma(\sigma-1) \cdot \dots \cdot (\sigma-n+1)}{n!} = \binom{\sigma}{n}$$

עבור $n = 0$ פשוט מתקיים $f^0(0) = f(0) = (1+0)^\sigma = 1$ וגם קונבנציה מתקיים $\binom{\sigma}{0} = 1$ ולכן

$$(1+z)^\sigma = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{f^n(0)}{n!} \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{f^n(0)}{n!} \right) z^n$$

□

שאלה 3

יהי $G \subset \mathbb{C}$ תחום ו- $f \in \text{Hol}(G)$.
 תהיי $f = f(r, t) = u(r, t) + iv(r, t)$ ההצגה של f בקורדינאטות פולריות ($z = re^{it}$).
 נראה ש- f הולומורפית ואם $z \neq 0$ אז $u_r = \frac{1}{r}v_t$ ו- $u_t = -\frac{1}{r}v_r$.
 הוכחה: יהי $z = re^{it}$ עם $r > 0$ ו- $t \in \mathbb{R}$, נכתוב

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) =: U(r, t) + iV(r, t)$$

כאשר

$$\begin{aligned} U(r, t) &= u(x(r, t), y(r, t)) \quad V(r, t) = v(x(r, t), y(r, t)) \\ x &= r \cos(t), \quad y = r \sin(t) \end{aligned}$$

נגזור

$$x_r = \cos(t), \quad x_t = -r \sin(t), \quad y_r = \sin(t), \quad y_t = r \cos(t)$$

מכלל שרשרת נקבל

$$\begin{aligned} U_r &= u_x x_r + u_y y_r = u_x \cos(t) + u_y \sin(t) \\ U_t &= u_x x_t + u_y y_t = u_x (-r \sin(t)) + u_y (r \cos(t)) = r(-u_x \sin(t) + u_y \cos(t)) \end{aligned}$$

ובאותו אופן גם נקבל

$$\begin{aligned} V_r &= u_x \cos(t) + v_y \sin(t) \\ V_t &= r(-v_x \sin(t) + v_y \cos(t)) \end{aligned}$$

f הולומורפית ולכן ממשוואות קושי-רימן, מתקיים $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$ ולכן

$$U_r = u_x \cos(t) + u_y \sin(t) = v_y \cos(t) + (-v_x) \sin(t) = v_y \cos(t) - v_x \sin(t)$$

$$\frac{1}{r}V_t = -v_x \sin(t) + v_y \cos(t)$$

כלומר $U_r = \frac{1}{r}V_t$.
 באופן דומה נקבל גם

$$V_r = v_x \cos(t) + v_y \sin(t) = (-u_y) \cos(t) + u_x \sin(t)$$

ולכן

$$-\frac{1}{r}U_t = -(-u_x \sin(t) + u_y \cos(t)) = u_x \sin(t) - u_y \cos(t) \implies V_r = -\frac{1}{r}U_t$$

□

שאלה 4

יהי $G \subset \mathbb{C}$ תחום ותהיי $f \in \text{Hol}(G)$. נסמן

$$Z_v := \{z = x + iy \mid u(x, y) = \text{Im}(f(z)) = 0\}$$

ונראה שאם לכל $z \notin Z_v$ מתקיים $f' = 0$ אז f קבועה.
הוכחה: נכתוב $f = u + iv$ עבור $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ולכן

$$Z_v := \{z \in G \mid v(z) = 0\}$$

נניח שלכל $z \in G \setminus Z_v$ מתקיים $f'(z) = 0$ ונראה ש- f קבועה.

יש לנו שתי אופציות – או ש- $G = Z_v$ או ש- $G \neq Z_v$ ונזכר כי הגדרנו את G להיות קבוצה פתוחה וקשירה.
אם $Z_v = G$ אז $v \equiv 0$ ולכן f היא פונקציה $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ כלומר תמונתה רק ערכים ממשיים וזוהי פונקציה אנליטית.
משפט ההעסקה הפתוחה אומר שאם f היא פונקציה אנליטית שאיננה קבועה אז היא שולחת קבוצות פתוחות לקבוצות פתוחות, ולכן נניח בשלילה ש- f איננה קבועה:

אז $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{R}$ כאשר נתייחס ל- \mathbb{R} כתת-קבוצה של \mathbb{C} צריכה להיות קבוצה פתוחה מהמשפט ונטען שזה לא ייתכן:
נטען טענה חזקה יותר, שעבור $\mathbb{U} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ עם הטופולוגיה המושרית מ- \mathbb{C} היא פתוחה אם $U = \emptyset$ בלבד: נניח שלא, כלומר $U \neq \emptyset$ ונזהה את U עם $U \times \{0\}$, כלומר כל $u \in U$ מתאים ל- $(u, 0) \in \mathbb{C}$.

כדי ש- U תהיה פתוחה ב- \mathbb{C} , לכל $(u, 0) \in U$ צריך שיהיה דיסק $D((u, 0), \delta) \subseteq U$ עבור $\delta > 0$ אבל כל דיסק כזה מכיל גם $(u + a, b)$ עבור $a, b \in (-\delta, \delta)$ אבל לא ייתכן ש- $b \neq 0$ (כי אז יש לנו גם ציר מדומה), ולכן קיבלנו סתירה להנחה ש- $U \neq \emptyset$ ולכן $U = \emptyset$.
כלומר, לא ייתכן ש- f איננה קבועה כי אז תמונתה חייבת להיות קבוצה פתוחה מה שראינו שלא ייתכן בתנאים, ולכן בהכרח f פתוחה.
נשים לב שאפשר לענות על השאלה גם בלי משפט ההעסקה הפתוחה: f אנליטית ולכן היא מקיימת את משוואות קושי-רימן ולכן מתקיים

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

אמרנו ש- $v \equiv 0$ ולכן $v_x = v_y = 0$ ולכן גם $u_x = 0 = u_y$ ובפרט זה אומר שהנגזרת מתאפסת לחלוטין בכל G ולפי תנאים שקולים שראינו זה אומר ש- f קבועה על G .

נשאר לבחון את המקרה השני בו $G \neq Z_v$: אנחנו יודעים ש- v רציפה (כי f הולומורפית) ולכן הקבוצה $Z_v = v^{-1}(\{0\})$ היא קבוצה סגורה ב- G ולכן $G \setminus Z_v$ היא קבוצה פתוחה (מהגדרת המשלים).

מההנחה, לכל $z \in G \setminus Z_v$ מתקיים $f'(z) = 0$ אבל G הוא תחום קשיר ו- f הולומורפית, לכן אם $z \in U \subset G$ מקיימת $f'(z) = 0$ לכל $z \in U$ אז סביב כל נקודה כזאת יש סביבה בה הפונקציה מתאפסת ולכן בהכרח $f'(z) = 0$ לכל $z \in G$.

מהתנאים השקולים נקבל ש- f קבועה על G גם במקרה זה.

□

שאלה 5

תזכורת:

$$\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \quad \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$$

סעיף א'

נוכיח את הזהות $\overline{\partial_z f} = \partial_{\bar{z}} \bar{f}$

הוכחה: נזכר כי עבור $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$ מתקיים $\overline{w_1 + w_2} = \bar{w}_1 + \bar{w}_2$ וכן $\overline{i} = -i$ אז

$$\begin{aligned} \overline{\partial_z f} &= \frac{1}{2}(\overline{\partial_x f + i\partial_y f}) = \frac{1}{2}(\overline{u_x + iv_x + i(u_y - iv_y)}) = \frac{1}{2}(\overline{u_x + iv_x + iu_y + v_y}) = \frac{1}{2}(u_x - iv_x - iu_y + v_y) \\ &= \frac{1}{2}((u_x - v_y) - i(v_x + u_y)) \end{aligned}$$

מצד שני, $\bar{f} = u - iv$ ולכן

$$\partial_{\bar{z}} \bar{f} = \frac{1}{2}(\partial_x \bar{f} + i\partial_y \bar{f}) = \frac{1}{2}(u_x - iv_x - iu_y - i(-i)v_y) = \frac{1}{2}(u_x - iv_x - iu_y - v_y) = \frac{1}{2}((u_x - v_y) - i(v_x + u_y))$$

□

אז יש לנו שיוויון.

סעיף ב'

נוכיח את הזהות $\partial_z(f \cdot g) = (\partial_z f) \cdot g + f \cdot \partial_z g$

הוכחה:

$$\begin{aligned} \partial_z(f \cdot g) &= \frac{1}{2}(\partial_x(f \cdot g) - i\partial_y(f \cdot g)) = \frac{1}{2}(\partial_x f \cdot g + \partial_x g \cdot f - i(\partial_y f \cdot g + \partial_y g \cdot f)) \\ &= \frac{1}{2}(\partial_x f - i\partial_y f) \cdot g + \frac{1}{2} \cdot f(\partial_x g - i\partial_y g) = (\partial_z f) \cdot g + f \cdot (\partial_z g) \end{aligned}$$

□

סעיף ג'

נוכיח את הזהות $\partial_{\bar{z}}(f \cdot g) = (\partial_{\bar{z}} f) \cdot g + f \cdot (\partial_{\bar{z}} g)$

הוכחה:

$$\begin{aligned} \partial_{\bar{z}}(f \cdot g) &= \frac{1}{2}(\partial_x(f \cdot g) + i\partial_y(f \cdot g)) = \frac{1}{2}(\partial_x f \cdot g + \partial_x g \cdot f + i(\partial_y f \cdot g + \partial_y g \cdot f)) \\ &= \frac{1}{2}(\partial_x f + i\partial_y f) \cdot g + \frac{1}{2} \cdot f(\partial_x g + i\partial_y g) = (\partial_{\bar{z}} f) \cdot g + f \cdot (\partial_{\bar{z}} g) \end{aligned}$$

□

סעיף ד'

נוכיח את הזהות $\partial_{\bar{z}}(f \circ g) = ((\partial_z f) \circ g)\partial_{\bar{z}}g + ((\partial_{\bar{z}} f) \circ g)\partial_z \bar{g}$

הוכחה: נפעל כמו בתרגול, נכתוב את f על-ידי z, \bar{z} כלומר g, \bar{g} לאחר ההרכבה, ונקבל

$$\partial_{\bar{z}}(f \circ g) = \partial_{\bar{z}}(f(g(z, \bar{z}), \bar{g}(z, \bar{z})))$$

לנוחות נסמן $w = g(z, \bar{z}), \bar{w} = \overline{g(z, \bar{z})}$ ומכליל השרשרת לפונקציות ממשיות

$$\partial_x(f(g(z, \bar{g}(z, \bar{z}))) = f_w \partial_x w + f_{\bar{w}} \partial_x \bar{w}$$

$$\partial_y(f(g(z, \bar{g}(z, \bar{z}))) = f_w \partial_y w + f_{\bar{w}} \partial_y \bar{w}$$

כאשר

$$f_w = \partial_w f, \quad f_{\bar{w}} = \partial_{\bar{w}} f$$

ולכן

$$\begin{aligned} \partial_{\bar{z}}(f \circ g) &= \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)(f(w(z))) = \frac{1}{2}(f_w \partial_x w + f_{\bar{w}} \partial_x \bar{w} + i f_w \partial_y w + i f_{\bar{w}} \partial_y \bar{w}) \\ &= \frac{1}{2}(f_w(\partial_x w + i\partial_y w) + f_{\bar{w}}(\partial_x \bar{w} + i\partial_y \bar{w})) = f_w \cdot \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)w + f_{\bar{w}} \cdot \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)\bar{w} \end{aligned}$$

נשים לב

$$\frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)w = \partial_{\bar{z}}w = \partial_{\bar{z}}g, \quad \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)\bar{w} = \partial_{\bar{z}}\bar{w} = \partial_{\bar{z}}\bar{g}$$

כעת, וכן $w = g(z)$ וכן $\partial_W f = \partial_z f, \partial_{\bar{w}} f = \partial_{\bar{z}} f$ ולכן

$$\partial_{\bar{w}}(f \circ g) = (\partial_w f \circ g)\partial_{\bar{z}}g + (\partial_{\bar{w}} f \circ g)\partial_{\bar{z}}\bar{g} = (\partial_z f \circ g)\partial_{\bar{z}}g + (\partial_{\bar{z}} f \circ g)\partial_{\bar{z}}\bar{g}$$

□