

בלה

12 באוגוסט 2025



הוכחה: יהי  $0 < K < \infty, d \in (0, 1]$  ונגדיר

$$f_n(x) = n + Kx^d$$

נראה שהפונקציה היא  $K$  לישפיצית עבור  $x, y \in [0, 1]$

$$|f_n(x) - f_n(y)| = |(n + Kx^d) - (n + Ky^d)| = |Kx^d - Ky^d| = K|x^d - y^d|$$

נסתכל על הפונקציה  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  הנתונה על-ידי  $f(x) = x^d$ , זו פונקציה קעורה (כי הנגזרת היא מונוטונית יורדת ממש,  $f'(x) = dx^{d-1}$ , היא קעורה כי  $0 < d < 1$  אז זה די ברור, אבל אם  $d = 1$  זו פונקציה קבועה שהיא מונוטונית יורדת חלש).

מדף התכונות של הפונקציה בויקיפדיה, כאן, תכונה 6, מתקיים

$$f(x) + f(y) \geq f(x+y) \iff -f(x+y) \geq -f(x) - f(y)$$

וזה מצויין ליהודים, כי אם ניקח  $y \in [0, 1]$  זה אומר שמתקיים עבור  $g : [y, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  הנתונה על-ידי

$$g(x) = x^d - y^d - (x - y)^d = f(x) - f(y) - f(x - y)$$

זה בדיוק אומר שמתקיים  $g(x) \leq 0$ , אז אם נחזור לביטוי ממקודם שמצאנו

$$|f_n(x) - f_n(y)| = K|x^d - y^d| \leq K|x - y|^d$$

□

**טענה 0.1:** נניח כי  $A, B$  בנות-מנייה. אז  $A \times B$  בת-מנייה.

הוכחה של יאיר: בתרגיל הבית הוכחתם ש- $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  היא בת-מנייה ובתרגול ראיתם כי אם  $|A| = |C|, |B| = |D|$  אזי  $|A \times B| = |C \times D|$  ומשילוב שתי הטענות, הטענה נובעת.

□

הוכחה של נעה: למה צריך בכלל את החלק השני? הרי אם יש לי  $A, B$  בנות-מנייה, זה אומר שקיימות  $f : A \rightarrow \mathbb{N}, g : B \rightarrow \mathbb{N}$  חד-חד ערכיות ועל.

עכשיו,  $A \times B$  זה הרי  $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$  אבל אם נגדיר  $h : A \times B \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  על-ידי  $h(a, b) = (f(a), g(b))$  יש לנו חד-חד ערכיות ועל קורדינאטה קורדינאטה, אז זו פונקציה חד-חד ערכית ועל לקבוצה בת-מנייה, ולכן גם  $A \times B$  קבוצה בת-מנייה.

□

$$4 = S(3) = \left\{ \underbrace{\{\{\{\emptyset\}, \emptyset\}, \{\emptyset\}, \emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \emptyset\}, \{\emptyset\}, \emptyset\}}_{=3} \right\}$$

$$\prod_{n < \omega} A_n = \left\{ f : \mathbb{N} \rightarrow \bigcup A_n \mid \forall n < \omega, f(n) \in A_n \right\} \neq \emptyset$$

כל פונקציה בוחרת איבר אחד מ- $A_n$ , אז זה כל הפונקציות בחירה מעל הסדרה  $A_n$  ו- $|A_n| = 2$  אז כל  $f(n)$  יכול לקחת שני ערכים בדיוק, אז המכפלה זה סט כל הפונקציות מ- $\mathbb{N}$  ל-2 איברים (שיכול להיות ששונים זה מזה).

נגדיר  $\varphi_n : A_n \rightarrow \{0, 1\}$ , אז כל  $f \in \prod A_n$  ונגדיר  $f \mapsto (\varphi_0(f(0)), \varphi_1(f(1)), \dots) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  (זה מוגדר היטב כי  $f(n) \in A_n$  מהגדרת המכפלה) ואז

$$\Phi : \prod_{n < \omega} A_n \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

הנתונה על-ידי

$$\Phi(f)(n) = \varphi_n(f(n))$$

היא חד-חד ערכית ועל:

חד-חד ערכית: כי אם  $f \neq g$  עבור  $n \in \mathbb{N}$  אז  $f(n) \neq g(n)$  ולכן  $\varphi_n(f(n)) \neq \varphi_n(g(n))$  ואז  $\Phi(f)(n) \neq \Phi(g)(n)$  על: נובע מכך שניתן לקחת כל סדרה בינארית  $(b_n)$  ולהגדיר  $f$  לפיה על-ידי  $f(n) = \varphi_n^{-1}(b_n)$  (כזכור  $\varphi_n$  חד-חד ערכית ועל מהגדרת שיוויון עוצמות). ראינו ש- $|\{0, 1\}^{\mathbb{N}}| = \aleph_0$  ומצאנו איזומורפיזם ולכן מהגדרת שיוויון עוצמות גם  $|\prod_{n < \omega} A_n| = \aleph_0$

# שאלה 1

צריך לפרק את הפולינום  $x^8 - 1$  מעל השדה  $\mathbb{F}_{13}$ .

פתרון: ראשית מתקיים

$$x^8 - 1 = (x^4 + 1)(x^4 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)$$

וגם  $x - 1 \equiv x + 12 \pmod{13}$ , ווגם את  $x^2 + 1$  אפשר לפרק מעל  $\mathbb{F}_{13}$  כי אם נציב  $i \in \{0, \dots, 12\}$  נקבל ש- $i \in \{5, 8\}$   $\Leftrightarrow i^2 + 1 \equiv 0 \pmod{13}$  ולכן יש לנו שורשים אז הפולינום יכול להתפרק

$$x^2 + 1 \equiv_{\text{mod } 13} (x - 5)(x - 8) \equiv_{\text{mod } 13} (x + 8)(x + 5)$$

יש לי עוד לאן לפרק את  $x^4 + 1$  מעל  $\mathbb{F}_{13}$  וזה בעצם  $\Phi_8(x)$ , אז אפשר בתהליך קצר ארוך של בדיקה האם יש פיתרון ב- $\mathbb{F}_{13}$  לאחד מהבאים

$$1. \quad x^4 \equiv_{\text{mod } 13} 12 \text{ על-ידי חישוב לכל } i \in \{0, \dots, 12\} \text{ האם } i^4 \equiv_{\text{mod } 13} 12$$

$$2. \quad \text{האם יש פירוק } (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1) \pmod{13}$$

$$3. \quad \text{האם יש פירוק } (x^2 + ax + c)(x^2 + bx + d) \pmod{13}$$

כאשר את שני האחרונים זה פשוט לפתור מערכות משוואות כמו בלינארית, ואז יוצא שהפירוק הוא  $x^4 + 1 = (x^2 + 5)(x^2 + 8)$ , ובסך-הכל

$$x^8 - 1 \equiv_{\text{mod } 13} (x + 12)(x + 1)(x + 5)(x + 8)(x^2 + 5)(x^2 + 8)$$

ההשאלה היא האם יש דרך קצרה יותר שאני מפספסת: בעיקר לפירוק של  $x^4 + 1$ : חשבתי משהו בכיוון של מה השדה פיצול של  $\Phi_8(x)$  מעל  $\mathbb{F}_{13}$

ויצא לי ש- $\mathbb{F}_{169} = \mathbb{F}_{13^2}$  הוא הראשון שמכיל שורש יחידה מסדר 8, אז החבורה גלואה היא מסדר 2 ופועלת על 4 השורשים בהצמדה בזוגות (וגם

$x \mapsto x^{13}$  עם הפרובניוס), אבל אז אני חוזרת לאותה נקודה

$$\Phi_8(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^{13})(x - \beta)(x - \beta^{13}) = (x^2 - (\alpha + \alpha^{13})x + \alpha\alpha^{13})(x^2 - (\beta + \beta^{13})x + \beta\beta^{13})$$

□

## שאלה 2

צריך להוכיח שקיימת פונקציה  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  הנתונה על-ידי  $f(n) = n^2$ .

הוכחה: ניזכר שהגדרנו  $\cdot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  להיות  $n \cdot m = \underbrace{n + \dots + n}_m$  ובהרצאה ראינו ש- $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  היא קבוצה (נובע מאקסיומת הזוג הלא סדור,

אקסיומת ההחלפה ואקסיומת האיחוד).

נגדיר את התכונה  $P(n, m) := m = n \cdot n$  ואז מאקסיומת ההפרדה  $F = \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid P(n, m)\}$  קיימת. נגדיר

$$f = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = x \cdot x\}$$

□

זו פונקציה, כי לכל  $x \in \mathbb{N}$  קיים יחיד

### שאלה 3

נוכיח כי  $\min : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  היא פונקציה, כלומר נראה כי היא קבוצה המקיימת את תנאי הפונקציה.

הוכחה: שוב  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  קבוצה כי מכפלה קרטזית מגדירה קבוצות וגם  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  היא קבוצה.

ונגדיר

$$\min(x, y) = \begin{cases} x & x \leq y \\ y & y < x \end{cases}$$

היות והטבעיים הוא סדר טוב מתקיים אחד מהבאים בדיוק: או ש- $x \leq y$  או ש- $y < x$  ולכן הפונקציה מוגדרת היטב.

נגדיר את התכונה  $P(x, y, z)$  להיות  $z = \min(x, y)$  ולכן מאקסיומת ההפרדה הקבוצה הבאה מוגדרת והיא מקיימת את תנאי הפונקציה

$$f = \{((x, y), z) \in (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} \mid P(x, y, z)\}$$

□

## שאלה 4

יהיו  $a, b \in \mathbb{R}$  כך שמתקיים  $a < b$  ותהי  $f$  פונקציה רציפה בקטע  $[a, b]$  כך ש- $f(x) > 0$  לכל  $x \in [a, b]$ .

### סעיף א'

ניתן אינסוף דוגמאות שונות לפונקציות  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימות  $|g(x)| = f(x)$ .  
הוכחה: לכל  $n \in \mathbb{N}$  נגדיר את

$$\forall x \in [a, b], s_n(x) = \begin{cases} 1 & s \\ -1 & s \end{cases}$$

□

### סעיף ב'

נמצא את כל הפונקציות הרציפות  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימות  $|g(x)| = f(x)$ .  
הוכחה: היות ו- $f(x) > 0$ , עלינו לקיים  $g(x) = \pm f(x)$ .

נטען שבגלל הדרישה לרציפות  $g(x)$  חייב להתקיים  $g(x) = \pm f(x)$  בלבד (זאת אומרת, הרציפות של  $g$  גוררת שאין החלפת סימן):  
נניח בשלילה שלא כך ולכן יש לנו  $g_3 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה המקיימת  $|g_3(x)| = f(x)$  שמחליפה סימן ב- $x_0 \in [a, b]$  כלשהו.  
יהי  $x_0 \in [a, b]$  כך ש- $g_3$  מחליפה בו סימן, לפי הגדרת הגבול זה אומר (בלי הגבלת הכלליות לכיוון)

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} g_3(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} g_3(x) = -f(x_0)$$

$g_3$  רציפה בכל  $[a, b]$  ולכן רציפה ב- $x_0$ , אז מהגדרת הגבול מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} g_3(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g_3(x)$$

אבל בגלל ש- $f(x) > 0$ , לא ייתכן ש- $f(x) = -f(x)$  כי התכונה הזאת מתקיימת רק עבור  $f(x) = 0$ , אז

$$f(x_0) \neq -f(x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} g_3(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} g_3(x)$$

בסתירה לרציפות  $g_3$ , ולכן אין  $g_3$  המחליפה סימן ועל-כן  $g_1(x) = f(x), g_2(x) = -f(x)$  הן הפונקציות הרציפות היחידות המקיימות

$$\forall x \in [a, b], \forall i \in [2], |g_i(x)| = f(x)$$

□

## שאלה 5

נחשב את סכום החזקות השלישיות של הפולינום  $x^3 - x + 1$ .

פתרון: נסמן ב- $r_1, r_2, r_3$  את השורשים של הפולינום ואנחנו רוצים לחשב את  $r_1^3 + r_2^3 + r_3^3$ .  
באופן כללי, לכל  $i \in \{1, 2, 3\}$  מתקיים  $r_i^3 = r_i - 1$  אז  $r_1^3 + r_2^3 + r_3^3 = r_1 + r_2 + r_3 - 3$  ונטען שהתשובה היא  $-3$ :  
נחשב

$$\begin{aligned}(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) &= x^3 - x^2 r_3 - x^2 r_1 + x r_1 r_3 - x^2 r_2 + x r_2 r_3 + r_1 r_2 r_3 x - r_1 r_2 r_3 \\ &= x^3 - x^2(r_1 + r_2 + r_3) + x r_1 r_2 r_3 - r_1 r_2 r_3\end{aligned}$$

נסמן ב- $a, b, c, d$  את המקדמים של הפולינום שלנו  $ax^3 + bx^2 + cx + d$  ובמקרה שלנו  $a = 1, b = 0, c = -1, d = 1$ , ולכן עם השורשים לעיל זה אמור להתאים למקדמים של הפולינום כמובן, אז

$$a = 1, b = (r_1 + r_2 + r_3) = 0, c = r_1 r_2 r_3 = 1, d = -r_1 r_2 r_3 = -1$$

ולכן

$$r_1^3 + r_2^3 + r_3^3 = r_1 + r_2 + r_3 - 3 = -3$$

□

## שאלה 6

נמצא את הפולינום המינימלי של  $\sqrt{3} + \sqrt{5}$  מעל  $\mathbb{Q}$ , נראה שהוא אי-פריק מעל  $\mathbb{Q}$ , אי-פריק מעל  $\mathbb{Z}[t]$  שנהיה פריק מודולו  $p$  לכל מודולו  $p$ . הוכחה: נסמן  $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{5}$ , אז

$$\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{5} \iff \alpha^2 = 3 + 2\sqrt{3}\sqrt{5} + 5 \iff \alpha^2 - 8 = 2\sqrt{3}\sqrt{5} \iff \alpha^4 - 16\alpha^2 + 64 = 60 \iff \alpha^4 - 16\alpha^2 + 4 = 0$$

נשתמש בשיטה של "Rational root theorem" ממטלה 2:

**הערה** (תזכורת - Rational root theorem):  $f \in \mathbb{Q}[x]$  עם מקדמים שלמים ונסמן  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  אם  $\frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$  שורש של  $f$  אז  $s \mid a_n, r \mid a_0$

במקרה שלנו  $s = 1$  ו- $r = \pm 1, \pm 2, \pm 4$ , הצבה קצרה מביאה לנו שכל תוצאה לא מניבה 0 ולכן אין שורש מעל  $\mathbb{Q}$  וזה אומר שאין גורם לינארי (זה בעצם אומר שאין פיצול למכפלה של  $f = gh$  כאשר  $\deg(g) = 1, \deg(h) = 3$  או ההפך).

נשאר לבחון האם יש פיצול למכפלה של  $f = gh$  עם  $\deg(g) = \deg(h) = 2$ , אז נניח בשלילה שהוא פריק, ולכן

$$\alpha^4 - 16\alpha^2 + 4 = (\alpha^2 + a\alpha + b)(\alpha^2 + c\alpha + d) = \alpha^4 + c\alpha^3 + d\alpha^2 + a\alpha^3 + ac\alpha^2 + ad\alpha + b\alpha^2 + bc\alpha + bd = \alpha^4 + \alpha^3(c + a) + \alpha^2(d + ac + b) + \alpha(ad + bc) + bd$$

אז  $-c = a \Rightarrow a + c = 0$  וכן  $bd = 4$  ולכן

$$ad + bc = 0 \iff -cd + bc = 0 \iff bc = cd \quad (2)$$

וכן

$$d + ac + b = -16 \iff d - c^2 + b = -16$$

מ- (2) יש 2 אופציות, או  $c = 0$  או  $c \neq 0$ .

אם  $c \neq 0$  אז נחלק את (2) בו ונקבל  $b = d$  ולכן מכך  $bd = 4$  אז  $b = \pm 2$  אבל אז למשוואה  $d + ac + b = -16$  אין פיתרון כי או  $-4 = -16$  או  $-16 = -16$  וכמובן שניהם לא נכונים.

אז  $c = 0$ , ולכן  $d + b = -16$  וגם  $bd = 4$ , אבל גם פה נובע ש- $b = d = \pm 2$  ושוב אין פיתרון ולכן ההנחה בשלילה לא נכונה והפולינום אי-פריק מעל  $\mathbb{Q}$ .

עכשיו, נזכר בלמה השנייה של גאוס:  $f$  פולינום אי-פריק ב- $\mathbb{Z}[\alpha]$  אם ורק אם  $f$  פרימיטיבי ואי-פריק ב- $\mathbb{Q}[\alpha]$ , ונשים לב שאכן הפולינום שלנו הוא פרימיטיבי כי

$$\text{cont}(\alpha^4 - 16\alpha^2 + 4) = \text{cont}(1, -16, 4) = \gcd(1, -16, 4) = 1$$

ולכן הפולינום הוא פרימיטיבי ועל-כן אי-פריק מעל  $\mathbb{Z}[\alpha]$  מהלמה השנייה של גאוס.

נשאר רק להראות שהוא פריק מודולו  $p$  לכל מודולו  $p$ : נסמן  $y = \alpha^2$  אז  $y^2 - 16y + 7 \mapsto \alpha^4 - 16\alpha^2 + 4$  ומתקיים

$$\Delta = ((-16)^2 - 4(1))4 = 256 - 16 = 240$$

□



## שאלה 7

יהי  $f$  פולינום אי-פריק מעל שדה  $K$  ויהי  $L$  שדה הפיצול שלו. נניח ש- $G = \text{Gal}(L/K)$  היא אבלית ונוכיח שכל שורש של  $f$  יוצר  $L$ .  
הוכחה: נניח שלא ככה, ולכן עבור  $\alpha$  שורש של  $f$  מתקיים  $E = K(\alpha)$  ו- $E \subsetneq L$  ונשים לב ש- $[K(\alpha) : K] = \deg(f)$ .  
מהתאמת גלואה, יש התאמה חד-חד ערכית ועל בין  $H \leq \text{Gal}(L/K)$  לבין שדות ביניים  $K \subseteq E \subseteq L$ .  
היות ו- $G$  אבלית, נובע כי כל תת-חבורה שלה היא נורמלית ולכן בפרט  $H = \text{Gal}(L/K(\alpha)) = \{\sigma \in \text{Gal}(L/K) \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}$  זאת-אומרת,  $K(\alpha) = L^H$  ובגלל שכל תת-חבורה אבלית היא נורמלית

$$K(\sigma(\alpha)) = L^H = L^{\text{Gal}(L/K(\sigma(\alpha)))} = L^{\sigma H \sigma^{-1}} = L^H = K(\alpha)$$

זה בידיוק אומר שכל השורשים של  $f$  יוצרים את אותו שדה ביניים  $K(\alpha)$ , אבל זה בידיוק ההגדרה של שדה פיצול ושדה פיצול יחיד עד-כדי איזומורפיזם ולכן  $L \subseteq K(\alpha)$  זאת-אומרת  $L = K(\alpha)$  בסתירה להנחה.

□

## שאלה 8

שאלה 4 – מועד א' תשפ"ב של שיא.

יהי התחום  $D = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1 \right\}$  ותהי  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  הפונקציה הנתונה על-ידי  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ . נקבע האם  $f$  משיגה מינימום ומקסימום ב- $D$  ואם כן נחשב את הערך.

פתרון:

שיטה ראשונה: בעזרת הלגראנז'יאן:

**הגדרה 0.1** (הלגראנז'יאן): תהי  $B \subseteq \mathbb{R}^k$  פתוחה ו- $f, g_1, \dots, g_n : B \rightarrow \mathbb{R}$  גזירות ברציפות עבור  $n + 1 \leq k$ . נגדיר את הקבוצה

$$A := \{x \in B \mid g_1(x) = \dots = g_n(x) = 0\}$$

נניח כי לכל  $a \in A$  מתקיים  $\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_n(a) \in \mathbb{R}^k$  בלתי-תלויים לינארית. נגדיר את הלגראנז'יאן  $\mathcal{L} : \mathbb{R}^n \times B \rightarrow \mathbb{R}$  באמצעות

$$\mathcal{L}(\lambda, x) = f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x)$$

תהי  $(\lambda, a) \in \mathbb{R}^n \times A$  נקודת קריטית של הלגראנז'יאן ונסמן  $\hat{H} = H\mathcal{L}_{(\lambda, a)}$ . אז מתקיים

1.  $a$  היא מינימום מקומי של  $f|_A$  אם  $H\mathcal{L}_a^\lambda$  חיובית בהחלט על  $\ker(Dg_a)$  ולפי ההסיאן המוגבל זה קורה אם  $(-1)^n \det(\hat{H}_i) > 0$  לכל  $2n + 1 \leq i \leq k + n$

2.  $a$  היא מקסימום מקומי של  $f|_A$  אם  $H\mathcal{L}_a^\lambda$  שלילית בהחלט על  $\ker(Dg_a)$  ולפי ההסיאן המוגבל זה קורה אם  $(-1)^{n+i} \det(\hat{H}_i) > 0$  לכל  $2n + 1 \leq i \leq k + n$

3.  $a$  היא אוקף של  $f|_A$  אם  $H\mathcal{L}_a^\lambda$  אינה מוחלטת על  $\ker(Dg_a)$  ולפי ההסיאן המוגבל זה קורה אם  $\det(\hat{H}_{2n+1}), \dots, \det(\hat{H}_i)$  בעלי סימנים המתאימים לאחד משני המקרים הקודמים אבל ל- $\det(\hat{H}_{i+1})$  יש סימן הפוך

אז נגדיר  $g(x, y, z) = x + y + z - 1$  ונשים לב ש- $Dg_{(x, y, z)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$  לכל  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  נובע שניתן להשתמש בשיטת הלגראנז'יאן, והלגראנז'יאן נתון על-ידי

$$\mathcal{L}(\lambda, x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - \lambda x - \lambda y - \lambda z + \lambda$$

נחשב את הנקודות הקריטיות של  $\mathcal{L}$  זוהי כמובן פונקציה רציפה

$$D\mathcal{L}_{(\lambda, x, y, z)} = \begin{pmatrix} -x - y - z + 1 & 2x - \lambda & 4y - \lambda & 6z - \lambda \end{pmatrix}$$

נשווה ל-0 ונפתור את מערכת המשוואות

$$2x - \lambda = 0 \implies 2x = \lambda$$

$$4y - \lambda = 0 \implies 4y = \lambda$$

$$6z - \lambda = 0 \implies 6z = \lambda$$

$$-x - y - z + 1 = 0 \implies x + y + z = 1$$

אז

$$2x = 4y = 6z \implies x = 2y = 3z$$

ולכן

$$x + y + z = 1 \iff_{x=2y} 3y + z = 1 \iff z = 1 - 3y$$

אבל אבל

$$x = 3z \iff x = 3 - 9y \iff 11y = 3 \iff y = \frac{3}{11}$$

אז בסך-הכל

$$x = \frac{6}{11}, y = \frac{3}{11}, z = \frac{2}{11}, \lambda = \frac{12}{11}$$

ואכן גם מתקיימים

$$x + y + z = \frac{3}{11} + \frac{6}{11} + \frac{2}{11} = \frac{11}{11} = 1 \checkmark$$

$$\frac{12}{11} = 2 \cdot \frac{6}{11} = 4 \cdot \frac{3}{11} = 6 \cdot \frac{2}{11} \checkmark$$

ולכן יש נקודה אחת חשודה לקיצון והיא  $(\lambda, x, y, z) = (\frac{12}{11}, \frac{6}{11}, \frac{3}{11}, \frac{2}{11})$  נחשב את ההסיאן של  $\mathcal{L}$ :

$$H\mathcal{L}_{(\lambda, x, y, z)} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

צריך לבדוק את המינורים הראשיים מסדר מסדרים 3 ו-4.

מתקיים  $(-1)^3 \det(H\mathcal{L}) = 44$  ועבור המינור מסדר 3 מתקיים  $(-1)^3 \det \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 6$  ולכן זו נקודת מינימום יחידה.

□

## שאלה 9

שאלה 4 ממטלה 11 של דניאל: תהי  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  הנתונה על-ידי  $f(x, y, z) = 2x + 2y + 3z$ .

נסביר ונמצא למה  $f$  מקבלת ערך מקסימלי ומינימלי בקבוצה  $A := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + 3z^2 = 35, x + y + z = 7\}$ .

הוכחה: נטען  $A$  קבוצה קומפקטית ולכן  $f$  שהיא פונקציה רציפה (פולינום בכמה משתנים) מקבלת עליה מינימום ומקסימום.

נגדיר  $B := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + 3z^2 = 35\}$  ונטען ש- $B$  סגורה וחסומה ולכן לפי משפט היינה-בורל נקבל שהיא קומפקטית.

סגורה: אם  $(x_n, y_n, z_n)_{n=1}^\infty$  סדרה ב- $B$  שמתכנסת ל- $(x, y, z)$  ובפרט  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y, z_n \rightarrow z$ .

לכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים  $x_n^2 + y_n^2 + 3z_n^2 = 35$  לכן מאריתמטיקה של גבולות נסיק שמתקיים  $x^2 + y^2 + 3z^2 = 35$  ולכן  $(x, y, z) \in B$ .

חסומה: נשים לב שמתקיים  $\frac{x^2}{35} + \frac{y^2}{35} + \frac{z^2}{\frac{35}{3}} = 1$  וזה בבירור חסום כי לדוגמה  $x$  מקבל ערך מקסימלי כאשר  $y = z = 0$  ואז  $x = \sqrt{35}$ .

אז  $B$  סגורה וחסומה ולכן לפי משפט היינה-בורל היא קומפקטית.

נגדיר  $C := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 7\}$ , זו בבירור קבוצה לא חסומה אבל זו כן קבוצה סגורה כי אם  $(x_n, y_n, z_n)_{n=1}^\infty$  קבוצה ב- $C$

שמתכנסת ל- $(x, y, z)$  בפרט  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y, z_n \rightarrow z$ .

לכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים  $x_n + y_n + z_n = 7$  ולכן מאריתמטיקה של גבולות נסיק שמתקיים  $x + y + z = 7$  ולכן  $(x, y, z) \in C$ .

אז  $C$  קבוצה סגורה.

נשים לב ש- $A = B \cap C$  ובהצאה ראינו שחיתוך סופי של קבוצות סגורות הוא סגור (זה נובע מכך שאיחוד סופי של קבוצות פתוחות הוא פתוח,

וקבוצה סגורה היא קבוצה שהמשלים שלה הוא פתוח ועם כללי דה-מורגן נקבל את הנדרש).

אז  $A$  קבוצה סגורה אבל מהגדרה  $A \subseteq B$  קומפקטיות וראינו שתת-קבוצה סגורה של קבוצה קומפקטית היא קומפקטית, ולכן  $A$  קומפקטית ולכן

בהכרח  $f$  שרציפה מקבלת עליה מינימום ומקסימום.

אם  $f$  מינימום/מקסימום בנקודה פנימית של  $A$ , נוכל לבדוק לפי איפוס הגרדיאנט

$$\nabla f(x, y, z) = (2 \ 2 \ 3) \neq (0 \ 0 \ 0)$$

אז אין אף נקודה פנימית שבה  $f$  מקבלת מינימום/מקסימום, ולכן נצטרך להשתמש בשיטת כופלי לגראנז' (כי הנקודות קיצון מתקבלות רק על השפה של האילוצים).

נגדיר  $g_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  על-ידי  $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2 - 35$  ו- $g_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  על-ידי  $g_2(x, y, z) = x + y + z - 7$  וכמובן ש- $g_1, g_2$  דיפרנציאביליות ברציפות כי אלו פולינומים ומתקיים

$$\nabla g_1(x, y, z) = (2x \ 2y \ 6z), \quad \nabla g_2(x, y, z) = (1 \ 1 \ 1)$$

יש לנו בפועל שלוש משוואות של אילוצים שאנחנו יכולים להוציא

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g_1(x, y, z) + \mu \nabla g_2(x, y, z) \iff (2 \ 2 \ 3) = \lambda(2x, 2y, 6z) + \mu(1 \ 1 \ 1)$$

בבירור  $\lambda \neq 0$  כי  $(2 \ 2 \ 3) \neq (1 \ 1 \ 1)$  בלתי תלויים לינארית ולכן  $x = \frac{2-\mu}{\lambda} = y$  ואם נציב  $x = y$  באילוץ השני נקבל

$$z = 7 - 2x$$

ומהצבה באילוץ הראשון

$$2x^2 + 3(7 - 2x)^2 = 35 \iff x = 2, 4$$

ולכן הנקודות הן  $(2, 2, 3), (4, 4, -1)$  ומתקיים  $f(2, 2, 3) = 17, f(4, 4, -1) = 13$  ולכן המינימום הוא 13 בנקודה  $(4, 4, -1)$  והמקסימום הוא 17 בנקודה  $(2, 2, 3)$ .

אפשר גם בצורה אלימה לפתור את מערכת המשוואות אז נקבל מערכת משוואות

$$2 = 2x\lambda + \mu \implies \mu = 2 - 2x\lambda$$

$$2 = 2y\lambda + \mu \implies \mu = 2 - 2y\lambda$$

$$3 = 6z\lambda + \mu \implies \mu = 3 - 6z\lambda$$

$$x^2 + y^2 + 3z^2 = 35$$

$$x + y + z = 7$$

□

אבל אני אוותר.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{cases} \frac{x_1^3}{x_1^2 + x_2^2} & x_1 \neq 0 \text{ ו } x_2 \neq 0 \\ 0 & x_1 = x_2 = 0 \end{cases}$$

$$f\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \stackrel{t \neq 0}{=} \frac{t^3}{t^2} \Rightarrow \partial_{x_1} f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} - f\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{t^2} = 1$$

$$\partial_{x_2} f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f\begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} - f\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{0+t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0$$

## שאלה 11

תהיי  $B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - xy + y^2 < 2\}$  ונחשב את האינטגרל  $\int_B (x^2 - xy + y^2) dx dy$  באמצעות משפט חילוף משתנה. פתרון:

**משפט 0.1** (משפט חילוף משתנה – תזכורת): תהינה  $A, B \subseteq \mathbb{R}^k$  קבוצות פתוחות ו- $g : A \rightarrow B$  דיפאומורפיזם (חד-חד ערכית, על, גזירה ברציפות ובעלת הופכית גזירה ברציפות) ו- $f : B \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה רציפה.

אז  $f$  אינטגרבילית על  $B$  אם ורק אם הפונקציה  $(f \circ g)(x) |\det(Dg_x)|$  אינטגרבילית על  $A$  ובמקרה זה מתקיים

$$\int_B f(t) dt = \int_A (f \circ g)(x) |\det(Dg_x)| dx$$

הקבוצה  $B$  מהווה אליפסה סביב הראשית שאינה מקבילה לצירים, ולכן נצטרך לבצע חילוף משתנה לינארי כדי להפוך את האליפסה לעיגול. נשתמש בהשלמה לריבוע:

$$x^2 - xy + y^2 = \left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 - \frac{1}{4}y^2 + y^2 = \left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2$$

נבצע את חילוף המשתנה הלינארי  $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{1}{2}y \\ \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{pmatrix}$  ואז

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}^{-1}$$

נזכר שמתקיים  $\det(T^{-1}) = \frac{1}{\det(T)}$  ולכן

$$dx dy = |\det(T^{-1})| du dv = \frac{2}{\sqrt{3}} du dv$$

נסמן  $A = T(B) = B_2(0) \setminus \{0\}$  אז ממשפט חילוף משתנה, הפונקציה  $f$  אינטגרבילית על  $B$  אם ורק אם  $f \circ T^{-1}$  אינטגרבילית על  $A$  ומתקיים

$$\int_B f(x, y) dx dy = \int_A u^2 + v^2 \cdot \frac{s}{\sqrt{3}} du dv = \frac{2}{\sqrt{3}} \stackrel{\text{קוטביות}}{=} \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 dr d\theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{24\pi}{3\sqrt{3}}$$

□

## שאלה 12

תהיי

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, 1 < xy < 3, x^2 < y^2 < x^2 + 1\}$$

ונחשב באמצעות משפט חילוף משתנה את האינטגרל

$$\int_C (y^2 - x^2)^{xy} (x^2 + y^2) dx dy$$

פתרון:

**משפט 0.2** (משפט חילוף משתנה – תזכורת): תהיינה  $A, B \subseteq \mathbb{R}^k$  קבוצות פתוחות ו- $g : A \rightarrow B$  דיפאומורפיזם (חד-חד ערכית, על, גזירה ברציפות ובעלת הופכית גזירה ברציפות) ו- $f : B \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה רציפה.

אז  $f$  אינטגרבילית על  $B$  אם ורק אם הפונקציה  $(f \circ g)(x) |\det(Dg_x)|$  אינטגרבילית על  $A$  ובמקרה זה מתקיים

$$\int_B f(t) dt = \int_A (f \circ g)(x) |\det(Dg_x)| dx$$

נשים לב שמהאילוץ  $x^2 < y^2 < x^2 + 1$  אנחנו מקבלים  $0 < y^2 - x^2 < 1$  לכן הגיוני שנגדיר  $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ y^2 - x^2 \end{pmatrix}$  ואז

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ -2x & 2y \end{pmatrix}$$

אז

$$\det(J) = 2y \cdot y + x \cdot 2x = 2(x^2 + y^2)$$

ולכן

$$dx dy = |\det(J^{-1})| du dv \implies dx dy = \frac{1}{2(x^2 + y^2)} du dv$$

אז תחום האינטגרציה שלנו יהיה  $A = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < u < 3, 0 < v < 1\}$  ולכן

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) dx dy &= \int_A \frac{v^u \cancel{(x^2 + y^2)}}{2 \cancel{(x^2 + y^2)}} du dv = \frac{1}{2} \int_A v^u du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_1^3 v^u du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[ \frac{v^u}{\ln(v)} \right]_{u=1}^{u=3} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{v^3}{\ln(v)} - \frac{v}{\ln(v)} dv \end{aligned}$$

אבל האינטגרל האחרון הוא לא אינטגרל שאנחנו יודעים לחשב, ולכן נשתמש במשפט פויבני

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^1 \int_1^3 v^u du dv &= \frac{1}{2} \int_1^3 \int_0^1 v^u dv du = \frac{1}{2} \int_1^3 \left[ \frac{v^{u+1}}{u+1} \right]_{v=0}^{v=1} = \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{1^{u+1}}{u+1} du = \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{1}{u+1} du = \frac{1}{2} [\ln(u+1)]_{u=1}^{u=3} \\ &= \frac{1}{2} (\ln(4) - \ln(2)) \end{aligned}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

## שאלה 13

צטטי והוכיחי את משפט הקירוב האופטימלי של טורי פורייה.

הוכחה: ניסוח: יהי  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ותהי  $(v_n)_{n=1}^\infty \in V$ . יהיו  $v \in V$  ו- $N \in \mathbb{N}$ , אזי מתקיים

$$\min_{\alpha_n \in \mathbb{C}} \left\| v - \sum_{i=1}^N \alpha_n v_n \right\| = \left\| v - \sum_{i=1}^N \underbrace{\frac{\langle v_n, v \rangle}{\|v_n\|^2}}_{\text{מקדמי פורייה}} v_n \right\|$$

כלומר, מקדמי פורייה נותנים את הקירוב הטוב ביותר לטור.

הוכחה:

$$\langle v - \sum_{i=1}^N \alpha_n v_n, v - \sum_{i=1}^N \alpha_n v_n \rangle = \|v\|^2 - \sum_{i=1}^N \overline{\alpha_n} \langle v_n, v \rangle - \sum_{i=1}^N \alpha_n \langle v, v_n \rangle + \sum_{i=1}^N |\alpha_n|^2 \|v_n\|^2$$

נסמן  $x_n = \frac{\langle v_n, v \rangle}{\|v_n\|^2}$  ונקבל

$$\left\| v - \sum_{i=1}^N \alpha_n v_n \right\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{i=1}^N (\overline{\alpha_n} x_n - \alpha_n \overline{x_n} + |\alpha_n|^2) \|v_n\|^2$$

נשים לב שמתקיים

$$|\alpha_n - x_n|^2 = (\alpha_n - x_n)(\overline{\alpha_n} - \overline{x_n}) = |\alpha_n|^2 - \overline{\alpha_n} x_n - \alpha_n \overline{x_n} + |x_n|^2$$

ולכן

$$\left\| v - \sum_{i=1}^N \alpha_n v_n \right\|^2 = \|v\|^2 + \sum_{i=1}^N (|\alpha_n - x_n|^2 - |x_n|^2) \|v_n\|^2$$

אז יש לנו ביטוי שתלוי רק ב- $\alpha_n$  ולכן הוא מקסימלי כאשר  $|\alpha_n - x_n|$  מתאפס, כלומר  $\alpha_n = x_n$  ואז

$$\min_{\alpha_n \in \mathbb{C}} \left\| v - \sum_{i=1}^N \alpha_n v_n \right\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{i=1}^N |x_n|^2 \|v_n\|^2$$

□



## שאלה 14

צטטי והוכיחי את עקרון המקומיות.

הוכחה: ניסוח: תהי  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מחזורית עם מחזור  $2\pi$  ואינטגרבילית רימן על  $[-\pi, \pi]$ . נסמן

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

אז לכל  $x \in \mathbb{R}$  ולכל  $0 < \delta \leq \pi$  מתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du = 0$$

כאשר

$$D_N(u) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})u)}{2 \sin(\frac{u}{2})}$$

גרעין דירכלה.

הוכחה: מנוסחת דירכלה אנחנו יודעים שמתקיים

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du$$

ולכן ניתן לכתוב

$$\begin{aligned} S_N(x) - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du \\ &= \int_\delta^\pi \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2 \sin(\frac{u}{2})} \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u\right) du \end{aligned}$$

נגדיר  $\varphi(u) = \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2 \sin(\frac{u}{2})}$  ונשים לב שהיא אינטגרבילית ומוגדרת בכל  $[\delta, \pi]$  מאריתמטיקה של פונקציות אינטגרביליות. נזכיר את הלמה של רימן:  $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרבילית רימן על  $[-\pi, \pi]$  אזי מתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^\pi f(x) \cos(Nx) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^\pi f(x) \sin(Nx) dx = 0$$

ולכן בשילוב עם הלמה של רימן ומה שמצאנו מתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta f(x+u) D_N(u) du = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_\delta^\pi \frac{f(x+u)}{2 \sin(\frac{u}{2})} \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u\right) du = 0$$

□

## שאלה 15

צטטי והוכיחי את משפט "התכנסות נקודתית של טורי פורייה".

הוכחה: ניסוח: תהי  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  מחזורית עם מחזור  $2\pi$ .

יהיו  $x_0 \in \mathbb{R}$  ו- $0 < \delta \leq \pi$  ונגיח ש- $f$  מקיימת את תנאי ליפשיץ ב- $x_0$ . כלומר, יש  $C > 0$  ו- $u \in (0, \delta)$  כך שמתקיים

$$|f(x_0 - u) - f(x_0 - 0)| \leq Cu, |f(x_0 + u) - f(x_0 + 0)| \leq Cu$$

תחת תנאים אלו מתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x_0) = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}$$

הוכחה: נוכיח תכילה שמתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_N(u) du = \frac{1}{2}$$

נגדיר  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  על-ידי  $g(t) = \frac{1}{2}$  אז

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi g(t) dt = \frac{2\pi}{2\pi} = 1, a_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \cos(kt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \sin(kt) dt = b_k$$

אז מעיקרון המקומיות מתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{S_N^g(x)}_{=\frac{1}{2}} - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta \left( \underbrace{g(x+u)}_{=\frac{1}{2}} + \underbrace{g(x-u)}_{=\frac{1}{2}} \right) D_N(u) du = 0 \implies \frac{1}{\pi} \int_0^\delta D_N(u) du = \frac{1}{2}$$

בפרט, מכפל בקבוע נקבל

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)) D_N(u) du = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}$$

לכל  $f$  שמקיימת את תנאי המשפט. אז נפעיל שוב את עיקרון המקומיות ונקבל

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N^f(x_0) - \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0 + u) + f(x_0 - u) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)) D_N(u) du \quad (*)$$

נגדיר  $\varphi(u) = \frac{f(x_0+u)+f(x_0-u)-f(x_0+0)-f(x_0-0)}{2\pi \sin(\frac{u}{2})}$  ולכן

$$(*) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta \varphi(u) \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u\right) du$$

נראה כי  $\varphi(u)$  אינטגרבילית על  $[0, \delta]$  ואז מהלמה של רימן נוכל לסיים. ואכן,  $\varphi(u)$  אינטגרבילית על  $[\varepsilon, \delta]$  לכל  $\varepsilon > 0$  מאריתמטיקה של פונקציות אינטגרביליות ולכן מספיק שנראה חסימות ב-0:

$$|\varphi(u)| \leq \frac{|f(x_0+u)-f(x_0+0)| + |f(x_0-u)-f(x_0-0)|}{2\pi \sin(\frac{u}{2})} \leq \frac{2Cu}{2\pi \sin(\frac{u}{2})} = \frac{Cu}{\pi \sin(\frac{u}{2})}$$

ונשים לב שמלופיטל  $2$   $\frac{u}{\sin(\frac{u}{2})} \rightarrow 2$  ולכן  $\frac{Cu}{\pi \sin(\frac{u}{2})}$  חסום וקיבלנו ש- $\varphi(u)$  אינטגרבילית על  $[0, \delta]$  ולכן נוכל להשתמש בלמה של רימן ולקבל

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta \varphi(u) \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u\right) du = 0 \quad \checkmark$$

נזכיר את הלמה של רימן:  $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרבילית רימן על  $[-\pi, \pi]$  אזי מתקיים

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^\pi f(x) \cos(Nx) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^\pi f(x) \sin(Nx) dx = 0$$

□

## שאלה 16

נסחי והוכיחי את משפט האוסדרוף.

הוכחה:

ניסוח: יהי  $(X, d)$  מרחב מטרי ותהי  $A \subseteq X$ . חסומה לחלוטין אם ורק אם לכל  $(x_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$  יש תת-סדרה קושי.

הוכחה:

$\Rightarrow$  נניח כי לכל  $(x_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$  יש תת-סדרה קושי ונרצה להראות שהיא חסומה לחלוטין.

יהי  $\varepsilon > 0$  ונניח בשלילה שהיא לא חסומה לחלוטין, ולכן לכל  $x_1 \in A$  קיים  $x_2 \in A$  כך שמתקיים  $d(x_1, x_2) \geq \varepsilon$  ובאותו אופן יש  $x_3 \in A$  כך שמתקיים  $d(x_2, x_3) \geq \varepsilon$ . נמשיך אינדוקטיבית ונבנה סדרה  $(x_n)_{n=1}^\infty$  כזאת, אבל זו סדרה שבה המרחק בין כל שני איברים הוא יותר מ- $\varepsilon$  ולכן בפרט אין לה תת-סדרה קושי, וזו סתירה להנחה ש- $A$  לא חסומה לחלוטין.

$\Leftarrow$  נניח כי  $A$  חסומה לחלוטין ונרצה להראות שלכל סדרה  $(x_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$  יש תת-סדרה קושי.

תהי  $(x_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$  סדרה. מהנחת החסימות לחלוטין, עבור  $\varepsilon = 1$  יש  $B_{\varepsilon=1}^1$  כדור המכיל אינסוף מאיברי הסדרה  $(x_n)_{n=1}^\infty$  ונסמן  $V^0 = A$ .

נגדיר  $V^1 = V^0 \cap B_{\varepsilon=1}^1$  ומתקיים  $\text{diam}(V^1) \leq 2$  וגם  $V^1$  חסומה לחלוטין (כתת-קבוצה של קבוצה חסומה לחלוטין).

נמשיך אינדוקטיבית ונגדיר  $V^k = V^{k-1} \cap B_{\varepsilon=\frac{1}{k}}^k$  ומתקיים  $\text{diam}(V^k) \leq \frac{2}{k}$  ונשים לב שמתקיים  $V^k \subset V^{k-1} \dots \subset V^1 \subset V^0 = A$ .

נבחר אם-כך  $x_{n_1} \in V^1, x_{n_2} \in V^2, \dots, x_{n_k} \in V^k$  כך שמתקיים  $n_k < n_l$  לכל  $k < l$  ומתקיים  $\frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$  בגלל  $(*)$  ולכן  $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$  היא סדרת קושי.

□

## שאלה 17

נסחי והוכיחי את המשפט שבמרחב הילברט המרחק לקבוצה קמורה וסגורה (ולא ריקה) מתקבל.

הוכחה:

**ניסוח:** יהי  $(V, \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle})$  מרחב הילברט (כלומר, מרחב מכפלה פנימית שלם) עם הנורמה המושרית מהמכפלה הפנימית.

תהי  $\emptyset \neq U \subseteq V$  קבוצה קמורה וסגורה ב- $V$  ונגדיר לכל  $f \in V$ ,  $\text{Dist}(f, U) = \inf_{u \in U} \|f - u\|$ .

אז קיים ויחיד  $g \in U$  כל שמתקיים  $\text{Dist}(f, U) = \|f - g\|$ .

**הוכחה:** תהי  $g_1 \in U$  אם מתקיים  $\text{Dist}(f, U) = \|f - g_1\|$  סיימנו. אחרת, יש  $g_2 \in U$  כך שמתקיים  $\|f - g_2\| < \|f - g_1\|$ .

נגדיר  $a_n = \|f - g_n\|$  לכל  $n \in \mathbb{N}$  ונקבל סדרה מונוטונית יורדת ממש כך שמתקיים  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \text{Dist}(f, U)$ .

נראה כעת שהסדרה היא קושי, לשם כך עלינו להראות **למה:** במרחב מכפלה פנימית מתקיים כלל המקבילית, כלומר לכל  $x, y \in V$

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

**הוכחת הלמה:** זה נובע ישירות מהגדרת המכפלה הפנימית

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle \\ &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \end{aligned}$$

נשתמש בלמה, מתקיים

$$\begin{aligned} \|g_i - g_j\|^2 &= \|g_i - g_j + f - f\|^2 = \|(f - g_j) - (f - g_i)\|^2 = 2\|f - g_i\|^2 + 2\|f - g_j\|^2 - \|2f - g_i - g_j\|^2 \\ &= \|f - g_i\|^2 + 2\|f - g_j\|^2 - 4\left\|f - \frac{g_i + g_j}{2}\right\|^2 \leq_{\substack{\text{קמורה } U \\ \frac{g_i + g_j}{2} \in U}} 2\|f - g_i\|^2 + 2\|f - g_j\|^2 - 4\text{Dist}(f, U)^2 \\ &\xrightarrow[\substack{j \rightarrow \infty \\ i \rightarrow \infty}]{2\text{Dist}(f, U)^2 + 2\text{Dist}(f, U)^2 - 4\text{Dist}(f, U)^2} = 0 \end{aligned}$$

ולכן  $(a_n)_{n=1}^\infty$  היא סדרת קושי ומהיות המרחב השלם נובע שהיא מתכנסת ולכן קיים  $g_0 \in V$  כך שמתקיים  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g_0$  אבל  $U$  קבוצה סגורה ולכן  $g_0 \in U$ .

**יחידות:** ניוזכר שפונקציית המרחק היא אינווריאנטית להזזה וקבוצה היא קמורה וסגורה אם ורק אם גם ההזזה של היא קבוצה קמורה וסגורה, ולכן מספיק שנראה עבור המקרה של  $f = 0$ .

נניח בשלילה שהמרחק לא יחיד, ולכן יש  $g_1 \neq g_2 \in U$  כך שמתקיים  $\|g_1\| = \|g_2\|$ .

נגדיר  $w = \frac{g_1 + g_2}{2} \in U$  קמורה ונחשב

$$\|w\|^2 = \frac{1}{4}(\|g_1\|^2 + \|g_2\|^2 + 2\Re(\langle g_1, g_2 \rangle)) \leq_{\text{אי-שוויון קושי-שוורץ}} \frac{1}{4}(\|g_1\|^2 + \|g_2\|^2 + \|g_1\|\|g_2\|) - \frac{1}{4}(d^2 + d^2 + 2d^2) = d^2$$

יש שיוויון אם ורק אם  $g_1, g_2$  תלויים לינארית:

אם  $g_1, g_2$  לא תלויים לינארית אז יש אי-שוויון חלש ואז  $\|w\|^2 < d^2$  וזו סתירה להנחה, ולכן יש תלות לינארית.

בלי הגבלת הכלליות,  $g_2 = \alpha g_1$  ומההנחה  $\alpha \neq 1$  אבל  $\|g_1\| = \|g_2\| \implies \|g_1\| = |\alpha|\|g_1\|$  ולכן  $|\alpha| = 1$  אז

$$\|w\|^2 = \frac{1}{4}(\|g_1\|^2 + \|g_2\|^2 + 2\Re(\langle g_1, g_2 \rangle)) = \frac{1}{4}(d^2 + d^2 + 2\Re(\langle g_1, \alpha g_1 \rangle)) = \frac{1}{4}(d^2 + d^2 + 2\Re(\alpha)d^2) = \frac{d^2}{2}(1 + \Re(\alpha))$$

$$\Re(\alpha) < 1 \implies \frac{d^2}{2}(1 + 1) = d^2$$

וזאת שוב סתירה, ולכן ההנחה שלנו של שני ערכים שונים היא סתירה ועל-כן יש רק ערך אחד שמביא את המרחק.

□

## שאלה 18

צטטי והוכיחי את משפט הקירוב של ויירטשטראס.

הוכחה:

**ניסוח:** תהי  $f \in C[0, 1]$  אז קיימת  $(P_n)_{n=1}^\infty$  סדרת פולינומים כך שמתקיים  $P_n \rightrightarrows f$  (מתכנס במידה שווה).  
**הוכחה:** נתחיל מרידוד הבעיה, נגדיר  $g(x) = f(x) - f(0) - x(f(1) - f(0))$  כלומר  $g(x) = f(x) - f(0) - x(f(1) - f(0))$  אז החלק המוסף הוא פולינום ועל-כן רציף ולכן מספיק לבחון את הקירוב ל- $g$ , בלי הגבלת הכלליות נגדיר  $f(0) = f(1) = 0$ .  
נגדיר  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  על-ידי  $F(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [0, 1] \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1] \end{cases}$  זו פונקציה רציפה במידה שווה על כל הישר  $\mathbb{R}$  (מההנחה שעשינו).  
נגדיר  $P_n(x) = \int_{-1}^1 F(x+u)Q_n(u)du$  כאשר  $Q_n = C_n(1-u^2)^n$  ו- $C_n$  הוא קבוע נרמול כך שיתקיים  $\int_{-1}^1 Q_n(u)du = 1$ .  
מהגדרת התומך, אם  $F(x+u) \neq 0$  אז  $x+u \in [0, 1]$  כלומר  $x \in [-u, 1-u]$  ולכן

$$\int_{-x}^{1-x} F(x+u)Q_n(u)du = \int_0^1 F(t)Q_n(t-x)dt$$

ומהמשפט היסודי, מהיות  $Q_n$  פולינום נקבל ש- $P_n$  פולינום.

$F$  רציפה, אז עבור  $\varepsilon > 0$  יש  $\delta > 0$  כך שאם  $|x-y| \leq 2\delta$  אז  $|F(x) - F(y)| < \varepsilon$ . נחשב

$$\begin{aligned} |P_n(x) - F(x)| &= \left| \int_{-1}^1 F(x+u)Q_n(u)du - F(x) \right| \\ &\stackrel{(1)}{=} \left| \int_{-1}^1 F(x+u)Q_n(u)du - \int_{-1}^1 F(x)Q_n(u)du \right| \\ &\stackrel{(2)}{\leq} \int_{-1}^1 |F(x+u) - F(x)|Q_n(u)du \\ &\leq \underbrace{\int_{-1}^\delta |F(x+u) - F(x)|Q_n(u)du}_{I_1} + \underbrace{\int_{-\delta}^\delta |F(x+u) - F(x)|Q_n(u)du}_{I_2} + \underbrace{\int_\delta^1 |F(x+u) - F(x)|Q_n(u)du}_{I_3} \end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מהיות  $\int_{-1}^1 Q_n(u)du = 1$  ו-(2) זה אי-שוויון המשולש האינטגרלי. מרציפות  $F$  יש נקבל

$$I_2 < \varepsilon \int_{-\delta}^\delta Q_n(u)du \leq \varepsilon \int_{-1}^1 Q_n(u)du = \varepsilon$$

וכן מהרציפות נובע ש- $F$  חסומה, ולכן קיים  $0 < M \in \mathbb{R}$  חסם ואז

$$I_3 \leq 2M \int_\delta^1 Q_n(u)du = 2MC_n \int_\delta^1 (1-u^2)^n du \leq 2MC_n \underbrace{(1-\delta^2)}_{\text{גבולות אינטגרציה}} \underbrace{(1-\delta)}_{\text{סופרמום}} \leq 2MC_n(1-u^2)^n$$

כעת, נרצה לחסום את  $C_n$  ונזכור שהוא מנרמל כך שיתקיים  $\int_{-1}^1 Q_n(u)du = 1$  אז

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1-u^2)^n du &\geq \int_{\frac{-1}{\sqrt{n}}}^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1-u^2)^n du \stackrel{(1)}{\geq} 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1-u^2)^n du \stackrel{(2)}{\geq} 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} 1 - nu^2 du \\ &\geq 2 \left[ u - \frac{nu^3}{3} \right]_{u=0}^{u=\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}^3}}{3} = \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{3\sqrt{n}} = \frac{4}{3\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \implies C_n \leq \sqrt{n} \end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מהיות הפונקציה סימטרית על קטע סימטרי, (2) זה אי-שוויון ברנולי.

נבחין שהקטעים  $I_1, I_3$  הם סימטריים ולכן בסך-הכל מתקיים  $|P_n(x) - F(x)| < \varepsilon + 4MC_n(1-\delta^2)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

כלומר, לכל  $n \in \mathbb{N}$  יש  $M > n$  כך שמתקיים לכל  $x \in \mathbb{R}$   $|P_n(x) - F(x)| < 2\varepsilon$  וזה בדיקת אומר  $P_n \rightrightarrows f$  ובפרט  $P_n \xrightarrow{\mathbb{R}} f$  □

## שאלה 19

צטטי והוכיחי את משפט סטון-ויירשטראס.

הוכחה:

ניסוח: יהי  $(X, \rho)$  מרחב מטרי ו- $K \subseteq X$  קבוצה קומפקטית. נסתכל על המרחב  $(C(K), \|\cdot\|_\infty)$  כאשר

$$C(K) := \{f : K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ רציפה}\}, \quad \|\cdot\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|$$

תהיי  $\bar{A} = C(K)$  אלגברה, מפרידה בין נקודות ואינה מתאפסת באף נקודה. אז

הוכחה: נשתמש בשתי למות ללא הוכחה למה 1:  $A$  אלגברה בתנאי המשפט ויהיו  $x_1, x_2 \in X$  ו- $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ .

אז יש  $f \in A$  כך שמתקיים  $f(x_1) = c_1, f(x_2) = c_2$ .

למה 2: אם  $A$  אלגברה ב- $C(K)$  אז גם  $\bar{A}$  אלגברה ב- $C(K)$ .

כעת נוכיח שתי למות נוספות:

למה 3:  $A$  אלגברה בתנאי המשפט ו- $f \in A$  אז  $|f| \in \bar{A}$ .

הוכחת למה 3: יהי  $\varepsilon > 0$ , מספיק להוכיח שיש  $\varphi \in \bar{A}$  כך שמתקיים  $\sup_{x \in K} |f(x) - \varphi(x)| < \varepsilon$ .

ניקח  $d = \sup_{x \in K} |f(x)|$  ונגדיר  $g(t) : [-d, d] \rightarrow \mathbb{R}$  על-ידי  $g(t) = |t|$  זו פונקציה רציפה ולכן ממשפט הקירוב של ויירשטראס יש  $(P_n)_{n=1}^\infty$

סדרת פולינום כך שלכל  $t \in [-d, d]$  מתקיים  $|t| - P_n(t) < \varepsilon$  ולכן בפרט לכל  $x \in K$  מתקיים גם  $|f(x)| - P_n(f(x)) < \varepsilon$  אז

$$|f| \in \bar{A} \text{ ונקבל } \bar{A} \ni \varphi = P_n(f(x))$$

למה 4: אם  $f, g \in \bar{A}$  אז  $\max(f, g), \min(f, g) \in \bar{A}$ .

הוכחת למה 4: נגדיר  $\max(f, g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \min(f, g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}$  ויחד עם למות 2,3 זה מסיים (המקרה הכללי באינדוקציה).

הוכחת המשפט: יהיו  $f \in C(K), x \in K, \varepsilon > 0$ . נרצה לבנות פונקציה  $g_x$  כך שיתקיים

$$1. g_x \in \bar{A} \quad 2. g_x(x) = f(x) \quad 3. \forall t \in K, g_x(t) > f(t) - \varepsilon$$

מהלמה הראשונה, לכל  $y \in K$  יש  $h_y \in A$  כך שמתקיים  $h_y(y) = f(y), h_y(x) = f(x)$  ולכן נגדיר  $J_y = \{t \in K \mid h_y(t) > f(t) - \varepsilon\}$ .

ברור  $y \in J_y$  וזה כיסוי פתוח של  $K$  ומהקומפקטיות יש לו תת-כיסוי סופי, כלומר  $K = \bigcup_{i=1}^n J_{y_i}$ .

נגדיר  $g_x = \max(h_{y_1}, \dots, h_{y_n})$  ומהלמה הרביעית נקבל  $g_x \in \bar{A}$  ומתקיים  $g_x(x) = f(x)$  ולכן  $h_{y_1}(x) = \dots = h_{y_n}(x) = f(x)$ .

לכל  $t \in K$  יש  $i \in [n]$  כך ש- $t \in J_{y_i}$  ולכן  $g_x(t) \geq h_{y_i}(t) > f(t) - \varepsilon$ .

נגדיר  $\hat{J}_x = \{t \in K \mid g_x(t) < f(t) + \varepsilon\}$  וכמוכן  $x \in \hat{J}_x$  ושוב זה כיסוי פתוח של  $K$  ומהקומפקטיות  $K = \bigcup_{i=1}^m \hat{J}_{x_i}$  ונגדיר  $\varphi(t) =$

$\min(g_{x_1}(t), \dots, g_{x_m}(t))$  ולכן  $t \in K$  יש  $j \in [m]$  כך שמתקיים  $t \in \hat{J}_{x_j}$  ואז  $g_{x_j}(t) < f(t) + \varepsilon$  ולכן בפרט  $\varphi(t) \leq g_{x_j}(t) < f(t) + \varepsilon$

וגם  $\varphi(t) = g_{x_j}(t) > f(t) - \varepsilon$  ולכן בפרט  $\|\varphi - f\|_\infty < \varepsilon$  כלומר  $\bar{A} = C(K)$ .  $\square$

## שאלה 20

עבור  $p \neq 3$  ראשוני נגדיר  $K_p$  שדה הפיצול של הפולינום  $x^9 - 1$  מעל  $\mathbb{F}_p$ .

נמצא את כל חבורות גלואה האפשריות  $G(K_p/\mathbb{F}_p)$ .

הוכחה: ראשית, שדה הפיצול הוא יחיד עד כדי איזומורפיזם וידוע ש- $K_p = \mathbb{F}_p(\xi_9)$ , ולכן מטענה שראינו על חבורות גלואה של הרחבות

ציקלוטומיות מתקיים  $\text{Gal}(K_p/\mathbb{F}_p) \simeq (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ .

זו חבורה מגודל 6 וגם  $\varphi_{\text{אייילר}}(9) = 6$  ולכן המחלקים האפשריים של חבורה מסדר 6 הם  $\{1, 2, 3, 6\}$  או  $\{1, 2, 3, 6\}$ .

אנחנו רוצים למצוא את ה- $n$  המינימלי כך ש- $\mathbb{F}_{p^n}$  מכיל את  $\xi_9$ , אז זה בדיקת ה- $n$  המינימלי כך ש- $9 \mid (p^n - 1)$  כאשר  $n \in \{1, 2, 3, 6\}$  ו- $p \neq 3$

ראשוני. אז

$$1. \text{ עבור } (p^1 - 1) \mid 18 \text{ נבחר } p = 19 \text{ שראשוני ואז } 18 \equiv 0 \pmod{9} \text{ כלומר } 19 - 1 = 18 \pmod{9}$$

$$2. \text{ עבור } (p^2 - 1) \mid 18 \text{ נשים לב ש-} p = 2 \text{ לא מתאים, עבור } p = 5 \text{ נקבל } 25 \not\equiv 1 \pmod{9} \text{ אז לא מתאים, עבור } p = 7 \text{ נקבל } 49 \not\equiv 1 \pmod{9} \text{ אז גם לא}$$

$$\text{מתאים, עבור } p = 9 \text{ כמובן שלא מתאים, } p = 11 \text{ אז } 11^2 = 121 \not\equiv 1 \pmod{9} \text{ וגם } 13^2 = 169 \not\equiv 1 \pmod{9} \text{ ועבור } p = 17 \text{ נקבל } 17^2 \equiv 1 \pmod{9} \text{ כלומר}$$

$$p = 17 \text{ מקיים את מה שרצינו}$$

$$3. \text{ עבור } (p^3 - 1) \mid 124 \text{ נבחר } p = 5 \text{ ואז עבור } p = 5 \text{ נקבל } 125 - 1 = 124 \not\equiv 0 \pmod{9} \text{ נקבל } p = 7 \text{ נקבל } 7^3 = 343 \equiv 1 \pmod{9} \text{ אז } p = 7$$

$$4. \text{ עבור } (p^6 - 1) \mid 64 \text{ אם נבחר } p = 2 \text{ נקבל } 2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9}$$

עשיתי את כל החישובים בכוח, אפשר גם לא בכוח?

□

## שאלה 21

נמצא במפורש את כל ההרחבות הריבועיות של  $\mathbb{Q}(\xi_{21})$ .

הוכחה: הפולינום המינימלי הוא  $\Phi_{21}(x)$  שאין שום מצב שאזכור אותו, אז נתעלם ממנו. מתקיים

$$\varphi_{\text{אייילר}}(21) = |\{x \in [20] \mid \gcd(21, x) = 1\}| = |\{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}| = 12$$

ולפי משפט שראינו מתקיים  $[\mathbb{Q}(\xi_{21}) : \mathbb{Q}] = 12$  ולכן לפי עוד משפט שראינו מתקיים  $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi_{21})/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/21\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$  מסדר 12. במטלה ראינו שמשפט השאריות הסיני רלוונטי לחבורות הכפליות ולכן

$$(\mathbb{Z}/21\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \simeq C_2 \times C_6 \simeq C_6 \times C_2 \underset{\text{משפט המיון}}{\simeq} (C_2 \times C_2) \times C_3$$

יש 3 תתי-חבורות מסדר 2, אחת מסדר 3, אחת מסדר 4 ו-3 מסדר 6 (גוגל).

מהתאמת גלואה, יש התאמה חד-חד ערכית ועל בין תתי-חבורות לבין שדות ביניים כך שלכל תתי-חבורה מתאים שדה ביניים כך שדרגת ההרחבה של שדות היא האינדקס של של תתי-החבורה (כלומר, תתי-חבורה מסדר 6 היא מאינדקס 2 ולכן מובילה להרחבה ריבועית):

דרגת ההרחבה	אינדקס	סדר תתי-החבורה
12	12	1
6	6	2
4	4	3
3	3	4
2	2	6
1	1	12

לפי תרגיל 7.5.13 "שראינו" בסיכומים של מיכאל מתקיים  $\mathbb{Q}(\xi_3, \xi_7) = \mathbb{Q}(\xi_{21})$  ו- $\xi_3, \xi_7$  הם בלתי תלויים לינארית (הם יוצרים הרחבה מדרגה 12 ביחד בעוד שהדרגה של המכפלה שלהם היא  $2 \cdot 6 = 12$   $\varphi_{\text{אייילר}}(3) \cdot \varphi_{\text{אייילר}}(7) = 2 \cdot 6 = 12$  והפולינומים המינימליים שלהם זרים, אז אין תלות לינארית ביניהם).

נזכור שתתי-חבורה של חבורה אבלית היא תמיד חבורה נורמלית וכל חבורה כזאת וויתרתי באמצע. □



## שאלה 22

נוכיח שלא בהכרח אם  $f \in \mathbb{F}[x]$  פולינום אי-פריק וספרבילי מדרגה  $n$  ו- $E$  שדה פיצול שלו אז  $\text{Gal}(E/F)$  יש איבר מסדר  $n$ .

הוכחה: ניקח  $F = \mathbb{Q}$  ואת  $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ .

ראשית הוא אי-פריק באמצעות Rational root theorem כי  $a_0 = 1$  וגם  $r = \pm 1 \mid a_n = 1$ .

אז  $f(1) = 1^4 - 10 + 1 = -8$ ,  $f(-1) = (-1)^4 - 10 \cdot (-1)^2 + 1 = -8$  למכפלה של פולינום מדרגה 1 ועם פולינום מדרגה 3.

אז אם הוא פריק, יש לו פירוק למכפלה של דרגות 2, כלומר

$$\begin{aligned} x^4 - 10x^2 + 1 &= (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) = x^4 + cx^3 + dx^2 + ax^3 + acx^2 + adx + bx^2 + bcx + bd \\ &= x^4 + x^3(a + c) + x^2(d + ac + b) + x(ad + bc) + bd \end{aligned}$$

אז

$$bd = 1 \iff b = d = 1 \vee b = d = (-1)$$

$$a + c = 0 \iff a = -c$$

$$ad + bc = 0 \iff ad = -bc \iff -cd = -bc$$

אם  $a = c = 0$  אז  $d + ac + b = d + b = 10$  וזה לא ייתכן כי  $b = d = -1 \vee b = d = 1$ . אז  $c \neq 0$ .

$$d + ac + b = 10 \iff d - c^2 + b = 10 = \begin{cases} c^2 = -8 & d = b = 1 \\ c^2 = -12 & d = b = (-1) \end{cases}$$

אז שוב הגענו למצב שאין פיתרון ולכן  $f(x)$  אי-פריק מעל  $\mathbb{Q}$ .

הוא ספרבילי, כי  $f'(x) = 4x^3 - 20x = 4x(x^2 - 5)$  כלומר השורשים הם  $x = 0, x = \pm\sqrt{5}$  אבל  $f(0) \neq 0 \wedge f(\sqrt{5}) \neq 0 \wedge f(-\sqrt{5}) \neq 0$  (הם לא שורשים של  $f$  וראינו ששורש של  $f$  הוא שורש מרובה אם ורק אם  $(f'(x) = 0)$ ).

נרצה למצוא את השורשים של  $f$ : נגדיר  $y = x^2$  ואז  $f$  נהפך להיות  $y^2 - 10y + 1$ , מנוסחת השורשים

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 4}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{96}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{16 \cdot 6}}{2} = \frac{10 \pm 4\sqrt{6}}{2} = 5 \pm 2\sqrt{6}$$

כלומר  $\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}, \sqrt{5 - 2\sqrt{6}}, -\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}, -\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$  הם השורשים של  $f$ .

נניח כעת שאפשר לפשט את הביטוי הזה, כלומר

$$\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} \iff 5 + 2\sqrt{6} = a + b + 2\sqrt{ab} \iff \{a + b = 5 \quad ab = 6 \iff a = 2, b = 3$$

אז בעצם  $E = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{2})$  ולכן  $[E : \mathbb{Q}] = 4$  ואנחנו יודעים שמתקיים  $|\text{Gal}(E/\mathbb{Q})| = 4$  ויש רק שני חבורות מסדר 4 והן  $V_4, \mathbb{Z}_4$  (חבורת קליין והחבורה הציקלית מסדר 4).

נטען שזו חייבת להיות חבורת קליין: חבורת גלואה מכילה את כל האוטומורפיזמים שהם תמורות על השורשים.

נסמן  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}, \beta = \sqrt{2} - \sqrt{3}$  אז ייתכן רק  $\sigma : \sqrt{\alpha} \mapsto -\sqrt{\alpha}, \tau : \sqrt{\beta} \mapsto -\sqrt{\beta}$  ואז ייתכן שחבורת גלואה מכילה רק את אוטומורפיזם הזהות, הנגדי ל- $\sqrt{\alpha}$ , הנגדי ל- $\sqrt{\beta}$  והאוטומורפיזם ששולח לנגדי של  $\sqrt{\alpha}, \sqrt{\beta}$ .

כל איבר פה הוא מסדר 2 ואין אף איבר מסדר 4 ולכן לא ייתכן שהחבורה תהיה איזומורפית לחבורה הציקלית מסדר 4 ולכן  $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \simeq V_4$ .

אז זה מהווה דוגמה נגדית לטענה.

□

## שאלה 23

נמצא את  $|\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})/\mathbb{Q})|$  עבור  $n \in \mathbb{N}$ .

פתרון: הפולינום המינימלי של השדה  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  הוא  $f(x) = x^n - 2$ .

שדה הפיצול מעל  $\mathbb{Q}$  יהיה  $F = KL$  עבור  $K = \mathbb{Q}(\xi_n)$  ו-  $L = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  אז הסדר של חבורת גלואה יהיה

$$[F : \mathbb{Q}] = \frac{[K : \mathbb{Q}] \cdot [L : \mathbb{Q}]}{[K \cap L : \mathbb{Q}]} = \frac{n\varphi_{\text{אייילר}}(n)}{[K \cap L : \mathbb{Q}]} = \frac{n\varphi_{\text{אייילר}}(n)}{m}$$

ונתקעתי פה כי זה לא בחומר מסתבר?

$f$  אי-פריק מקריטריון אייזנשטיין מעל  $\mathbb{Z}[x]$  עם  $p = 2$  ומתקיים  $\text{cont}(x^n - 2) = \text{gcd}(1, 2) = 1$  ולכן מהלמה השנייה של גאוס הוא אי-פריק

מעל  $\mathbb{Q}$  ועל-כן  $[\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) : \mathbb{Q}] = n$ .

השורשים של הפולינום נתונים על-ידי  $\sqrt[n]{2}\xi^k$  עבור  $0 \leq k \leq n-1$ ,  $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ .

כלומר,  $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , כי היא נוצרת על-ידי איבר אחד  $\sqrt[n]{2} \mapsto \sqrt[n]{2}\xi^k$  עבור  $0 \leq k \leq n-1$ . □

## שאלה 24

נוכיח שהטענה הבאה לא נכונה: עבור  $n \in \mathbb{N}$ , שדה הפיצול של  $x^n - 2$  מעל  $\mathbb{Q}$  הוא מדרגה  $n \cdot \varphi_{\text{אייילר}}(n)$ .

הוכחה: ראינו כבר ש- $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\xi_8) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$  (בגלל שמצאנו את כל השדות ביניים של  $\mathbb{Q}(\xi_8)$ ).

שדה הפיצול של  $x^8 - 2$  הוא  $\mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}, i)$  שהוא מדרגה 16 מעל  $\mathbb{Q}$  בעוד

$$8 \cdot \varphi_{\text{אייילר}}(8) = 8 \cdot |\{x \in \{1, \dots, 7\} \mid \gcd(x, 8) = 1\}| = 8 \cdot |\{1, 3, 5, 7\}| = 8 \cdot 4 = 32$$

נשים לב

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}, i) : \mathbb{Q}] = 8 \cdot 2 = 16$$

□

כי  $\sqrt[8]{2}$  הוא שורש של הפולינום  $x^8 - 2$  שהוא אי־פריק מעל  $\mathbb{Q}$  עם קריטריון אייזנשטיין עם  $p = 2$

## שאלה 25

יהי  $E$  שדה הפיצול של  $f(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ . נמצא את הגודל של  $E$  ונמצא את טיפוס האיזומורפיזם של  $\text{Gal}(E/\mathbb{F}_2)$ .

הוכחה: ל- $f$  יש שורש יחיד ב- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$  ומתקיים

$$f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 = 0$$

$$f(0) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 \neq 0$$

אז  $x = 1$  הוא שורש, כלומר  $f(x) = (x+1)g(x)$  עבור  $g(x) \in \mathbb{F}_2[x]$  פולינום מדרגה 6 ואם נעשה חלוקת פולינומים

$$\begin{aligned} \frac{x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + x + 1}{x+1} &= \frac{(x+1)(x^6) + x^3 + x^2 + x + 1}{x+1} = x^6 + \frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x+1} = x^6 + \frac{(x+1)x^2 + x + 1}{x+1} \\ &= x^6 + x^2 + \frac{x+1}{x+1} = x^6 + x^2 + 1 = g(x) \end{aligned}$$

אין שורש ל- $g(x)$  כי  $g(0) = 1 \neq 0, g(1) = 3 = 1 \neq 0$ .

נשים לב  $(x^3 + x + 1)(x^3 + x + 1) = x^6 + x^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$  וזה כבר פולינום אי-פריק כי הוא מדרגה 3 ובלי שורשים ולפי מטלה 1 נקבל שהוא אי-פריק. אז

$$f(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x+1)(x^3 + x + 1)^2$$

בשביל השדה פיצול נצטרך להוסיף את השורשים של  $x^3 + x + 1$  אז אם נסמן ב- $\alpha$  את השורש של הפולינום הזה ונסתכל על  $E = \mathbb{F}_2(\alpha)$ . הוספנו את  $\alpha$ , כלומר הוספנו אופציה לביטוי לינארי אז החזקות שיכולות להיות הן של  $\alpha$  עד חזקת 2, אז כל איבר ב- $\mathbb{F}_2(\alpha)$  הוא מהצורה

$$a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 \quad (a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{F}_2)$$

ולכן בסיס להרחבה הוא

$$\{1, \alpha, \alpha^2\}$$

צריך להראות שהבסיס בלתי-תלוי לינארי ובשביל זה צריך להראות ש- $\alpha, \alpha^2$  בלתי-תלויים לינארית: כי אם הם היו תלויים לינארית, היה צריך להתקיים

$$a_1\alpha + a_2\alpha^2 = 0 \quad (a_1, a_2 \in \mathbb{F}_2)$$

אם  $a_1 = a_2 = 0$ , סיימנו. אם  $a_1, a_2 = 1$  אז  $\alpha + \alpha^2 = 0 \iff \alpha(1 + \alpha) = 0$  וזו סתירה לאי-פריקות שמצאנו.

נשאר  $(a_1 = 1 \wedge a_2 = 0) \vee (a_1 = 0 \wedge a_2 = 1)$  ושניהם מובילים לאותה סתירה על האי-פריקות שמצאנו.

אז זה אכן בסיס, ויש לנו  $2^3 = 8$  אפשרויות לאיברים, כלומר כל האיברים בהרחבה הם

$$\{0, 1, \alpha, \alpha^2, 1 + \alpha, 1 + \alpha^2, \alpha + \alpha^2, 1 + \alpha + \alpha^2\}$$

אז  $|E| = 8 = 2^3$ , אז  $E = \mathbb{F}_2(\alpha) = \mathbb{F}_{2^3}$  (כי יש רק שדה אחד עם 8 איברים).

עובר טיפוס האיזומורפיזם לפי משפט שראינו יתקיים  $\text{Gal}(E/\mathbb{F}_2) = \text{Gal}(\mathbb{F}_{2^3}/\mathbb{F}_2) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ .

□