

פתרון מטלה 10 – תורת הקבוצות, 80200

17 ביוני 2025



שאלה 1

תהי X קבוצה.

סעיף א'

נוכיח ש- X טרנזיטיבית אם ורק אם $X \subseteq \mathcal{P}(X)$.

הוכחה: \Leftarrow נניח כי X טרנזיטיבית ונרצה להראות ש- $X \subseteq \mathcal{P}(X)$.

יהי $x \in X$. מהגדרת הטרנזיטיביות, מתקיים $x \subseteq X$ ולכן מהגדרת קבוצת החזקה $\mathcal{P}(X)$ ובהפרט מהגדרת תת-קבוצה מתקיים $x \subseteq \mathcal{P}(X)$.

\Rightarrow נניח שמתקיים $X \subseteq \mathcal{P}(X)$ ונראה ש- X טרנזיטיבית.

יהי $X \subseteq \mathcal{P}(A)$ ויהי $x \in X$. מהגדרת תת-הקבוצה מתקיים $x \in \mathcal{P}(X)$ ומהגדרת קבוצת החזקה מתקיים $x \subseteq X$ וזה נכון לכל $x \in X$, וזו בידיוק

ההגדרה של טרנזיטיביות (קבוצה x תקרא טרנזיטיבית אם לכל $y \in x$ ולכן $z \in y$ מתקיים $z \in x$). \square

סעיף ב'

נוכיח שאם X טרנזיטיבית אז $\mathcal{P}(X)$ טרנזיטיבית.

הוכחה: יהי $Y \in \mathcal{P}(X)$ ולכן $Y \subseteq X$.

אז לכל $x \in Y$ מתקיים $x \in X$ ולכן $x \subseteq X$ – משמע $x \in \mathcal{P}(X)$ כי X טרנזיטיבית.

זה נכון לכל $x \in Y$ ולכן $Y \subseteq \mathcal{P}(X)$, וזו בידיוק הגדרת הטרנזיטיביות ולכן $\mathcal{P}(X)$ טרנזיטיבית. \square

סעיף ג'

נמצא את כל הקבוצות X כך ש- $\mathcal{P}(X)$ סודר.

הוכחה: ראשית, ברור כי עבור $X = \emptyset, \mathcal{P}(X) = \{\emptyset\}$ וראינו בהרצאה שהקבוצה הריקה היא סודר, וראינו גם כי כל $n \in \omega$ הוא סודר (כי ω הוא

סודר וכל איבריו הם סודרים).

כעת, ניזכר שקבוצה X תיקרא סודר אם

1. הקבוצה טרנזיטיבית

2. $\langle X, \in \rangle$ הוא סדר טוב

\square TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

שאלה 2

תהי X קבוצה שאיבריה הם קבוצות טרנזיטיות.

סעיף א'

נוכיח ש- $\bigcup X$ קבוצה טרנזיטית.

הוכחה: נניח כי $X \neq \emptyset$.

נתחיל מלהוכיח טענה: תהי $A \in X$, זוהי קבוצה טרנזיטית מהנתון ונראה כי $\bigcup A \subseteq A$.

בשאלה הקודמת ראינו ש- $x \subseteq A \iff x \in \mathcal{P}(A)$ ולכן $\forall x \in A \Rightarrow x \in \mathcal{P}(A)$ ולכן $\forall x \in A \Rightarrow x \subseteq A$.

זה אומר שמתקיים $\bigcup x \in A = A$ מהגדרה ולכן $\bigcup A \subseteq A$.

נשים לב שזה גורר גם ש- A טרנזיטית (זה בעצם אם ורק אם): יהי $x \in A$ אז $x \subseteq \bigcup A \subseteq A$ ומהגדרת האיחוד קיבלנו ש- $\forall x, x \in A \Rightarrow x \subseteq A$ וזו הגדרת הטרנזיטיות.

כעת, תהי $x \in X$, היא טרנזיטית ולכן מהטענה לעיל נקבל $\bigcup x \subseteq x$, נפעיל את פעולת האיחוד על שני האגפים ונקבל $\bigcup \bigcup X \subseteq \bigcup X$ ומהטענה שראינו לעיל (מהכיוון השני) נקבל ש- $\bigcup X$ גם טרנזיטית. \square

סעיף ב'

נוכיח ש- $\bigcap X$ קבוצה טרנזיטית.

הוכחה: יהי $y \in \bigcap X$ משמע $y \in x$ $\forall x \in X$.

מתקיים גם $y \subseteq \bigcap X$ $\forall x \in X, y \in x \Rightarrow y \subseteq x$ משמע קיבלנו שהחיתוך הוא טרנזיטי. \square

שאלה 3

תהי X קבוצה ונניח ש- $R_1, R_2 \subseteq X \times X$ יחסים על X כך ש- R_2 יחס אנטי־רפלקסיבי וטרנזיטיבי ו- R_1 מקיים שלכל $x, y \in X$ שונים מתקיים $(x, y) \in R_1$ או $(y, x) \in R_1$.

נוכיח שאם $R_1 \subseteq R_2$ אז מתקיים $R_1 = R_2$.

הוכחה: היות ו- R_2 הוא אנטי־רפלקסיבי זה גם אומר שכל $(x, y) \in R_2$ בהגדרה מתקיים $x \neq y$.

יהי $(x, y) \in R_2$ כך ש- $x \neq y$ ונרצה להראות ש- $(x, y) \in R_1$.

מהגדרת R_1 נובע כי אחד מהבאים מתקיים

1. $(x, y) \in R_1$ – אם זה המקרה, סיימנו

2. $(y, x) \in R_1$ – אם זה המקרה, נראה שנגיע לסתירה: נניח כי $(y, x) \in R_1$, מכך שמתקיים $R_1 \subseteq R_2$ נובע כי $(y, x) \in R_2$, ומהנתון R_2

טרנזיטיבי ולכן $(x, x) \in R_2$ אבל R_2 הוא אנטי־רפלקסיבי ולכן $(x, x) \notin R_2$ וזאת סתירה.

לכן האפשרות היחידה היא ש- $(x, y) \in R_1$.

הראינו שלכל $(x, y) \in R_2$ מתקיים $(x, y) \in R_1$ ולכן $R_2 \subseteq R_1$ ומהכלה דו־כיוונית נקבל $R_2 = R_1$.

□