

פתרון מטלה 06 – אנליזה פונקציונלית, 80417

23 במאי 2025



שאלה 1

יהי $1 \leq p < \infty$ ונגדיר את המרחב ℓ^p להיות מרחב הסדרות הממשיות $(x_n)_{n=1}^\infty$ המקיימות $\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p < \infty$ ונגדיר $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$. באינפי 3 ראינו שזו נורמה על ℓ^p .

סעיף א'

נוכיח שאם $p \neq 2$ אז $\|\cdot\|_p$ אינה מושרית ממכפלה פנימית על ℓ^p .
הוכחה: נשים לב שההקבלה לטענה שאנחנו מתבקשים להוכיח היא שהנורמה על המרחב $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ מושרית ממכפלה פנימית אם ורק אם $p = 2$:
 \Leftarrow נניח כי הנורמה על המרחב $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ מושרית ממכפלה פנימית ונראה כי $p = 2$.
מהיות ℓ^p מרחב נורמי, נובע משאלה 4 כי הוא מושרה ממכפלה פנימית אם ורק אם הוא מקיים את כלל המקבילית.
לכן מספיק שניקח $x = (1, 0, 0)$, $y = (0, 1, 0)$ ונשים לב שמתקיים $\|x\| = \|y\| = 1$. מכלל המקבילית מתקיים:

$$\|x + y\|_p^2 + \|x - y\|_p^2 = 2 \cdot 2^{\frac{2}{p}} = 4 = 2 + 2 = 2\|x\|_p^{\frac{2}{p}} + 2\|y\|_p^{\frac{2}{p}} \iff 2^{\frac{2}{p}} = 2 \iff p = 2$$

\implies נניח כי $p = 2$ ונראה כי הנורמה על המרחב $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ מושרית ממכפלה פנימית. יהיו $x = (x_n)$, $y = (y_n) \in \ell^2$ ונגדיר

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$$

נראה כי זו אכן מכפלה פנימית:

1. לינאריות ברחיב הראשון: יהיו $x, y, z \in \ell^2$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$, מתקיים:

$$\langle \alpha x + y, z \rangle = \sum_{n=1}^\infty (\alpha x_n + y_n) z_n = \alpha \sum_{n=1}^\infty x_n z_n + \sum_{n=1}^\infty y_n z_n = \alpha \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$$

2. סימטריה: ישיר

3. אי-שליליות:

$$\infty > \langle x, x \rangle = \sum_{n=1}^\infty x_n^2 \geq 0$$

וכמובן $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ והביטוי לעיל קטן מאינסוף כי אנחנו ב- ℓ^2 .

ולכן זו אכן מכפלה פנימית, ולכן היא מקיימת את כלל המקבילית והנורמה:

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{n=1}^\infty |x_n|^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

□

נורמה על ℓ^2 המושרית ממכפלה פנימית.

סעיף ב'

נוכיח שנורמת ∞ על המרחב $C[a, b]$ אינה מושרת ממכפלה פנימית.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נבחן את $C[0, 1]$ (שאר המקרים יתקבלו על-ידי מתיחה והזזה של פונקציות). נגדיר

$$f(x) = x, g(x) = 1 - x$$

מתקיים

$$\|f\|_\infty^2 = 1 = \|g\|_\infty^2$$

וגם מתקיים

$$f + g = x + 1 - x = 1, f - g = x - 1 + x = 2x - 1$$

ואז

$$\|f + g\|_{\infty}^2 = 1, \quad \|f - g\|_{\infty}^2 = 1$$

אבל אם נורמת ∞ הייתה מושרית ממכפלה פנימית, היא הייתה מקיימת את תנאי המקבילית, אבל

$$2(\|f\|^2 + \|y\|^2) = 2(1 + 1) = 4 \neq 2 = 1 + 1 = \|f + g\|^2 + \|f - g\|^2$$

ולכן נורמת ∞ על המרחב $C[0, 1]$ לא מושרית ממכפלה פנימית.

□

שאלה 2

יהי $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ו- $x, (x_k)_{k=1}^\infty \in H$.

סעיף א'

נראה כי אם $\|x_k\| \rightarrow \|x\|$ וגם $\langle x, x_k \rangle \rightarrow \langle x, x \rangle$ אז $x_k \rightarrow x$.

הוכחה: מתקיים

$$\|x - x_k\|^2 = \langle x - x_k, x - x_k \rangle = \langle x - x_k, x \rangle + \langle x - x_k, -x_k \rangle$$

□

סעיף ב'

תהי $(e_k)_{k=1}^\infty$ מערכת אורתונורמלית. נראה כי הסדרה $y_k = \langle e_k, x \rangle e_k$ מתכנסת.

הוכחה:

□

שאלה 3

נוכיח שהבסיס הסטנדרטי הוא מערכת אורתונורמלית שלמה ב- ℓ^2 , כלומר קבוצת הסדרות e_k ששוות ל-1 במקום ה- k ו-0 אם אחרת.
הוכחה:

□

שאלה 4

יהי $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

סעיף א'

נראה כי נורמה שמושרית ממכפלה פנימית מקיימת את חוק המקבילית: לכל $x, y \in H$ מתקיים

$$2(\|x\|^2 + \|y\|^2) = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2$$

הוכחה: נניח כי הנורמה $\|\cdot\|$ מושרית ממכפלה פנימית ונראה כי היא מקיימת את כלל המקבילית.

מתקיים מהגדרה:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle \\ &= 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2\end{aligned}$$

□

סעיף ב'

נוסחאות הפולריזציה

תת-סעיף א'

נניח ש- H מרחב מכפלה פנימית ממשי. נראה שלכל $x, y \in H$ מתקיים

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}$$

הוכחה: מכיוון ש- H מרחב מכפלה פנימית ממשי נובע $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ ולכן מתקיים

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle - (\|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle) = 4\langle x, y \rangle \Rightarrow \langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}$$

□