

תבניות ריבועיות ומספרים p -אדיים

21 ביולי 2026



תוכן עניינים

3	1	מרחבים ריבועיים
3	1.1	תבניות ביליניאריות סימטריות
5	1.2	חפיפת מטריצות
6	1.3	תבניות ריבועיות
10	1.4	מיון מרחבים ריבועיים
14	1.5	איזטרפיות
19	2	מספרים p -אדיים
19	2.1	שדות נורמיים
23	2.2	תזכורת על מרחבים מטריים שלמים והשלמה
25	2.3	שדה המספרים ה- p אדיים
31	3	בחזרה לתבניות ריבועיות

1 מרחבים ריבועיים

1.1 תבניות בילינאריות סימטריות

תבנית בילינארית סימטרית

הגדרה 1.1

יהי $\mathbb{F}$ שדה כך ש- $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ (כלומר $1_{\mathbb{F}} + 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$), ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. פונקציה $g : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ נקראת תבנית בילינארית סימטרית (תב"ס) אם היא מקיימת את האקסיומות הבאות

1. לכל $v, w_1, w_2 \in V$ מתקיים $g(v, w_1 + w_2) = g(v, w_1) + g(v, w_2)$
2. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $g(v, cw) = cg(v, w)$
3. לכל $v, w \in V$ מתקיים $g(v, w) = g(w, v)$

הערה

1. אלא אם צוין אחרת, מעתה והלאה נעבוד עם שדות כך ש- $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$.
2. בהגדרה לעיל מספיק לדרוש לינאריות במשתנה השני בגלל הסימטריות

1.2 טענה

- תהי g תבנית בילינארית סימטרית (תב"ס) מעל מרחב וקטורי V , אזי
1. לכל $v_1, v_2, w \in V$ מתקיים $g(v_1 + v_2, w) = g(v_1, w) + g(v_2, w)$
 2. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $g(cv, w) = cg(v, w)$

הוכחה:

$$g(v_1 + v_2, w) = g(w, v_1 + v_2) \stackrel{\text{סימטריות}}{=} g(w, v_1) + g(w, v_2) \stackrel{\text{לינאריות במשתנה השני}}{=} g(v_1, w) + g(v_2, w)$$

□

ובאופן דומה עבור כפל בסקלר.

דוגמה

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}, (V, \langle \cdot, \cdot \rangle) \text{ מרחב מכפלה פנימית, ו- } g(v, w) = \langle v, w \rangle$$

דוגמה

V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ו- $g(v, w) = 0_{\mathbb{F}}$ $\forall v, w \in V$. זוהי התבנית הבילינארית הסימטרית הטריווילית.

דוגמה

עבור $V = \mathbb{F}^2$ לכל $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^2$ מתקיים

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$$

הערה

ההוכחה שהדוגמה לעיל היא תבנית בילינארית סימטרית היא מקרה פרטי של ההוכחה שנראה עבור הדוגמה הבאה.

דוגמה

$\mathbb{F}$ הוא שדה, $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה סימטרית, $V = \mathbb{F}^n$ ולכל $v, w \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $g(v, w) = v^t A w$. נראה כי g היא תבנית בילינארית סימטרית.

הוכחה: יהיו $u, v, w \in \mathbb{F}^n$ ו- $c \in \mathbb{F}$. מתקיים כי

$$g(u, v + w) = u^t A(v + w) = u^t A v + u^t A w = g(u, v) + g(u, w)$$

$$g(u, cv) = u^t A(cv) = c(u^t A v) = cg(u, v)$$

זה נובע מתכונות בסיסיות של כפל מטריצות, ומקיים את אקסיומות (1) ו-(2). כעת מתקיים כי

$$g(u, v) = u^t A v \stackrel{(*)}{=} (u^t A v)^t = v^t A^t u \stackrel{(**)}{=} v^t A u = g(v, u)$$

□

כאשר $(*)$ זה מכיוון ש- $u^t A v \in \mathbb{F}$ ו- $(u^t A v)^t = u^t A v$ זה מהיות A סימטרית. מה שמקיים את אקסיומה (3).

□

הוכחה של דוגמה 1.3: הדוגמה נובעת מבחירת $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

יהי V מרחב וקטורי ממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . מטריצת גראם (Gram matrix) של g ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ היא

$$[g]_{\mathcal{B}} = (g_{ij})_{i,j}$$

כך ש- $g_{i,j} = g(v_i, v_j)$ לכל $i, j \in [n]$.

$$[g]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix}$$

1.4 טענה

$[g]_{\mathcal{B}}$ היא סימטרית.

הוכחה: לכל $i, j \in [n] : g_{i,j} = g(v_i, v_j) = g(v_j, v_i) = g_{j,i}$.

1.5 טענה

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית, g תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}^n$ המוגדרת על ידי $g(v, w) = v^t A w$, ו- $E = (e_1, \dots, e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. אזי

$$[g]_E = A$$

הוכחה: בסמן

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

נשים לב שמתקיים: $g_{i,j} = e_i^t A e_j = a_{i,j}$.

1.6 טענה

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית ממד סופי מעל $\mathbb{R}$, $g(v, w) = \langle v, w \rangle$, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתונורמלי של V . אזי $[g]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: נזכור שעבור בסיס אורתונורמלי מתקיים

$$\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{אם } i = j \\ 0 & \text{אם } i \neq j \end{cases}, \text{ לכן } g_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{אם } i = j \\ 0 & \text{אם } i \neq j \end{cases}$$

1.7 טענה

יהי V מרחב וקטורי ממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים

הוכחה: בסמן

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \text{ ו- } [w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

כלומר: $v = \sum_{i=1}^n c_i v_i$ ו- $w = \sum_{j=1}^n d_j v_j$. נשים לב כי:

$$g(v, w) = g\left(\sum_{i=1}^n c_i v_i, \sum_{j=1}^n d_j v_j\right) \stackrel{*}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g(v_i, v_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g_{i,j}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מהבילינאריות של g אך מצד שני

$$[v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}} = (c_1 \ \cdots \ c_n) \begin{pmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \stackrel{*}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g_{i,j}$$

כאשר המעבר האחרון זה מהגדרת כפל מטריצות.

לכן $g(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}}$ כנדרש.

מסקנה 1.8

תהי g תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}^n$, אזי $v^t[g]_E w$.

טענה 1.9

יהי V מרחב וקטורי ממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V . אזי $[g]_{\mathcal{B}'} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

הוכחה: נסמן $\mathcal{B}' = (w_1, \dots, w_n)$, אז לכל $i \in [n]$ העמודה ה- i של $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ היא $[w_i]_{\mathcal{B}}$, כלומר $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_i = [w_i]_{\mathcal{B}}$. כעת הכניסה ה- i, j של המטריצה $[g]_{\mathcal{B}'}$ היא

$$g(w_i, w_j) \stackrel{(*)}{=} [w_i]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w_j]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_i)^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j = e_i^t ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j$$

כאשר $(*)$ נובע מטענה 1.7. אך נשים לב ש- $e_i^t ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j$ היא הכניסה ה- i, j של המטריצה $([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

□

1.2 חפיפת מטריצות

1.10 הגדרה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. אנו אומרים ש- B חופפת ל- A כאשר קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $B = P^t A P$.

הערה

תחת ההנחות של טענה 1.9, $[g]_{\mathcal{B}'}$ חופפת ל- $[g]_{\mathcal{B}}$.

מטריצה חופפת

טענה 1.11

חפיפת מטריצות היא יחס שקילות.

הוכחה:

1. רפלקסיביות – לכל A מתקיים ש- $A = I^t A I$, לכן A חופפת ל- A .
2. סימטריה – יהיו A ו- B מטריצות כך ש- B חופפת ל- A . תהי P מטריצה הפיכה כך ש- $B = P^t A P$ ונסמן $Q = P^{-1}$, אזי:

$$Q^t B Q = Q^t P^t A P Q = (P Q)^t A (P Q) = I^t A I = A$$

לכן A חופפת ל- B .

3. טרנזיטיביות (מעבר) – יהיו A, B ו- C מטריצות כך ש- B חופפת ל- A ו- C חופפת ל- B . יהיו P ו- Q מטריצות הפיכות כך ש- $B = P^t A P$ ו- $C = Q^t B Q$. לכן מתקיים:

$$C = Q^t B Q = Q^t P^t A P Q = (P Q)^t A (P Q)$$

ו- PQ היא הפיכה, לכן C חופפת ל- A .

□

טענה 1.12

יהי V מרחב וקטורי ממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V . תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ חופפת ל- $[g]_{\mathcal{B}}$. אזי קיים בסיס $\mathcal{B}'$ של V כך ש- $A = [g]_{\mathcal{B}'}$.

הוכחה: תהי $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^t [g]_{\mathcal{B}} P$. יהי $\mathcal{B}'$ בסיס כך ש- $P = [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$. הבסיס $\mathcal{B}'$ יהיה סדרת הווקטורים כך שווקטור הקואורדינטות ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ של הווקטור ה- i הוא העמודה ה- i של P . סדרה כזו היא אכן בסיס מכיוון ש- P הפיכה. לכן כעת מתקיים:

$$A = P^t [g]_{\mathcal{B}} P = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = [g]_{\mathcal{B}'}$$

□

כנדרש.

מסקנה 1.13

כל מטריצה שחופפת למטריצה סימטרית היא בעצמה סימטרית.

טענה 1.14

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ מממד n ויהי B בסיס של V ותהי g תבנית בילנארית סימטרית על V ותהי $C \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה שחופפת $[g]_B$. אזי קיים בסיס B' של V עבורו $C = [g]_{B'}$.

□

הוכחה: TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1.3 תבניות ריבועיות

תבנית ריבועית

הגדרה 1.15

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם מציין שונה מ-2 ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . תבנית ריבועית שמתאימה ל- g היא $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת על-ידי

$$q(v) = g(v, v)$$

דוגמה

- עבור $F = \mathbb{R}$ ו- $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית, $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי $g(v, w) = \langle v, w \rangle$ אזי $q(v) = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$
- עבור V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, $g(v, w) \equiv 0$ אזי $q(v) \equiv 0$
- עבור $V = \mathbb{F}^2$ ו- $g : \mathbb{F}^2 \times \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת על-ידי

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$$

אזי

$$q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$$

צה לשאול האם אותה תבנית ריבועית יכולה להתקבל משתי תבניות ריבועיות סימטריות שונות? התשובה היא לא.

נוסחת הפלורליזציה

טענה 1.16

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- q תבנית ריבועית המתאימה ל- g . אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים

$$g(v, w) = \frac{q(v+w) - q(v) - q(w)}{2}$$

הוכחה:

$$g(v+w) - g(v) - g(w) = g(v+w, v+w) - g(v, v) - g(w, w) \stackrel{(1)}{=} \cancel{g(v, v)} + g(v, w) + g(w, v) + \cancel{g(w, w)} - \cancel{g(v, v)} - \cancel{g(w, w)} \stackrel{(2)}{=} 2g(v, w)$$

□

כאשר (1) נובע מלינאריות ו-(2) מסימטריה. נחלק ב-2 ונקבל את המבוקש.

מסקנה 1.17

אם תבנית בילנארית סימטרית היא לא תבנית ה-0 אז גם התבנית הריבועית המתאימה לה היא לא תבנית ה-0. כלומר, אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית ששונה מתבנית ה-0 אזי קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) \neq 0$.

ניצבות

הגדרה 1.18

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $v, w \in V$. אומרים כי v ו- w ניצבים ומסמנים $v \perp w$ כאשר $g(v, w) = 0$.

תת-מרחב ניצב

הגדרה 1.19

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $S \subseteq V$. נגדיר

$$S^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in S, v \perp w\}$$

ו- $S^\perp$ הוא תת-מרחב של V .

טענה 1.20

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ויהי $v \in V$ כך ש- $g(v, v) \neq 0$. אזי

- $\dim\{v\}^\perp = n - 1$
- $\{v\}^\perp \oplus \text{Span}(v) = V$

1. נגדיר $T : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $T(w) = g(v, w)$. לינארית כי g לינארית לפי הרכיב השני ומתקיים $\ker T = \{w \in V \mid g(v, w) = 0\} = \{v\}^\perp$ כלומר אנחנו צריכים למצוא את המימד של הגרעין של T .

מההנחה, $T(v) = g(v, v) \neq 0$ ולכן התמונה של T היא לא רק 0 ולכן בפרמט היא מימד אחד, כלומר $\text{Im } T = \mathbb{F}$ ומכאן

$$\dim\{v\}^\perp = \dim \ker T = \dim V - \dim \text{Im } T = n - \dim \mathbb{F} = n - 1$$

2. יהי $w \in \{v\}^\perp \cap \text{Span}(v)$ ולכן קיים $c \in \mathbb{F}$ כך $w = cv$ וכמו-כן מתקיים

$$cg(v, v) = g(v, cv) = g(v, w) = 0$$

מכיוון $g(v, v) \neq 0$ נובע כי $c = 0$ ולכן $w = 0v = 0_V$ ולכן $\{v\}^\perp \cap \text{Span}(v) = 0_V$

$$\dim(\{v\}^\perp + \text{Span}(v)) = \dim\{v\}^\perp + \dim \text{Span}(v) - \dim(\{v\}^\perp \cap \text{Span}(v)) = n - 1 + 1 - 0 = n = \dim V$$

□

בסיס אורתוגונלי

1.21 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . B נקרא אורתוגונלי כאשר $v_i \perp v_j$ לכל $1 \leq i < j \leq n$.

1.22 טענה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז ב- V קיים בסיס אורתוגונלי.

הוכחה: באינדוקציה על המימד של V .

נסמן $\dim V = n$, בבסיס $n = 1$ כל בסיס של V הוא בסיס אורתוגונלי וכעת נניח כי הטענה נכונה עבור כל מרחב וקטורי שמימדו קטן מ- n ויהי V מרחב וקטורי שמימדו n .

אם לכל $v \in V$ מתקיים $g(v, v) = 0$ אזי $g(v, w) = 0$ לכל $v, w \in V$ מנוסחת הפלורליזציה ובפרט נקבל כי כל בסיס של V הוא אורתוגונלי שכן אחרת קיים $v \in V$ כך ש- $g(v, v) \neq 0$ ולפי הטענה הקודמת היה מתקיים שהמימד של $\{v\}^\perp = n - 1$.

מהנחת האינדוקציה ל- $\{v\}^\perp$ קיים בסיס אורתוגונלי $B' = \{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ ומהטענה הקודמת $B' \oplus \{v\} = V$ וגם $v \perp v_i$ לכל $1 \leq i \leq n - 1$ ולכן $B = \{v_1, \dots, v_{n-1}, v\}$ הוא בסיס אורתוגונלי.

□

1.23 טענה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- B בסיס של V . אזי B אורתוגונלי אם ורק אם מטריצת גראם $[g]_B$ אלכסונית.

1.24 מסקנה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס B של V כך ש- $[g]_B$ אלכסונית.

1.25 מסקנה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיים $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

הוכחה: נגדיר $g : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g(x, y) = x^t A y$ ואז $[g]_E = A$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$.

לפי המסקנה הקודמת קיים בסיס B של $\mathbb{F}^n$ כך ש- $[g]_B$ אלכסונית ונגדיר $D = [g]_B$. מאחר ש- $[g]_B$ חופפת ל- $[g]_E$ מתקיים ש- D חופפת ל- A .

□

סוף הרצאה 2 – 14/04

הומומורפיזם הקנוני

1.26 הגדרה

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $\{\mathbb{F}^\times \mid a \in \mathbb{F}^\times\} = (\mathbb{F}^\times)^2$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ את ההומומורפיזם הקאנוני כלומר $\pi : \mathbb{F}^\times \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ כך ש- $\pi(a) = a + (\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$.

1.27 הגדרה

תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\pi|_R : R \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ הוא חד-חד ערכי ועל.

מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

עובדה

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{R}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$

טענה 1.28

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. יתר על-כן, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמובן הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{ -1, 1 \} \subseteq Im(s)$ ולכן $\ker s = \{1, -1\}$ ומכאן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$\left| \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \right| = \left| \mathbb{F}_p^\times / Im(s) \right| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

□

טענה 1.29

יהי V מרחב וקטורי נוצר נוספית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ($\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי). נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $r_i \in R, c_i \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a_i = r_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 1$ ו- $c_i = 0$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = \left(\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n} \right)$ ומטריצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [g]_{\mathcal{C}} = ([Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.30

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

פעולות עמודה אלמנטריות

הגדרה 1.31

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$. נסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

1. אם $\varepsilon = R_i \mapsto cR_i$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$
2. אם $\varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cC_j$
3. אם $\varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j$ (החלפת שורות/עמודות)

עובדה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$.

טענה 1.32

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$ (למה זה מעניין? כי באלגברה לינארית רואים ש- $\varepsilon(I_n)A = \varepsilon(A)$).

הוכחה:

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

תהי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t = A$.

תהי g תבנית בילנארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $[t]_{\mathcal{E}} = A$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי). יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \overline{\varepsilon_k}(\varepsilon_k(\dots(\overline{\varepsilon_1}(\varepsilon_1(A))))$ ו- $P = \overline{\varepsilon_k}(\dots(\overline{\varepsilon_1}(I_n)))$ ו- $[g]_B = D$ ו- $B = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_B = P$.

$$\begin{aligned} \text{הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים } P &= I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t \text{ ולכן} \\ [g]_B &= ([\text{Id}_V]_C^B)^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_C^B = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t \\ &= \varepsilon_k(I_n) \dots \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t = \overline{\varepsilon_k}(\varepsilon_k(\dots(\overline{\varepsilon_1}(\varepsilon_1(A)))) = D \end{aligned}$$

□

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $\mathbb{F}$ $q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הסימטרית המקיימת $q(v) = g_q(v, v)$.

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס B של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $[g_q]_B$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $\{1, -1, 0\}$. מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$ ועם (מטריצת גראם-שמידט) מתקיים גם-כן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו גם מטריצה סימטרית, אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$[g_q]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ואז } B = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \text{ נגדיר}$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 x_2$ מתקיים

$$g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}x_1 y_2 + \frac{1}{2}x_2 y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

סוף הרצאה 3 - 28/04

1.4 מיון מרחבים ריבועיים

1.35 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל השדה $\mathbb{F}$, $g : V \rightarrow \mathbb{F}$ תבנית ריבועית. הזוג (V, q) נקרא מרחב ריבועי ונגדיר כי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. בהינתן (V, q) מרחב ריבועי, נסמן ב- g_q את התבנית הבינארית הסימטרית מעל $\mathbb{F}$ המקיימת $g_q(v, v) = q(v)$.

איזומטריה

1.36 הגדרה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$. העתקה לינארית $f : V \rightarrow V'$ נקראת איזומטריה אם לכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = q'(f(v))$. בפרט, איזומטריה שהיא חד-חד ערכית ועל נקראת איזומורפיזם.

עובדה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ ו- $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. אזי $g_{q'}(f(v), f(w)) = g_q(v, w)$

1.37 טענה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$, $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ העתקה לינארית, חד-חד ערכית ועל, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V ונסמן ב- $\mathcal{B}'$ $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$. אזי f איזומורפיזם אם ורק אם $[g_{q'}]_{\mathcal{B}'} = [g_q]_{\mathcal{B}}$.

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח כי איזומורפיזם ולכן לכל $1 \leq i, j \leq n$ מתקיים

$$g_{q'}(f(v_i), f(v_j)) = g_q(v_i, v_j)$$

ולכן $[g_{q'}]_{\mathcal{B}'} = [g_q]_{\mathcal{B}}$.

$\Leftarrow$ נניח כי $[g_{q'}]_{\mathcal{B}'} = [g_q]_{\mathcal{B}}$ ויהי $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ כלומר

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

מכך ש- f העתקה לינארית

$$f(v) = c_1 f(v_1) + \dots + c_n f(v_n)$$

כלומר $[f(v)]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ ומכאן

$$q'(f(v)) = g_{q'}(f(v), f(v)) = ([f(v)]_{\mathcal{B}'})^t [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} [f(v)]_{\mathcal{B}'} = ([v]_{\mathcal{B}})^t [g_q]_{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}} = g_q(v, v) = q(v)$$

□

כלומר f איזומורפיזם.

1. לכל איזומורפיזם קיים איזומורפיזם הופכי
2. הרכבת איזומורפיזמים היא איזומורפיזם

מרחבים ריבועיים איזומורפיים

הגדרה 1.38

נקרא למרחבים ריבועיים (V, q) ו- (V', q') איזומורפיים אם קיים איזומורפיזם $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ ונסמן $(V, q) \cong (V', q')$.

איזומורפיות הוא יחס שקילות על אוסף המרחבים הריבועיים.

כעת המטרה שלנו היא למיין את המ"ר מעל שדה F עד כדי איזומורפיזם.

טענה 1.39

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ עם $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{B}'$ בסיסים של (V, q) ו- (V', q') בהתאמה. אזי $(V, q) \cong (V', q')$ אם ורק אם $[g_q]_{\mathcal{B}}^{-1} [g_{q'}]_{\mathcal{B}'}$ חופפת.

☐

הוכחה: TOD000000000000000000000000

סכום ישר ניצב

הגדרה 1.40

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו U_1, U_2 תתי-מרחבים של V כך שמתקיים $V = U_1 \oplus U_2$. נאמר כי V הוא סכום ישר ניצב של U_1, U_2 ומסמנים $V = U_1 \oplus^\perp U_2$ אם לכל $u_1 \in U_1$ ו- $u_2 \in U_2$ מתקיים $u_1 \perp u_2$.

מעכשיו נתרכז במרחבים ריבועיים לא מנוונים.

סוף הרצאה 4 – 05/05

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

בפרט, אם (V, q) ו (V', q') מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{C}$ כך ש- $\dim V = \dim V'$ אז $(V, q) \cong (V', q')$.

2. יהי $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ (או $\mathbb{C}$) ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס B של V כך שמתקיים $[g_q]_B = \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

משפט סילבסטר

משפט 1.41

יהיו $0 \leq k < \ell \leq n$ כך $k, \ell \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$
נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$\begin{aligned} q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= x_1^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_n^2 \\ q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= x_1^2 + \cdots + x_\ell^2 - x_{\ell-1}^2 - \cdots - x_n^2 \end{aligned}$$

$$(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2) \text{ in}$$

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$. נסמן ב- $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$ ו- $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ ואת $W = f(V)$. מתקיים ש- $\dim U = \ell$ ומכך ש- f איזומורפיזם $\dim W = \dim V = n - k$. מכאן נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $z \in U \cap W$ ו- $0_V \neq z$.

מאחר ש- $z \in U$ נובע שקיימים $c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R}$ כך שלא כולם אפס ומתקיים

$$z = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_\ell \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$q_2(z) = c_1^2 + \dots + c_\ell^2 - 0^2 + \dots + 0^2 > 0$$

מאחר ש- $z \in W$ נובע שקיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $f(v) = z$ ולכן קיימים $d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס ומתקיים

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

ולכן

$$q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(*)}{=} q_1(v) = 0^2 + \dots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \dots - d_n^2 < 0$$

כאשר $(*)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמובן שהגענו לסתירה.

□

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F}_p^\times \setminus \{0\}$.
יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$.
אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תבנית מייצגת

1.42 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

1.43 תרגיל

יהיו (V, q) , (V', q') מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

משפט 1.44

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$.
נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה.
יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונוכיח כי קיימים $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$.
נסמן

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $f : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x_1^2$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$.
באופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $g : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמובן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$.
יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

הערה

זה כמובן לא נכון ב- $\mathbb{R}$ כשהדוגמה הקלאסית היא מכפלה פנימית למרות שהיא מגדירה מרחב ריבועי לא מנוון.

מסקנה 1.45

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$ אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נסמן $U = \text{Span } \mathcal{C}$, $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$ וגם $\dim U = 2$ אז $[g_{q|U}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ לכן $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0_V\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$ ומתקיים

□

למה 1.46

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $g_q(z, w) = 0$. יהי $v \in V$ מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $v = cu + w$ ומכאן

$$g_q(z, v) = cq_g(z, u) + g_q(z, w) = 0$$

כאשר $z \in V^\perp$ ולכן בגרעין ולכן $g_q(z, u) = 0$ כי $z \in w$ בגרעין ולכן $z = 0_V$ ולא מנוון.

מאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

□

משפט 1.47

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ כבר ראינו בדוגמה 1.42 ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0_V\})$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.

נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_{q|_W}]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$ או

$$[g_{q|_W}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$$

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$. מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V .

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n \text{ או } [g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$$

□

טענה 1.48

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + rx_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ כבטענה הקודמת. אז $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $P = c$ ו- $c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 1.49

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

$$1. \dim V = \dim V'$$

$$2. \det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

אז $(V, q) \cong (V', q')$.

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$.

סוף הרצאה 5 – 12/05

1.5 איזטרופיות

מוטיבציה: נסתכל על התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ הנתונה על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_2^2$ והמרחב הריבועי עם התבנית הזאת הוא לא מנוון (המטריצה המייצגת הפיכה) אבל נניח הוקטור $q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ותופעה כזאת נקראת איזטרופיה והיא מעניינת. יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $v \in V$ נגדיר $g_q^v : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g_q^v(w) = g_q(v, w)$ וברור כי $g_q^v \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$. נגדיר $\hat{g}_q = g_q^v : V \rightarrow \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ על-ידי $\hat{g}_q = g_q^v$.

1.50 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. אז (V, q) לא מנוון אם ורק אם $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית.

הוכחה: (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $g_q^v \equiv 0$ אם ורק אם $g_q^v \equiv 0$ כך ש- $\hat{g}_q(v) = 0$ אם ורק אם $\ker \hat{g}_q \neq \{0_V\}$ אם ורק אם $\hat{g}_q$ אינה חד-חד ערכית. $\square$

1.51 למה

V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . נגדיר $\rho_U : \text{Hom}(V, \mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ על-ידי $\rho_U(\ell) = \ell|_U$ לכל $\ell \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ אז ρ_U העתקה לינארית על.

1.52 תרגיל

הוכיחו את למה 1.51.

1.53 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז

$$\dim V = \dim U + \dim U^\perp$$

הוכחה: נתבונן בהעתקה הלינארית $\rho_U \circ \hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ ויהי $v \in V$ אז $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ ולפיכך $v \in \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ אם ורק אם $\rho_U \circ \hat{g}_q = 0_V$ אם ורק אם $g_q^v|_U = 0$ אם ורק אם $v \in U^\perp$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון נובע ש- $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית ולכן $\hat{g}_q$ היא גם על ומכאן (למה?) ש- $\rho_U \circ \hat{g}_q$ על כלומר $\text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q = \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ לפי משפט המימדים

$$\dim V = \dim \text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \ker \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \text{Hom}(U, \mathbb{F}) = \dim U + \dim U^\perp$$

$\square$

1.54 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U^\perp)^\perp = U$.

הוכחה: יהי $u \in U$. לכל $w \in U^\perp$ מתקיים ש- $u \perp w$ ולכן $u \in (U^\perp)^\perp$ ולפיכך $U \subseteq (U^\perp)^\perp$ וזה נכון בכל מרחב ריבועי. לפי הטענה הקודמת מתקיים

$$\dim (U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

$\square$

1.55 תרגיל

מתי ההכלה השנייה שהוכחנו לעיל לא מתקיימת?

1.56 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U, q|_U)$ לא מנוון אם ורק אם $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון.

הוכחה: $\Leftarrow (U, q|_U)$ מנוון ולכן קיים $v \in U$ כך $0 \neq v \perp u$ לכל $u \in U$ ולכן $v \in U^\perp$.
 מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp w$ לכל $w \in U^\perp$ וזה אומר כי $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון.
 $\Rightarrow$ מכך ש- $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון נובע כי $((U^\perp)^\perp, q|_{(U^\perp)^\perp})$ גם מנוון ולפי הטענה הקודמת אנחנו מקבלים כי $(U, q|_U)$ מנוון.

□

טענה 1.57

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון אז

1. $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון
2. $V = U \oplus U^\perp$

הוכחה:

1. נובע מהטענה הקודמת
 2. יהי $v \in U \cap U^\perp$ ונרצה להראות שהוא וקטור האפס: מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U$ ובגלל ש- $v \in U$ נובע ש- v בגרעין של $(U, q|_U)$ אבל $(U, q|_U)$ הוא לא מנוון ולכן הגרעין שלו הוא וקטור האפס כלומר $v = 0_V$ ולכן $U \cap U^\perp = 0$. לסיום

$$\dim(U + U^\perp) = \underbrace{\dim U + \dim U^\perp}_{\dim V} - \underbrace{\dim(U \cap U^\perp)}_0 = \dim V$$

□

וקטור איזורופי

הגדרה 1.58

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $v \in V$ אז $0_V \neq v$ נקרא איזורופי אם $q(v) = 0$.

מרחב ריבועי איזורופי

הגדרה 1.59

מרחב ריבועי (V, q) נקרא מרחב איזורופי אם קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$ ו- $v \neq 0_V$, כלומר, $0 \in q(V \setminus \{0_V\})$.

מסקנה 1.60

כל מרחב ריבועי מנוון הוא איזורופי.

מישור היפרבולי

הגדרה 1.61

נגדיר תבנית ריבועית $h : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2$. מרחב ריבועי $(\mathbb{F}^2, h)$ נקרא מישור היפרבולי.

טענה 1.62

1. $[g_h]_\mathcal{E} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
2. $\det [g_h]_\mathcal{E} = -\frac{1}{4}$ ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ לא מנוון
3. h תבנית איזורופית ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ איזורופי
4. $h\left(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}\right) = \mathbb{F}$
5. נגדיר $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$ אז $(\mathbb{F}^2, h) \cong (\mathbb{F}^2, q)$

הוכחה:

1. נובע מכך ש- $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2 = \frac{1}{2} x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_2 x_1$
2. הגדרה
3. $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right) = 0$
4. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $c = h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ c \end{smallmatrix}\right)$
5. עם חפיפת מטריצות ישירה

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

טענה 1.63

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזורופי מעל $\mathbb{F}$. אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

הוכחה: מאחר ש- (V, q) איזורופי קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$. נסמן $b = g_q(v, w)$ ונגדיר $w' = \frac{1}{2b} w$ ונקבל $g_q(v, w') = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$q(w' + cv) = g_q(w' + cv, w' + cv) = g_q(w', w') + 2g_q(w', cv) = g(w') + \underbrace{2c g_q(w', v)}_{=\frac{1}{2}} = g(w') + c$$

אז נגדיר $g(u) = 0$ אז $u = w' - q(w')v$ ו- $c = -g(w')$ בנוסף מתקיים

$$g_q(v, u) = g_q(v, w' - cv) = g_q(v, w') = \frac{1}{2}$$

עכשיו $\mathcal{B} = (v, u)$ היא סדרה בלתי-תלויה לינארית (כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, u) = 0$) ונגדיר $U = \text{Span}(U)$ אז $\mathcal{B}$ בסיס של U ומתקיים

$$[g_q|_U] = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & \end{pmatrix}$$

□

ולכן $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$

מסקנה 1.64

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזוטרופי מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$. אז $(V, q) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

מסקנה 1.65

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזוטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = \mathbb{F}$.

משפט 1.66

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$. אז קיים $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ותתי-מרחבים $U_1, \dots, U_m, W$ של V כך שמתקיים

$$V = U_1 \oplus^\perp \dots \oplus^\perp U_m \oplus^\perp W \quad 1.$$

2. לכל $i \leq m$ מתקיים $(U_i, q|_{U_i}) \cong (\mathbb{F}^2, h)$ ו- $(W, q|_W)$ אינו איזוטרופי

□

הוכחה: מתקבלת באינדוקציה על מימד V בשימוש עם הטענה הקודמת ובטענה 1.25

סוף הרצאה 6 – 19/05

מרחב אנאיזוטרופי

הגדרה 1.67

מרחב ריבועי (V, q) שאינו איזוטרופי נקרא אנאיזוטרופי.

הערה

מרחב ריבועי $(\{0_V\}, Q)$ הינו אנאיזוטרופי.

טענה 1.68

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 1$ אז (V, q) אנאיזוטרופי.

הוכחה: כי אם הוא לא מנוון, יש לו בסיס מוקטור אחד שביחס אליו המטריצה היא מטריצה 1×1 שצריכה להיות הפיכה כלומר יש לה ערך אחד שאינו אפס אז כל וקטור הוא סקלר של וקטור הבסיס ששונה מאפס והטענה נובעת.

□

טענה 1.69

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$ ו- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V . אז (V, q) איזוטרופי אם ורק אם $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהמרחב הוא איזוטרופי ולכן קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$.

מאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $q(v, w) \neq 0$ ולכן $\mathcal{C} = (v, w)$ בלתי-תלויים לינארית כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, w) = 0$. בסמן $g_q(v, w) = b$ ו- $g_q(w, w) = q(w) = c$ אז

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

מאחר ש- $[g_q]_{\mathcal{C}}$ ו- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ חופפות קיימת מטריצה P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = P^t [g_q]_{\mathcal{C}} P$$

ולכן

$$-\det [g_q]_B = -\det P^t \det [g_q]_C \det P = -(\det P)^2 \det [g_q]_C = -(\det P^2)(-b^2) = (b \det P)^2 \in (\mathbb{F}^\times)^2$$

$\Rightarrow$ יהי $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, a_2 \in \mathbb{F}^\times$ עבורם

$$[g_q]_C = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

קיימת P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_C = P^t [g_q]_B P$$

מאחר ש- $[g_q]_B \in (\mathbb{F}^\times)^2$ קיים $k \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $\det [g_q]_B = -k^2$. אז

$$a_1 a_2 = \det \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} = \det [g_q]_C = \det P^t \det [g_q]_B \det P = -(k \det P)^2$$

נגדיר $v = k \det P v_1 + a_1 v_2$ מאחר ש- $a_1 \neq 0$ מתקיים $v \neq 0_V$ ולכן

$$\begin{aligned} q(v) &= q(k \det P v_1 + a_1 v_2) \\ &= q(k \det P v_1) + g(a_1 v_2) \\ &= (k \det P)^2 q(v_1) + a_1^2 q(v_2) \\ &= (k \det P)^2 a_1 + a_1^2 a_2 \\ &= a_1 \left(\underbrace{(k \det P)^2}_{=-a_1 a_2} + a_1 a_2 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ מעל המרוכבים כל מספר הוא ריבוע כלשהו. נבחין שאם (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$ עם $\dim V \geq 2$, אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון וגם $\dim U = 2$. לפיכך, כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{C}$ איזומורפי ל- $(\mathbb{C}, q)$ כאשר $q: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ מוגדר על-ידי $g(x) = x^2$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{R}$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \text{כאשר } (\mathbb{R}^n, q_1)$$

$$2. \quad q_{-1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n -x_i^2 \quad \text{כאשר } (\mathbb{R}^n, q_{-1})$$

3. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ כאשר $p \neq 2$ ראשוני
1. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $1 \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(x) = x^2 \quad \text{כאשר } q_1: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדר על-ידי } q_1(x) = x^2$$

$$2. \quad q_{-1}(x) = -x^2 \quad \text{כאשר } q_{-1}: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדר על-ידי } q_{-1}(x) = -x^2$$

$$3. \quad q_{1,1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{כאשר } q_{1,1}: \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדר על-ידי } q_{1,1}(x) = x_1^2 + x_2^2$$

כאשר השניים הראשונים ממימד 1 והאחרון ממימד 2.

2. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$

אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(x) = x^2 \quad \text{כמקודם } (\mathbb{F}_p, q_1)$$

$$2. \quad q_r(x) = rx^2 \quad \text{כאשר } q_r: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדרת על-ידי } q_r(x) = rx^2$$

$$3. \quad q_{1,r} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = x_1^2 + rx_2^2 \quad \text{כאשר } q_{1,r}: \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p \text{ מוגדרת על-ידי } q_{1,r}(x) = x_1^2 + rx_2^2$$

טענה 1.70

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ כך ש- $\dim V \geq 3$ אז (V, q) איזוטרופי.

הוכחה: קיים בסיס אורתוגונלי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ של V כלומר קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_B = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נגדיר תבנית ריבועית $g' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי $g' \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix} \right) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$ ולכן

$$[g_{q'}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

ולכן $(\mathbb{F}_p^2, q')$ לא מנוון ולכן קיים $(x)1, x_2) \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $a_3 = -a_3$.
נגדיר $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + v_3$ וברור ש- $v \neq 0$. בנוסף

$$q(v) = q(x_1 v_1) + q(x_2 v_2) + q(v_3) = x_1^2 q(v_1) + x_2^2 q(v_2) + q(v_3) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 = -a_3 + a_3 = 0$$

□

2 מספרים p -אדיים

2.1 שדות נורמיים

נורמה

2.1 הגדרה

יהי F שדה ממציין כלשהו. פונקציה $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ נקראת נורמה כאשר

1. $\|a\| = 0$ אם ורק אם $a = 0$
2. $\|ab\| = \|a\|\|b\|$ לכל $a, b \in F$
3. $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ לכל $a, b \in F$

תכונות הנורמה

2.2 טענה

- תהי $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+$ נורמה אז
1. $\|1\| = \|-1\| = 1$
 2. $\|a^n\| = \|a\|^n$ לכל $a \in F$
 3. $\|\frac{a}{b}\| = \frac{\|a\|}{\|b\|}$ לכל $a, b \in F$ עם $b \neq 0$
 4. $\|a - b\| \geq \|a\| - \|b\|$
 5. $\|n\| \leq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$

□

הוכחה: כולן נובעות ישירות מהגדרה (תרגיל).

דוגמה

1. $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+$ שדה ו- $\|\cdot\|$ מוגדרת על-ידי $\|0\| = 0, \|a\| = 1$ לכל $a \in F^\times$
2. $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת על-ידי $\|a\| = |a|$ לכל $a \in F$ ו- $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

שדה נורמי

2.3 הגדרה

לזוג $(F, \|\cdot\|)$ כאשר F שדה ו- $\|\cdot\|$ נורמה קוראים שדה נורמי.

מטריקה

2.4 הגדרה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נגדיר $d: F \times F \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $d(a, b) = \|a - b\|$ ו- d היא פונקציית מרחק על F כלומר (F, d) הוא מרחב מטרי.

שדה ארכימדי

2.5 הגדרה

שדה נורמי $(F, \|\cdot\|)$ נקרא ארכימדי כאשר לכל $a \in F$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|a\| > \|n\|$.

2.6 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$.

□

הוכחה: $\Leftarrow$ עבור $a = 1$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$. $\Rightarrow$ יהי $a \in F$ מאחר ש- $\|n\| > 1$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|a\|^N > \|n\|^N$ (לדוגמה $N = \lceil \log_{\|n\|}(\|a\|) \rceil + 1$). אז $\|n\|^N > \|a\|^N = \|n^N\|$.

דוגמה

בהמשך לדוגמה 2.3, הנורמה הראשונה לא ארכימדית בעוד הנורמה השנייה כן ארכימדית.

2.7 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי אם ורק אם לכל $a, b \in F$ מתקיים $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$ (אי-שיויון האולטרה מטרי).

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהוא לא ארכימדי ויהיו $a, b \in F$ ובלי הגבלת הכלליות נניח $\|a\| \geq \|b\|$. מתקיים

$$\begin{aligned} \|a + b\|^n &= \|(a + b)^n\| = \left\| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \left\| \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|a\|^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \|a\|^n = (n+1) \|a\|^n \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ נובע מהיות השדה לא ארכימדי ועם טענה 2.6. מכאן ש- $\|a+b\| \leq \|a\| = \max(\|a\|, \|b\|)$ נסיק כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$ ומאחר ש- $\|a+b\|^n \leq \sqrt[n]{n+1} \|a\|$ ולכן $\|n\| = \left\| \sum_{i=1}^n 1 \right\| \leq \max(\|1\|, \dots, \|1\|) = 1$ מתקיים $n \in \mathbb{N}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ לא ארכימדי.

□

טענה 2.8

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ כך ש- $\|a\| \neq \|b\|$ אז $\|a+b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נניח בשלילה כי $\|b\| < \|a\|$ ונניח בשלילה כי $\|a+b\| < \max(\|a\|, \|b\|) = \|a\|$ ולכן

$$\|a\| > \max(\|a+b\|, \|b\|) = \max(\|a+b\|, \| -b \|) \geq \max(\|a+b\| + (-b)) = \|a\|$$

אִי־שׁוּיוֹן הָאוּלְטְרָה מְטְרִי

וזאת סתירה ולכן $\|a+b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

□

טענה 2.9

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b, c \in \mathbb{F}$ אז בין המספרים $\|a-b\|, \|b-c\|, \|a-c\|$ יש שניים ששוים זה לזה.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נניח $\max(\|a-b\|, \|b-c\|, \|a-c\|) = \|a-c\|$ ונניח בשלילה כי הם כולם שונים זה מזה ומהנחת השלילה נקבל

$$\|a-c\| = \|(a-b) + (b-c)\| \leq \max(\|a-b\|, \|b-c\|) < \|a-c\|$$

אִי־שׁוּיוֹן הָאוּלְטְרָה מְטְרִי

□

וזאת סתירה ולכן מתוכם יש שניים ששוים זה לזה (ובעצם הוא יהיה שווה למקסימום).

סוף הרצאה 7 - 26/05

טענה 2.10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי ונגדיר

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\|\cdot\|} &:= \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| \leq 1\} \\ \mathcal{M}_{\|\cdot\|} &:= \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| < 1\} \\ \mathcal{O} \setminus \mathcal{M} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|} &:= \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| = 1\} \end{aligned}$$

אז

1. $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה
2. $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$
3. $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי יחיד ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$

הוכחה:

1. נוכיח כי $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ סגורה ביחס לחיבור וכפל וכי $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$. יהיו $x, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\|x\|, \|y\| \leq 1$ ומכאן $\|xy\| = \|x\|\|y\| \leq 1$ ואי־שׁוּיוֹן המשולש האולטרה מטרי מניב לנו $\|x+y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) \leq 1$. לכן קיבלנו סגירות לכפל ולחיבור ונשים לב ש- $\|1\| = \|-1\| = 1$ ולכן גם $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.
2. יהי $x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\|x\| \leq 1$ אז

$$x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|} \iff \left\| \frac{1}{x} \right\| \leq 1 \iff \frac{1}{\|x\|} \leq 1 \iff 1 \leq \|x\| \iff \|x\| = 1 \iff x \in \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$$

3. יהיו $x, y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\|, \|y\| < 1$ ולכן מאי־שׁוּיוֹן האולטרה מטרי $\|x+y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) < 1$ ומכאן $x+y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ סגור לחיבור. יהיו $x \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\| < 1, \|y\| \leq 1$. מכאן ש- $\|xy\| = \|x\|\|y\| < 1$ ומכאן $xy \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וזה בידיק אומר ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל. יהי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $I \neq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|} \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$. אז $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|} \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי. נוכיח כי כל אידיאל של $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ מוכל ב- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$: יהי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ונניח בשלילה ש- $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ כלומר קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times$ ולכן $\frac{1}{x} \in I$ ולכן $1 = \frac{1}{x} \cdot x \in I$ וזאת סתירה ולכן $I \subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וקיבלנו ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ הוא אידיאל מקסימלי יחיד.

□

הערה

$\mathcal{U}_{\|\cdot\|}$ זה כל האיברים ההפיכים.

שדה שאריות

הגדרה 2.11

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. השדה $\overline{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|}$ נקרא שדה השאריות של $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$.

יהי p ראשוני, נגדיר $v_p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\}$ על-ידי

$$v_p(a) = \max\{k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\} \mid p^k \mid a\}$$

תכונות ההערכה ה- p -אדית

2.13 טענה

1. $v_p(a) = \infty$ אם ורק אם $a = 0$
2. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ לכל $a, b \in \mathbb{Z}$
3. $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$

הערה

יהיו $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. אז $v_p(a) = s$ אם ורק אם קיים $u \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $a = p^s u$ וגם $p \nmid u$.

הוכחה של טענה 2.13:

1. ישירות מהגדרה
2. אם $a = 0$ או $b = 0$ השוויון ברור. אחרת, נסמן $t = v_p(b)$ ו- $s = v_p(a)$ ולכן קיימים $u, v \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $u = p^s u$ ו- $v = p^t v$ ו- $a = p^s u$ ו- $b = p^t v$. מכאן

$$ab = p^s u \cdot p^t v = p^{s+t} uv$$

3. אבל u וגם v וגם uv אינם מתחלקים ב- p . מכאן $v_p(ab) = s + t = v_p(a) + v_p(b)$.
אחרת, נסמן $t = v_p(b)$, $s = v_p(a)$. אז קיימים $u, v \in \mathbb{Z}$ כך ש- $u = p^s u$, $v = p^t v$ וגם $p \nmid u, p \nmid v$.
בלי הגבלת הכלליות, $v_p(a) \leq v_p(b)$ כלומר $s \leq t$. אז

$$a + b = p^s u + p^t v = p^s (u + p^{t-s} v)$$

מכאן נובע ש- $a + b$ מתחלק ב- p^s ולכן $v_p(a+b) \geq s = \min(s, t) = \min(v_p(a), v_p(b))$.

□

הרחבת ההערכה ה- p -אדית לרציונליים

2.14 הגדרה

נגדיר $\tilde{v}_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ עבור $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ על-ידי

$$\tilde{v}_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$$

הערה

$\tilde{v}_p$ מוגדרת היטב ולא תלוי בהצגה של $q \in \mathbb{Q}$ כשבר: אם $m, m' \in \mathbb{Z}, n, n' \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ אז $m'n = n'm$ ולכן

$$v_p(m') + v_p(n) = v_p(m'n) = v_p(n'm) = v_p(n') + v_p(m)$$

ולכן $v_p(m') - v_p(n') = v_p(m) - v_p(n)$.

תכונות של $\tilde{v}_p$

2.15 טענה

1. $\tilde{v}_p(x) = \infty$ אם ורק אם $x = 0$
2. $\tilde{v}_p(xy) = \tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$
3. $\tilde{v}_p(x+y) \geq \min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$

□

הוכחה: תרגיל.

נורמה p -אדית

2.16 הגדרה

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_{p,\alpha} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|x|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)}$$

2.17 טענה

$(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ הוא שדה נורמי לא ארכימדי.

הוכחה:

$$\begin{aligned} 1. \quad & x = 0 \text{ אם ורק אם } \tilde{v}_p(x) = \infty \text{ וזה קורה אם ורק אם } x = 0 \\ 2. \quad & |xy|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(xy)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)} \alpha^{\tilde{v}_p(y)} = |x|_{p,\alpha} |y|_{p,\alpha} \\ 3. \quad & |x+y|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x+y)} \leq \alpha^{\min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))} = \max(\alpha^{\tilde{v}_p(x)}, \alpha^{\tilde{v}_p(y)}) = \max(|x|_{p,\alpha}, |y|_{p,\alpha}) \end{aligned}$$

□

2.18 הגדרה

$$\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) \geq 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n \right\}$$

בפרט $\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ לא תלוי ב- α ונסמן $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$

2.19 טענה

ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ מתקיים ש- $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{(p)}$

הוכחה:

$\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$: נובע מהגדרה של $\mathbb{Z}_{(p)}$ קבוצה סגורה (כי זה כדור סגור) ו- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ כי כל מספר שלם אפשר לכתוב כמספר רציונלי עם מכנה 1 ולפיכך $\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$.
 $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \overline{\mathbb{Z}}$: יהי $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ כך ש- $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n$.
 יהי $\varepsilon > 0$ ונזכיר כי קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - x|_{p,\alpha} < \varepsilon$.
 קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\alpha^N < \varepsilon$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_\alpha(\varepsilon) \rfloor + 1$).
 מאחר ש- $\gcd(n, p^N) = 1$ נובע שקיימים $s, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $sp^N + tn = 1$. (מאלגוריתם אוקלידס).
 מכאן $mstp^N + mtn = m$ ולכאן $mstp^N = m - mtn$ אבל $p^N \mid mstp^N$ נגדיר $z = mt$ ונראה שהוא מקיים את הנדרש:

$$N \leq v_p(m - mtn) = v_p(m - zn)$$

לכן

$$N \leq \tilde{v}_p(m - zn) - \underbrace{\tilde{v}_p(n)}_{=0} = \tilde{v}_p\left(\frac{m - zn}{n}\right) = \tilde{v}_p(x - z)$$

ומכאן

$$\varepsilon > \alpha^N \geq \alpha^{\tilde{v}_p(x-z)} = |x - z|_{p,\alpha} = |z - x|_{p,\alpha}$$

□

לפיכך $x \in \overline{\mathbb{Z}}$ כלומר $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \overline{\mathbb{Z}}$

2.20 הגדרה

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} < 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) > 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \mid m, p \nmid n \right\}$$

2.21 טענה

$$\begin{aligned} 1. \quad & \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = p\mathbb{Z}_{(p)} \\ 2. \quad & \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}_{(p)} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z} \end{aligned}$$

□

הוכחה: תרגיל.

2.22 טענה

$$\overline{\mathbb{F}}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} / \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{F}_p$$

הוכחה: לכל $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_{p,\alpha} < 1$ כלומר $x - z \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.
 נגדיר $\pi(x) = z + p\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.
 אם $z' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z'|_{p,\alpha} < 1$ אז $x - z' \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ ולכן $x - z' \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ וגם $z' - z \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולכן $z' - z = p\mathbb{Z}$ כלומר $\pi(x)$ לא תלוי בבחירה של z .
 קל לוודא כי π הוא הומומורפיזם של חוגים שהוא על וגם ש- $\ker \pi = p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולפיכך $\mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z} / p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ ממשפטי האיזומורפיזם.

□

סוף הרצאה 8 - 02/06

משפט אוסטרובסקי

2.23 משפט

תהי $\|\cdot\| : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_+$ נורמה לא ארכימדית ולא טריוויאלית. אז קיימים p ראשוני ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ כך ש- $\|\cdot\| = |\cdot|_{p,\alpha}$.

הוכחה: מאחר ש- $\|\cdot\|$ לא ארכימדית, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\|n\| \leq 1$. מאחר ש- $\|\cdot\|$ לא טריוויאלית, קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| < 1$. נגדיר $p := \min\{n \in \mathbb{N} \mid \|n\| < 1\}$ ונראה ש- p ראשוני (ברור שהוא לא 1). נניח בשלילה כי p פריק ולכן קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $p = ab$ ו- $a, b < p$. מאחר ש- $a, b < p$ מתקיים ש- $\|a\| = \|b\| = 1$ ולכן מכפלויות הנורמה $\|ab\| = \|a\|\|b\| = 1$ וזו סתירה לכך ש- $\|p\| < 1$ ולפיכך p ראשוני. יהי $u \in \mathbb{N}$ כך ש- $u \nmid p$ אז קיימים $q \in \mathbb{N} \cup \{0\}, r \in \mathbb{N}$ כך ש- $u = qp + r$ ו- $r < p$. מתקיים ש- $\|r\| = 1$ וכמו כן $\|q\| \leq 1$ ולכן $\|qp\| = \|q\|\|p\| < 1$ ומאחר ש- $\|pq\| \neq \|r\|$ מתקיים ש- $\|qp + r\| = \|u\| = \max(\|qp\|, \|r\|) = \|r\| = 1$. יהי $v \in \mathbb{Z}_-$ (כלומר $v \in \mathbb{Z}, v < 0$) ו- $v \nmid p$ אז $v \in \mathbb{N}$ ו- $v \nmid p$ ולכן $\|v\| = \|-v\| = 1$. נגדיר $\alpha = \|p\|$ ויהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהי $0 \neq q$ אז קיימים $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ כך ש- $q = \frac{m}{n}$. קיימים $s \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}$ כך ש- $p \nmid s, p \nmid t$ ו- $m = p^{v_p(m)}s, n = p^{v_p(n)}t$ אז

$$q = \frac{p^{v_p(m)}s}{p^{v_p(n)}t} = p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \Rightarrow \|q\| = \left\| p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \right\| = \|p\|^{\tilde{v}_p(q)} \frac{\|s\|}{\|t\|} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} \frac{1}{1} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha}$$

□

הערה

1. יהי p ראשוני, $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ וגם $0 < \gamma$. אז לכל $q \in \mathbb{Q}$

$$|q|_{p,\alpha}^\gamma = (\alpha^{\tilde{v}_p(q)})^\gamma = (\alpha^\gamma)^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha^\gamma}$$

2. יהי p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$. אז לכל $q \in \mathbb{Q}$ כאשר $\gamma = \log_\alpha(\beta)$

2.24 טענה

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ ו- $S \subseteq \mathbb{Q}$. אז S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$. אז לכל $x \in S$ קיים $r > 0$ כך שלכל $y \in \mathbb{Q}$ ש- $|y - x|_{p,\beta} < r$ גורר ש- $y \in S$. אז לכל $y \in \mathbb{Q}$ כך ש- $|y - x|_{p,\alpha} < r^{\log_\beta(\alpha)}$ מתקיים

$$|y - x|_{p,\beta} = |y - x|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < (r^{\log_\beta(\alpha)})^{\log_\alpha(\beta)} = r$$

□

לפיכך S פתוח ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ והכיוון ההפוך סימטרי.

2.25 טענה

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת מספרים רציונליים. אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ ויהי $0 < \varepsilon$ ולכן $0 < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$ ולכן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ המקיימים $k, l > N$ מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\alpha} < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$$

מכאן מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\beta} = |a_k - a_l|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < \varepsilon^{(\log_\beta(\alpha))^{\log_\alpha(\beta)}} = \varepsilon$$

□

ולכן $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

סימון

יהי p ראשוני. אז מסמנים $|\cdot|_p = |\cdot|_{p,\frac{1}{p}}$.

2.2 תזכורת על מרחבים מטריים שלמים והשלמה

מרחב מטרי שלם

2.26 הגדרה

מרחב מטרי (M, d) נקרא שלם כאשר כל סדרת קושי בו מתכנסת.

משפט 2.27

יהי (M, d) מרחב מטרי (לאו דווקא שלם). אז קיים מרחב מטרי שלם $(\widehat{M}, \widehat{d})$ כך ש- $M \subseteq \widehat{M}$ ו- $\widehat{d}|_M = d$. נגדיר יחס $\sim$ על $CS(M)$ את הקבוצה של כל סדרות קושי ב- M . נניח $(x_n) \sim (y_n)$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$. אז $\widehat{M}$ היא קבוצת מחלקות השקילות $\widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. לכל $x \in M$ נתאים סדרה (x_n) כאשר $x_n = x$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אז $M \subseteq \widehat{M}$.

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. $(\mathbb{F}, d)$ נקרא שלם כאשר מרחב מטרי $(\mathbb{F}, d)$ שלם עבור $d(x, y) = \|x - y\|$ לכל $x, y \in \mathbb{F}$ ונסמן ב- $(\hat{\mathbb{F}}, \hat{d})$ את ההשלמה של $(\mathbb{F}, d)$. נגדיר $+, \cdot, \|\cdot\|$ על $\hat{\mathbb{F}}$ על-ידי

$$\begin{aligned} [(x_n)] + [(y_n)] &= [(x_n + y_n)] \\ [(x_n)] \cdot [(y_n)] &= [(x_n \cdot y_n)] \\ \|[(x_n)]\| &= \hat{d}([(x_n)], [(0)]) \end{aligned}$$

טענה 2.29

1. $+, \cdot$ ב- $\hat{\mathbb{F}}$ מוגדרים היטב ומקיימים את אקסיומת השדה
2. $\|\cdot\|$ היא נורמה ב- $\hat{\mathbb{F}}$ וגם $(\hat{\mathbb{F}}, \hat{d})$ שדה נורמי שלם
3. $(\hat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ ארכימדי

הוכחה: תרגיל.

□

הערה

ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ היא $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

למה 2.30

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי ב- $\mathbb{F}$ שאינה שואפת ל-0. אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\|a_n\| = \|a_N\|$ (כלומר החל ממקום מסוים היא קבועה).

הוכחה: מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ אינה שואפת ל-0, קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n > m$ כך ש- $\|a_n\| < \varepsilon$. מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי, קיים M כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ עבורם $k, l > M$ מתקיים $\|a_k - a_l\| < \varepsilon$. אז קיים $M < N$ כך ש- $\|a_N\| < \varepsilon$ ואז לכל $N < n$ מתקיים

$$\|a_n\| = \|(a_n - a_N) + a_N\| = \max(\|a_n - a_N\|, \|a_N\|) = \|a_N\|$$

□

טענה 2.31

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. נסמן את חוג השלמים והאידיאל המקסימלי של $(\hat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ב- $\hat{M}_{\|\cdot\|}$ ו- $\hat{O}_{\|\cdot\|}$ בהתאמה. אז

1. $\hat{O}_{\|\cdot\|} = \overline{O_{\|\cdot\|}}$
2. $\hat{M}_{\|\cdot\|} = \overline{M_{\|\cdot\|}}$
3. נסמן ב- $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ את שדה השאריות. אז $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}} \cong \overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$
4. $\{\|a\| \mid a \in \hat{\mathbb{F}}\} = \{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\}$

הוכחה:

1. מאחר ש- $O_{\|\cdot\|} \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$ וגם $\hat{O}_{\|\cdot\|}$ סגור מתקיים ש- $\overline{O_{\|\cdot\|}} \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$. בכיוון השני, יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$, $a \neq 0$. אז קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$. לפי הלמה, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a_N\| = \|a\|$ אבל $\|a\| < 1$ ומכאן $a_n \in O_{\|\cdot\|}$ ולכן $a \in \overline{O_{\|\cdot\|}}$. כגבול של סדרה.

2. זהה

3. נגדיר $\bar{\varphi} : \bar{\mathbb{F}} \rightarrow \bar{\mathbb{F}}$ על-ידי $\bar{\varphi}(a + M_{\|\cdot\|}) = a + \hat{M}_{\|\cdot\|}$. לכל $a \in O_{\|\cdot\|}$.

קל לראות שזה מוגדר היטב וזה הומומורפיזם של חוגים. מאחר ש- $\bar{\mathbb{F}}$ שדה אז $\ker \varphi = \{0\}$ ולכן φ חד-חד ערכית.

לא טריוויאלי שהוא על (מה עם ההרחבה גדולה יותר?). יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq O_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\|a_n - a\| < 1$ כלומר $a_n - a \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$. מכאן ש- $a + \hat{M}_{\|\cdot\|} = a_n + \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\varphi(a_n) = a_n + \hat{M}_{\|\cdot\|} = a + \hat{M}_{\|\cdot\|} = \varphi(a)$ ולכן φ על ו- φ איזומורפיזם.

סוף הרצאה 9 - 09/06

4. ברור כי $\{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}\} \supseteq \{\|x\| \mid x \in \hat{\mathbb{F}}\}$. בכיוון השני, יהי $a \in \hat{\mathbb{F}}$, $a \neq 0$. אז קיימת סדרה (a_n) של איברים מ- $\mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. מהלמה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a_N\|$ ומאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$ לכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ולכן $\|a\| \in \{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}\}$.

□

2.3 שדה המספרים ה־p־אדיים

סימון

נסמן את ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ ב־ $\mathbb{Q}_p$ ונקרא לו שדה המספרים ה־p־אדיים. בנוסף, נסמן

$$\mathbb{Z}_p := \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\}$$

2.32 טענה

1. $\mathbb{Z}_p = \overline{\mathbb{Z}_{(p)}} = \overline{\mathbb{Z}}$.
2. האידיאל המקסימלי ב־ $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $p\mathbb{Z}_p$ ו־ $\overline{p\mathbb{Z}_{(p)}} = p\mathbb{Z}_p$.
3. שדה השאריות של $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $\mathbb{F}_p$ ו־ $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{F}_p$.
4. $\{|x|_p \mid x \in \mathbb{Q}_p\} = \{|x|_p \mid x \in \mathbb{Q}\} = \{\frac{1}{p^s} \mid s \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}\}$.

הוכחה: אנלוגי לטענה הקודמת.

2.33 למה

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי שלם ותהיי (a_n) סדרה ב־ $\mathbb{F}$ ששואפת ל־0. אזי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| < \varepsilon$. מכאן, לכל $m < n$ מתקיים כי

$$\|b_n - b_m\| = \left\| \sum_{i=m+1}^n a_i \right\| \leq \max_{m+1 \leq i \leq n} \|a_i\| < \varepsilon$$

לכן (b_n) היא סדרת קושי ומאחר ש־ $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שלם היא מתכנסת.

סימון

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

מעתה והלאה הנורמה המדוברת היא הנורמה ה־p־אדית אלא אם נאמר אחרת (לפעמים נרשם $\|\cdot\|$ או $|\cdot|$ אבל הכוונה לנורמה ה־p־אדית).

2.34 טענה

תהיי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ב־ $\mathbb{Z}$ כך ש־ $0 \leq a_n \leq p-1$ עבור $n \in \mathbb{N}_0$.
ב־ $\mathbb{Q}_p$ קיים הגבול $\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n = a$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ ויתר על־כן, $a \in p\mathbb{Z}_p \iff a_0 = 0$.

הוכחה: מאחר ש־ $\|a_n\| \in \{0, 1\}$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $\|a_n p^n\| \in \{0, \frac{1}{p^n}\}$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n p^n = 0$ ומהלמה הקודמת הסכום $\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n$ מתכנס ל־ a .
מאחר ש־ $|\sum_{i=1}^n a_i p^i|_p < 1$ (מלמה 2.30) מתקיים $|\sum_{i=1}^{\infty} a_i p^i|_p < 1$ ולכן אם $a_0 = 0$ אז $|a|_p = |\sum_{i=1}^{\infty} a_i p^i|_p < 1$.
אם $a_0 \neq 0$ אז $|a_0|_p = 1$ ולכן $|a|_p = \max(|a_0|_p, |\sum_{i=1}^{\infty} a_i p^i|_p) = 1$.

2.35 טענה

תהיינה $(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרות ב־ $\mathbb{Z}$ כך ש־ $0 \leq a_n, b_n \leq p-1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i = \sum_{i=0}^{\infty} b_i p^i$ אז $a_n = b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים $n \in \mathbb{N}_0$ כך ש־ $a_n \neq b_n$ ולכן נגדיר $m = \min\{n \in \mathbb{N}_0 \mid a_n \neq b_n\}$.
אזי $\sum_{i=0}^{m-1} a_i p^i = \sum_{i=0}^{m-1} b_i p^i$ ולכן גם $\sum_{i=m}^{\infty} a_i p^i = \sum_{i=m}^{\infty} b_i p^i$ (זנב) ומכאן

$$a_m + \sum_{i=m+1}^{\infty} a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^{\infty} a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^{\infty} b_i p^{i-m} = b_m + \sum_{i=m+1}^{\infty} b_i p^{i-m}$$

לכן

$$a_m - b_m = \sum_{i=m+1}^{\infty} b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^{\infty} a_i p^{i-m}$$

כמו בהוכחה הקודמת,

$$\left| \sum_{i=m+1}^{\infty} b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^{\infty} a_i p^{i-m} \right|_p < 1$$

אבל $a_m \neq b_m$ ולכן $|a_m - b_m|_p = 1$ וזאת סתירה.

טענה 2.36

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ ולכל $k \in \mathbb{N}_0$ קיים $r \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r|_p \leq \frac{1}{p^k}$.

הוכחה: מאחר ש- $\bar{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_p$ נובע שקיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_p \leq \frac{1}{p^k}$. נחלק את z ב- p^k עם שארית ונקבל $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $z = qp^k + r$ ו- $0 \leq r \leq p^k - 1$ ומתקיים

$$|x - r|_p = |(x - z) + (z - r)|_p = |x - z + qp^k|_p \leq \max(|x - z|_p, |qp^k|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

נשאר להראות יחידות - יהיו $0 \leq r_1, r_2 \leq p - 1$ כך ש- $|x - r_1|_p, |x - r_2|_p \leq \frac{1}{p^k}$ מכאן

$$|r_1 - r_2|_p = |(x - r_1) - (x - r_2)|_p \leq \max(|x - r_1|_p, |x - r_2|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

מאחר ש- $|r_1 - r_2| \leq p^k - 1$ אנו מסיקים ש- $r_2 - r_1 = 0$.

□

מסקנה 2.37

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה יחידה $(r_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך שמתקיים

$$0 \leq r_k \leq p^k - 1 \quad 1.$$

$$|x - r_k|_p \leq \frac{1}{p^k} \quad 2.$$

$$p^k \mid r_{k+1} - r_k \quad 3.$$

הוכחה: נשים לב ש-1 ו-2 נובעים מהטענה הקודמת. עבור 3,

$$|r_{k+1} - r_k|_p = |(x - r_k) - (x - r_{k+1})|_p \leq \max(|x - r_k|_p, |x - r_{k+1}|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

□

טענה 2.38

יהי $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p - 1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = x$

הוכחה: נגדיר

$$a_0 = r_1, \quad a_1 = \frac{r_2 - r_1}{p}, \quad a_2 = \frac{r_3 - r_2}{p^2}, \quad a_i = \frac{r_{i+1} - r_i}{p^i}$$

מהמסקנה $a_i \in \mathbb{Z}$ ומאחר ש- $0 \leq r_{i+1} \leq p^{i+1} - 1$ ו- $0 \leq r_i \leq p^i - 1$ מתקיים $0 \leq r_{i+1} - r_i \leq p^{i+1} - 1$. מאחר ש- $r_{i+1} - r_i \equiv 0 \pmod{p^i}$ מתקיים $p^i \mid r_{i+1} - r_i$ ולכן $0 \leq a_i \leq p - 1$ ולסיום

$$r_n = r_{n-1} + a_{n-1}p^{n-1} = r_{n-2} + a_{n-2}p^{n-2} + a_{n-1}p^{n-1} = \dots = \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = \lim_{n \rightarrow \infty} r_{n+1} = x$

□

טענה 2.39

לכל $x \in \mathbb{Q}_p^\times$ קיים $s \in \mathbb{Z}$ וסדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p - 1$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ עם $n \geq s$ ובנוסף $a_s \neq 0$ ו- $\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = x$.

הוכחה: קיים $s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x|_p = \frac{1}{p^s}$ ולכן נגדיר $x' = \frac{x}{p^s}$ ואז $|x'|_p = \frac{|x|_p}{|\frac{1}{p^s}|_p} = 1$ ולכן קיימת סדרה $(a'_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a'_n \leq p - 1$ וגם $\sum_{n=0}^\infty a'_n p^n = x'$ ומאחר

ש- $|x'| = 1$ מתקיים $a'_0 \neq 0$ ולכן נגדיר $a_n = a'_{n-s}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ו- $s \leq n$ ונקבל $x' p^s = x$ ו- $\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = \sum_{n=0}^\infty a'_n p^n p^s = x' p^s = x$.

סוף הרצאה 10 - 16/06

סימן

1. אם $(a_i)_{i=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כאשר $0 \leq a_i \leq p - 1$ רשמים $\sum_{i=0}^\infty a_i p^i = (...a_2 a_1 a_0)_p$
2. אם $s \in \mathbb{Z}$ ו- $(a_i)_{i=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ עם $0 \leq a_i \leq p - 1$ ו- $a_s \neq 0$ רשמים $\sum_{i=s}^\infty a_i p^i = (...a_1 a_0 \cdot a_{-1} \dots a_{s+1} a_s)_p$

מסקנה 2.40

$$\overline{\mathbb{N}_0} = \mathbb{Z}_p$$

$$-1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (p^n - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (p-1)(1 + p + 1 + \dots + p^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} (p-1)p^i = \sum_{i=0}^{\infty} (p-1)p^i$$

כלומר $(\dots(p-1)(p-1)) = -1$

2.41 טענה

יהיו $(a_i)_{i=s}^{\infty} \subseteq \mathbb{Z}$ ו- $d \in \mathbb{N}$, $s, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ לכל $0 \leq s \leq n$, $n \in \mathbb{Z}$ עם $a_s \neq 0$ וכל $t \leq i$ מתקיים $a_{i+d} = a_i$. אזי $\sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i \in \mathbb{Q}$.

הערה

s המיקום של הספרה הראשונה, d אורך המחזור ו- t כמה ספרות יש עד שזה הופך להיות למחזורי (המיקום של ההתחלה של המחזור הראשון).

הוכחה: נסמן

$$x = \sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i, \quad r = \sum_{i=s}^{t-1} a_i p^i, \quad q = \sum_{s=t}^{t+d-1} a_i p^i$$

אז

$$x - r - q = \sum_{i=t+d}^{\infty} a_i p^i \stackrel{a_{i+d}=a_i}{=} p^d \sum_{i=t+d}^{\infty} a_{i-d} p^{i-d} = p^d \sum_{j=t}^{\infty} a_j p^j = p^d (x - r)$$

□

$$x = r + \frac{q}{1-p^d} \in \mathbb{Q} \text{ ולכן } (x-r)(1-p^d) = q$$

2.42 טענה

יהיו $(a_i)_{i=s}^{\infty} \subseteq S$, $s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ לכל $0 \leq i \leq s$, $a_s \neq 0$ וגם $\sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i \in \mathbb{Q}$. אז קיימים $t \in \mathbb{Z}$ ו- $s \leq t$ כך ש- $a_{i+d} = a_i$ לכל $t \leq i$.

הוכחה: קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p \nmid m$, $p \nmid n$ וגם $\sum_{i=s}^{\infty} a_i p^i = p^s \frac{m}{n}$ כאשר כמובן $n \neq 0$. לכל $i \in \mathbb{N}_0$ נגדיר $c_i = a_{i+s}$ ואז

$$\frac{m}{n} = \sum_{i=s}^{\infty} a_i p^{i-s} = \sum_{j=0}^{\infty} a_{j+s} p^j = \sum_{j=0}^{\infty} c_j p^j$$

$$m = n \sum_{j=0}^{\infty} c_j p^j$$

לכל $k \in \mathbb{N}$

$$r_k := \frac{n \sum_{j=k}^{\infty} c_j p^j}{p^k} = \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} c_j p^j}{p^k}$$

אז $r_k \in \mathbb{Q}$, $|r_k|_p \leq 1$ וגם $r_k \in \mathbb{Z}$. יתר על-כן מתקיים

$$\frac{m+n}{p^k} - n = \frac{m - n(p^k - 1)}{p^k} \leq \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} (p-1)p^j}{p^k} = \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} c_j p^j}{p^k} \leq \frac{m}{p^k}$$

קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k \leq N$ מתקיים ש- $\left| \frac{m}{p^k} \right| < 1$ וגם $\left| \frac{m+n}{p^k} \right| < 1$ ולכן עבור $N \leq k$ מתקיים $-n-1 < r_k < 1$ ולכן קיימים $N \leq k < l$ כך ש- $r_k = r_l$. מאחר שמתקיים כי $r_k \equiv nc_k \pmod{p}$ ו- $r_l \equiv nc_l \pmod{p}$ ומכאן $nc_k \equiv nc_l \pmod{p}$ אבל מכך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ נובע כי $c_k = c_l$. בנוסף, מתקיים ש-

$$r_{k+1} = \frac{r_k - nc_k}{p} = \frac{r_l - nc_l}{p} = r_{l+1}$$

אז לכל $i \in \mathbb{N}_0$ מתקיים כי $c_{k+1} = c_{l+1}$, נגדיר $t = k + s$, $d = l - k$ ואז לכל $t \leq i$ מתקיים $0 \leq i - k - s$ ולכן

$$a_{i+d} = c_{i+d-s} = c_{l+(i-k-s)} = c_{k+i-k-s} = c_{i-s} = a_i$$

□

נמצא הצגה 5-אדית של $\frac{1}{3}$ ולכן נסמן $\frac{1}{3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ כאן $\frac{1}{3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ כאשר $0 \leq a_i = c_i \leq p-1 = 4$ ו- $r_0 = m = 1, n = 3, m = 1, s = 0$.
 מתקיים $1 \equiv 3a_0 \pmod{5}$ ולכן $a_0 = 2$ או $-1 \equiv \frac{-5}{5} = \frac{1-3 \cdot 2}{5} = \frac{r_0 - na_0}{p} = \frac{r_1}{p}$.
 כעת ניתן לחשב גם $3 \cdot a_1 \equiv -1 \pmod{5}$ ולכן $a_1 = 3$ ואז באופן דומה $-2 \equiv \frac{-10}{5} = \frac{-1-3 \cdot 3}{5} = \frac{r_1 - na_1}{p} = \frac{r_2}{p}$.
 ניקח $3 \cdot a_2 \equiv -2 \pmod{5}$ ולכן $a_2 = 1$ ושוב $-1 \equiv \frac{-5}{5} = \frac{-2-3 \cdot 1}{5} = \frac{r_2 - na_2}{p} = \frac{r_3}{p}$.
 מתקיים ש- $r_3 = r_1$ ובעצם התחלנו את המחזור ולכן לכל $1 \leq i$ מתקיים $a_{i+2} = a_i$ ולסיכום $(\dots 13132)_5 = \frac{1}{3}$.

טענה 2.43

כל אידיאל ב- $\mathbb{Z}_p$ הוא מהצורה $p^n \mathbb{Z}_p$ עבור $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה: יהי I אידיאל ב- $\mathbb{Z}_p$ ולכן מתקיים $I \subseteq p\mathbb{Z}_p$ ו- $\{x|_p \mid x \in p\mathbb{Z}_p\} = \{\frac{1}{p^i} \mid i \in \mathbb{N}\}$.
 לכן קיים $h = \max\{|x|_p \mid x \in I\}$ וגם קיים $a \in I$ כך ש- $|a|_p = h$. בנוסף, קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $h = \frac{1}{p^n}$. נוכיח כי $I = p^n \mathbb{Z}_p$.
 מתקיים כי $|p^n|_p = h$ ומכאן $\frac{p^n}{a} \in \mathbb{Z}_p$ ולכן $\frac{p^n}{a} \in p^n \mathbb{Z}_p \subseteq I$ לפיכך $p^n \in a\mathbb{Z}_p \subseteq I$.
 להכלה השנייה, יהי $b \in I$ ואז $|b|_p \leq |a|_p = h$ ומכאן $|\frac{b}{p^n}|_p \leq 1$ ולכן $\frac{b}{p^n} \in \mathbb{Z}_p$ ובמקודם $b \in p^n \mathbb{Z}_p$ ולפיכך $I \subseteq p^n \mathbb{Z}_p$. $\square$

מסקנה 2.44

$\mathbb{Z}_p$ הוא חוג ראשי (תחום שלמות שכל אידיאל שלו הוא ראשי).

סימון

- עבור $a, b \in \mathbb{Z}_p$ נרשום $a \equiv b \pmod{p^n}$ כאשר $a - b \in p^n \mathbb{Z}$.
- לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ נסמן $\bar{a} = a + p\mathbb{Z}_p \in \mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p$ (הרדוקציה).

הלמה של הנזל

למה 2.45

יהיו $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ ו- $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{f'(w_0)} \neq 0$ וגם $\overline{f'(w_0)} \neq 0$. אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ יחיד כך ש- $\overline{w} = \overline{w_0}$ וגם $f(w) = 0$.

הערה

עבור $f = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0$ הנגזרת היא $f' = nc_n x^{n-1} + \dots + c_1$.

דוגמה

עבור $p \neq 2$ ראשוני, נבחר $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{a} \neq 0$ (לא מתחלק ב- p) ונגדיר $f = x^2 - a$.
 מתקיים $d' = 2x$ ומהלמה של הנזל נובע כי אם קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w_0^2 \equiv a \pmod{p}$ אז מאחר ש- $0 \not\equiv a \pmod{p}$ מתקיים $0 \not\equiv 2w_0 \pmod{p}$ ולכן קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ כלומר קיים שורש!

הערה

כאשר $p = 2$ הדוגמה לעיל לא נכונה כי עבור $a = 3$ נסתכל על הפולינום $f = x^2 - 3 = x^2 - 1$ ועבור $w_0 = 1$ מתקיים ש- $1^2 \equiv 1 \pmod{2}$ אבל ב- $\mathbb{Z}_2$ אין שום מספר שהריבוע שלו ייתן לנו שלוש בידיוק כי זה או אפס או אחד.

סוף הרצאה 11 - 23/06

הוכחה של למה 2.45: נבנה סדרה $(r_k)_{k=1}^{\infty}$ כך ש- $r_k \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r_k \leq p^k - 1$, $r_{k+1} - r_k \equiv \bar{r}_k \pmod{p}$ ו- $\overline{r_1} = \bar{w}_0$. נגדיר $r_1 \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r_1 \leq p - 1$ ונגדיר $r_1, \dots, r_k$ כבר הוגדרו ומקיימים את התנאים הנדרשים.
 נגדיר $r_{k+1} = r_k + dp^k$ כאשר $0 \leq d \leq p - 1$ נבחר כי קיים $0 \leq d \leq p - 1$ יחיד כך ש- $f(r_{k+1}) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$.
 נסמן $f = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n$ ואז לכל $d \in \mathbb{Z}$, $0 \leq d \leq p - 1$ מתקיים

$$\begin{aligned} f(r_{k+1}) &= f(r_k + dp^k) = c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k + dp^k)^2 + \dots + c_n(r_k + dp^k)^n \\ &= c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k^2 + 2r_k dp^k + d^2 p^{2k}) + \dots + c_n \left(r_k^n + nr_k^{n-1} dp^k + \binom{n}{2} r_k^{n-2} d^2 p^{2k} \right) + \dots + \binom{n}{n} d^n p^{nk} \\ &\equiv_{\text{mod } p^{k+1}} c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k^2 + 2r_k dp^k) + c_3(r_k^3 + 3r_k^2 dp^k) + \dots + c_n(r_k^n + nr_k^{n-1} dp^k) \\ &= (c_0 + c_1 r_k + c_2 r_k^2 + c_3 r_k^3 + \dots + c_n r_k^n) + (c_1 + 2c_2 r_k + 3c_3 r_k^2 + \dots + nc_n r_k^{n-1}) dp^k \\ &= f(r_k) + f'(r_k) dp^k \pmod{p^{k+1}} \end{aligned}$$

מאחר ש- $f(r_k) \in p^k \mathbb{Z}_p$, קיים $z \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $f(r_k) = zp^k$.
מאחר ש- $f'(r_k) = f'(w_0) \neq 0$, קיים יחיד $d \in \mathbb{Z}$ עבורו $0 \leq d \leq p-1$ כך ש- $f'(r_k)d \equiv -z \pmod{p}$ ואז $f'(r_k)d + z \equiv 0 \pmod{p}$.
מכאן

$$f(r_k) = f(r_k) + f'(r_k)dp^k = (z + f'(r_k)d)p^k \in p^{k+1}\mathbb{Z}$$

בנוסף $p^k \mid dp^k = r_{k+1} - r_k$ וגם $0 \leq r_{k+1} \leq p^k - 1 + (p-1)p^k = p^{k+1} - 1$.
לפיכך $r_1, \dots, r_{k+1}$ מקיימים את כל התנאים הנדרשים ולכן הסדרה $(r_k)_{k=1}^\infty$ היא סדרת קושי ולכן קיים $w = \lim_{k \rightarrow \infty} r_k$.
יתר על-כן, מתקיים

$$f(w) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} r_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(r_k) = 0$$

□

מסקנה 2.46

אם $p \neq 2$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{a} \neq 0$ ו- $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{w}_0 = \bar{a}$ אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ וגם $\bar{w} = \bar{w}_0$.

הוכחה: נגדיר $f = x^2 - a$ ואז מכך ש- $\bar{w}_0^2 = \bar{a}$ נקבל

$$\begin{aligned} \overline{f(w_0)} &= \bar{w}_0^2 - \bar{a} = 0 \\ \overline{f'(w_0)} &= 2\bar{w}_0 = 2\bar{w}_0 \neq 0 \end{aligned}$$

□

לכן קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $f(w) = 0$ כלומר $w^2 = a$.

הערה

1. התנאי $p \neq 2$ הכרחי. דוגמה נגדית קלאסית היא $\mathbb{Z}_2$ ו- $a = 3$.
2. התנאי $\bar{a} \neq 0$ הכרחי. דוגמה נגדית קלאסית היא $\mathbb{Z}_p$ ו- $a = p$.

מסקנה 2.47

אם $p \neq 2$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{a} = 1$ אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ וגם $\bar{w} = 1$.

טענה 2.48

יהי $p \neq 2$ ראשוני. אז

$$\mathbb{Z}_p^\times / (\mathbb{Z}_p^\times)^2 \cong \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

הוכחה: נגדיר $pr : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{F}_p$ על-ידי $pr(a) = a + p\mathbb{Z}_p$.
אז pr הוא הומומורפיזם של חוגים ולכן $pr|_{\mathbb{Z}_p^\times} : \mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ הוא הומומורפיזם של חבורות שהוא על.
נסמן $\pi : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$ על-ידי $\pi(x) = x \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולכן גם π הוא הומומורפיזם של חבורות שהוא על.
נרכיב ונקבל $\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times} : \mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
אם $x \in (\mathbb{Z}_p^\times)^2$ אזי $pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}(x) \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולכן $\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}(x) = 1$ ולכן $\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}(\ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times})) \subseteq \ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times})$.
יהי $a \in \ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times})$ אז $a \in \ker(\pi) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולכן $a \in (\mathbb{Z}_p^\times)^2$.
לפיכך $\ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}) \subseteq (\mathbb{Z}_p^\times)^2$.
אז לפי משפט ההומומורפיזם מתקיים $\mathbb{Z}_p^\times / (\mathbb{Z}_p^\times)^2 \cong \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

□

טענה 2.49

יהי p ראשוני. אזי $\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z}_p^\times \times \mathbb{Z}$.

הוכחה: נגדיר $f : \mathbb{Z}_p^\times \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}_p^\times$ על-ידי $f(u, s) = up^s$.
קל לראות ש- f הומומורפיזם, חד-חד ערכית ועל כלומר איזומורפיזם.

□

מסקנה 2.50

יהי $p \neq 2$ ראשוני. אז $\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ או $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
בנוסף, אם $r \in \mathbb{Z}_p^\times$ כך ש- $\bar{r} \in \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אז

$$\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2 = \left\{ (\mathbb{Q}_p^\times)^2, r(\mathbb{Q}_p^\times)^2, p(\mathbb{Q}_p^\times)^2, rp(\mathbb{Q}_p^\times)^2 \right\}$$

$$\mathbb{Q}_2^\times/(\mathbb{Q}_2^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$(\mathbb{Q}_2^\times)/(\mathbb{Q}_2^\times)^2 = \{(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -(\mathbb{Q}_2^\times)^2, 2(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -2(\mathbb{Q}_2^\times)^2, 5(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -5(\mathbb{Q}_2^\times)^2, 10(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -10(\mathbb{Q}_2^\times)^2\}$$

3 בחזרה לתבניות ריבועיות

טענה 3.1

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{Q}_p$ עבור $p \neq 2$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

כאשר $1 \leq i \leq n$ לכל $a_i \in \{1, r, p, pr\}$.