

# משוואות דיפרנציאליות

1 באוגוסט 2026



## תוכן עניינים

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 1   | משוואות דיפרנציאליות רגילות             | 3  |
| 1.1 | הגדרות בסיסיות                          | 3  |
| 1.2 | קיום ויחידות                            | 3  |
| 1.3 | תלות בתנאי ההתחלה                       | 7  |
| 1.4 | משוואות לינאריות עם מקדמים קבועים       | 11 |
| 1.5 | משוואות לינאריות לא הומוגניות           | 15 |
| 1.6 | התנהגות לוקלית, התנהגות גלובלית ויציבות | 16 |
| 2   | מערכות שטורם-ליוביל                     | 22 |
| 2.1 | מוטיבציה קצרה                           | 22 |
| 2.2 | משוואות עם תנאי שפה                     | 22 |
| 2.3 | ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות           | 25 |
| 3   | משוואות דיפרנציאליות חלקיות             | 29 |
| 3.1 | משוואת לפלס                             | 29 |
| 3.2 | בעיית דיריכלה                           | 33 |
| 3.3 | שיטת Perron לפתרון בעיית דיריכלה        | 33 |
| 3.4 | תנאי שפה                                | 36 |

# 1 משוואות דיפרנציאליות רגילות

## 1.1 הגדרות בסיסיות

משוואה דיפרנציאלית רגילה מסדר  $n$

### 1.1 הגדרה

משוואה דיפרנציאלית רגילה מסדר  $n$  היא משוואה מהצורה

$$F(x(t), x'(t), \dots, x^{(n)}(t), t) = 0$$

כאשר  $t$  משתנה זמן חופשי היכן ש- $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  כאשר  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$  קבוצה פתוחה. פיתרון של המשוואה בקטע  $I \subseteq \mathbb{R}$  הוא פונקציה  $x: I \rightarrow \mathbb{R}$  אשר גזירה  $n$  פעמים כך ש- $x$  מקיים את המשוואה לכל  $t \in I$ . באופן דומה, מערכת של  $m$  משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר  $n$  היא מערכת משוואות מהצורה

$$F(x(t), x'(t), \dots, x^{(n)}(t), t) = 0$$

עבור  $F: \Omega \subseteq \mathbb{R}^{(n+1)m+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$  ופיתרון שלה בקטע  $I \subseteq \mathbb{R}$  הוא פונקציה גזירה  $n$  פעמים  $x: I \rightarrow \mathbb{R}^m$  שפותרת את המשוואה בכל  $t \in I$ .

מערכת/משוואה אוטונומית

### 1.2 הגדרה

נאמר שהמערכת / משוואה היא אוטונומית אם  $F$  אינה תלויה ב- $t$ .

מערכת משוואות לינארית

### 1.3 הגדרה

נאמר שמשוואה דיפרנציאלית היא לינארית אם יש פונקציות  $c_0, c_1, \dots, c_n, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  כך שמתקיים

$$F(x(t), x'(t), \dots, x^{(n)}(t), t) = c_0(t)x(t) + c_1(t)x'(t) + \dots + c_n(t)x^{(n)}(t) + f(t)$$

אם כל ה- $c_i$  ימים לא תלויים ב- $t$  נאמר שהמשוואה במקדמים קבועים ואם  $f(t) = 0$  נאמר שהמשוואה הומוגנית.

הערה

נשים לב שבמשוואה דיפרנציאלית לינארית הומוגנית כל צירוף לינארי של פתרונות הוא פתרון. שכן, אם למשל  $x_1, \dots, x_m$  פתרונות למשוואה לינארית הומוגנית ו- $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  סקלרים, אזי

$$g(t) = \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i(t)$$

הוא צירוף לינארי של פתרונות.

נציב את הפונקציה במשוואה כדי לקבל את הביטוי  $\sum_{j=0}^n c_j(t)(g^{(j)}(t))$  ונרצה להראות שתוצאתו היא 0: ואכן, מתוך לינאריות הנגזרת והחלפת סדר הסכימה נקבל

$$\sum_{j=0}^n c_j(t)(g^{(j)}(t)) = \sum_{j=0}^n c_j(t) \left( \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i^{(j)}(t) \right) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \left( \sum_{j=0}^n c_j(t) x_i^{(j)}(t) \right)$$

מכיוון שכל הפונקציות  $x_i$  הן פתרונות של המשוואה ההומוגנית, הסכום הפנימי בסוגריים שווה ל-0 לכל  $i$ . לכן מתקבל:

$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot 0 = 0$$

ומכאן שגם  $g(t)$  פותרת את המשוואה, כנדרש.

הערה

באינפיניט פתרונות משוואות מהצורה  $x'(t) = f(t)$ .

אם יודעים לחשב פונקציה קדומה  $f^{-1}$  אז נוכל לכתוב  $x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t f(s) ds$  זה ממשפט היסודי ( $x(t_0)$  זה מידע שתמיד היינו צריכים לקבל מאיפשהו). לכן, גם בקורס הזה כשנתבונן במשוואות דיפרנציאליות תמיד נקבע את תנאי ההתחלה  $x(0) = x_0$  וננסה לפתור את המשוואה עם הנתון הזה. זה נקרא בעיית התחלה.

## 1.2 קיום ויחידות

### 1.4 משפט

נניח שנתונה מערכת  $m$  משוואות דיפרנציאליות מסדר  $n$  כאשר  $x^{(n)}(t) = F(x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t), t)$  עבור  $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  כאשר  $U \subseteq \mathbb{R}^{nm+1}$ . אז יש מערכת מסדר 1  $y'(t) = G(y(t), t)$  עבור  $G: V \subseteq \mathbb{R}^{nm+1} \rightarrow \mathbb{R}^{nm}$  כך שהמערכות שקולות במובן הבא

- אם  $x(t)$  פתרון למערכת המקורית אז  $y = (x, x', \dots, x^{(n-1)})$  הוא פתרון למערכת החדשה
- אם  $y$  פתרון למערכת החדשה אז  $x = y_0$  הוא פתרון למערכת המקורית ולכל  $0 \leq i \leq n-2$  מתקיים  $y'_i = y_{i+1}$

הוכחה: נוכיח עבור  $m = 1$ , המקרה הכללי דומה. נסמן ב- $I$  את  $x^{(n)}(t) = F(x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t), t)$  וב- $II$  את  $y'(t) = G(y(t), t)$ . נגדיר את המערכת  $y'(t) = G(y(t), t)$  על-ידי

$$\begin{cases} y'_0(t) = y_1(t) \\ y'_1(t) = y_2(t) \\ \vdots \\ y'_{n-1}(t) = F(y_0(t), \dots, y_{n-1}(t), t) \end{cases}$$

כלומר

$$G(y_0, \dots, y_{n-1}, t) = (y_1, \dots, y_{n-1}, F(y_0, \dots, y_{n-1}, t))$$

נראה שכל התנאים מתקיימים.

$I \Rightarrow II$  נניח ש- $x(t)$  הוא פתרון של המערכת המקורית  $I$ .

נגדיר וקטור  $y(t)$  על ידי הרכיבים  $y_i(t) = x^{(i)}(t)$  לכל  $0 \leq i \leq n-1$ . נוכיח ש- $y(t)$  מקיים את מערכת  $II$ :  
 לכל  $0 \leq i \leq n-2$ , מתקיים מההגדרה ש- $y'_{i+1}(t) = x^{(i+1)}(t) = (x^{(i)}(t))' = y'_i(t)$ . אלו הן  $n-1$  המשוואות הראשונות במערכת החדשה.  
 עבור הרכיב האחרון, מתקיים  $y'_{n-1}(t) = x^{(n)}(t) = (x^{(n-1)}(t))' = x^{(n)}(t)$ . מכיוון ש- $x(t)$  הוא פתרון של המערכת המקורית  $I$ , נציב את הביטוי שלו ונקבל

$$y'_{n-1}(t) = F(x, x', \dots, x^{(n-1)}, t) = F(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}, t)$$

לכן, הוקטור  $y(t)$  שנבנה פותר את המערכת החדשה  $II$ .

$I \Rightarrow II$  נניח ש- $y(t) = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$  הוא פתרון של המערכת החדשה  $II$ .

נגדיר פונקציה  $x(t) = y_0(t)$  ונוכיח שהיא פותרת את המערכת המקורית  $I$ : מהמשוואה הראשונה של המערכת  $II$  נובע ש- $y'_0 = y_1$ , ולכן  $x' = y_1$ , מהמשוואה השנייה  $y'_1 = y_2$ , ולכן בגזירה חוזרת נקבל  $x^{(2)} = (y_1)' = y_2$ . באופן אינדוקטיבי, לכל  $0 \leq i \leq n-1$  מתקיים ש- $x^{(i)}(t) = y_i(t)$ .

במשוואה האחרונה מתקיים  $y'_{n-1}(t) = F(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}, t)$ .

מצד שמאל,  $y'_{n-1} = (x^{(n-1)})' = x^{(n)}$ . מצד ימין, נציב את הקשרים שמצאנו  $(y_i = x^{(i)})$  ונקבל בדיוק

$$x^{(n)}(t) = F(x, x', \dots, x^{(n-1)}, t)$$

□

משמע ש- $x(t)$  הוא פתרון למערכת המקורית  $I$ .

בתרגיל הבית נראה באופן דומה שאפשר לכל מערכת לא אוטונומית לבנות מערכת שקולה שכן אוטונומית ולכן מעתה נעסוק במערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות אוטונומיות מסדר 1.

טבעי לשאול מהם התנאים שמבטיחים קיום פתרון למשוואות דיפרנציאליות.

## משפט הקיום של פיאנו

### משפט 1.5

תהי  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה,  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  רציפה ו- $\tilde{x}_0 \in U$  נקודת התחלה. אז יש  $\delta > 0$  ופונקציה גזירה  $x : (-\delta, \delta) \rightarrow U$  שפותרת את בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x(0) = \tilde{x}_0 \\ x'(t) = F(x(t)) \end{cases}$$

הערה

תנאי המשפט לא מבטיחים יחידות.

הוכחה: יהי  $r > 0$  כך ש- $\overline{B(\tilde{x}_0, r)} \subseteq U$ ,  $B := \overline{B(\tilde{x}_0, r)} \subseteq U$ , נסמן  $M := \|F\|_B = \sup_{x \in B} |F(x)|$ , נגדיר  $\delta = \frac{r}{M}$  ואת סדרת הפונקציות  $x_k : [-\delta, \delta] \rightarrow U$  על-ידי

$$x_0(t) = \tilde{x}_0$$

$$x_k(t) = \begin{cases} \tilde{x}_0 + tF(\tilde{x}_0) & t \in [-\frac{\delta}{k}, \frac{\delta}{k}] \\ x_k(\frac{j\delta}{k}) + (t - \frac{j\delta}{k})F(x_k(\frac{j\delta}{k})) & t \in [\frac{j\delta}{k}, \frac{(j+1)\delta}{k}] \\ x_k(-\frac{j\delta}{k}) + (t + \frac{j\delta}{k})F(x_k(-\frac{j\delta}{k})) & t \in [-\frac{(j+1)\delta}{k}, -\frac{j\delta}{k}] \end{cases}$$

נשים לב ש- $x_k(t)$  לינארית למקוטעין ב- $t$  ולכן גזירה פרט למספר סופי של נקודות ותמונתה נמצאת בכדור  $B$ , כלומר  $Im(x_k) \subseteq B$  שכן לכל  $0 < \delta < t$  מתקיים

$$\begin{aligned}
\|x_k(t) - \tilde{x}_0\| &= \left\| \int_0^t x'_k(s) \, ds \right\| \\
&\leq \int_0^\delta \|x'_k(s)\| \, ds \\
&= \int_0^{\frac{\delta}{k}} \|F(\tilde{x}_0)\| \, ds + \sum_{j=1}^{k-1} \int_{\frac{j\delta}{k}}^{\frac{(j+1)\delta}{k}} \left\| F\left(x_k\left(\frac{j\delta}{k}\right)\right) \right\| \, ds \\
&\quad \text{באופן רקורסיבי ניתן להראות שלכל } j \text{ מתקיים } x_k\left(\frac{j\delta}{k}\right) \in B \text{ ולכן } \|F(x_k(\frac{j\delta}{k}))\| \leq M \text{ ונקבל לבסוף} \\
\|x_k(t) - \tilde{x}_0\| &\leq \int_0^{\frac{\delta}{k}} \|F(\tilde{x}_0)\| \, ds + \sum_{j=1}^{k-1} \int_{\frac{j\delta}{k}}^{\frac{(j+1)\delta}{k}} \left\| F\left(x_k\left(\frac{j\delta}{k}\right)\right) \right\| \, ds \\
&\leq M \cdot \frac{\delta}{k} + \sum_{j=1}^{k-1} M \left( \frac{(j+1)\delta}{k} - \frac{j\delta}{k} \right) \\
&\leq M \cdot \delta \\
&= r
\end{aligned}$$

סוף הרצאה 2 – 24/03

באופן זה נקבל גם עבור  $-\delta < t < 0$  ולכן הסדרה  $\{x_k\}_{k=1}^\infty$  חסומה במידה שווה (שכן כולן בתוך  $B$ ) והן רציפות במידה אחידה שכן לכל  $k$  מתקיים

$$\|x_k(t) - x_k(s)\| \leq M|t - s|$$

אז הסדרה רציפה במידה אחידה ולכן ממשפט ארצלה-אסקולי יש לסדרה תת-סדרה  $(x_{k_j})_{j=1}^\infty$  מתכנסת במידה שווה לגבול  $x$  ולשם הפשטות נקרא לתת-סדרה זו  $(x_k)_{k=1}^\infty$ . נרצה להראות ש- $x$  גזירה ומקיימת  $x'(t) = F(x(t))$  ומכך ש- $F$  רציפה מהמשפט היסודי מספיק להראות

$$x(t) = \tilde{x}_0 + \int_0^t F(x(s)) \, ds$$

ואכן, לכל  $k$  נגדיר את  $y_k : [-\delta, \delta] \rightarrow U$  ולכל  $1 \leq j < k$  על-ידי

$$y_k(s) = \begin{cases} \tilde{x}_0 & s \in [-\frac{\delta}{k}, \frac{\delta}{k}] \\ x_k\left(\frac{j\delta}{k}\right) & s \in [\frac{\delta j}{k}, \frac{(j+1)\delta}{k}] \\ x_k\left(-\frac{j\delta}{k}\right) & s \in [-\frac{(j+1)\delta}{k}, -\frac{j\delta}{k}] \end{cases}$$

אז לכל  $k$  מתקיים  $x_k(t) = \tilde{x}_0 + \int_0^t F(y_k(s)) \, ds$  ומתקיים

$$\|y_k - x_k\|_\infty \leq \frac{M\delta}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

אז  $(y_k)$  מתכנסת במידה שווה לאורך אותה תת-סדרה ל- $x$ . יתר על-כן,  $F \circ y_k \rightarrow F \circ x$  שכן  $F$  רציפה במידה שווה ב- $B$  ולכן לכל  $\varepsilon > 0$  יש  $\eta > 0$  ו- $\eta$  גדול דיו כך שיתקיים  $\|y_k - x\|_\infty < \eta$  (מההתכנסות לעיל) ומכאן  $\|F(y_k) - F(x)\|_\infty < \varepsilon$ . התכנסות במידה שווה מאפשרת להחליף סדר אינטגרציה וסכום ולכן

$$x(t) = \lim_{\ell \rightarrow \infty} x_{k_\ell}(t) = \tilde{x}_0 + \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int_0^t F(y_{k_\ell}(s)) \, ds = \tilde{x}_0 + \int_0^t \lim_{\ell \rightarrow \infty} F(y_{k_\ell}(s)) \, ds = \tilde{x}_0 + \int_0^t F(x(s)) \, ds$$

□

## מסקנה 1.6

אם  $U \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  קבוצה פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה אז לכל  $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}, t_0) \in U$ ,  $\delta > 0$  יש  $x : [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \rightarrow \mathbb{R}$  כך שמתקיים

$$\begin{cases} x(t_0) = y_0 \\ x'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \\ x^{(n)}(t) = F(x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t), t) \end{cases}$$

הוכחה: מכוון שכל משוואה לא אוטונומית מסדר  $n$  ניתן להמיר למערכת משוואות אוטונומית מסדר 1 משפט 1.4 יחד עם משפט הקיום של פיאנו מניב את הנדרש.  $\square$   
לא ראינו בתנאים שניסחנו יחידות של הפתרון ואם הפתרון בתנאים האלו הוא בהכרח יחיד ואכן לא כך הדבר.

דוגמה

$$x'(t) = 2\sqrt{|x(t)|} \implies F(x) = 2\sqrt{|x|}$$

זו פונקציה  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ויש שני פתרונות  $x = 0$  ו- $x(t) = t^2$  ואלו שני פתרונות שלא מתלכדים על אף סביבה של 0.

יחד עם זאת, ניתן למצוא תנאים ליחידות וזהו משפט פיקארד.

## משפט פיקארד

## משפט 1.7

תהי  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה,  $\tilde{x}_0 \in U$  ותהי  $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$  שהיא ליפשיצית מקומית כלומר לכל  $K \subseteq U$  קומפקטית יש קבוע  $L_K$  כך ש- $F|_K$  ליפשיצית עם הקבוע  $L_K$ . אזי יש  $\delta > 0$  כך שקיים פתרון יחיד בקטע  $[-\delta, \delta]$  לבעיה

$$\begin{cases} x(0) = \tilde{x}_0 \\ x'(t) = F(x(t)) \end{cases}$$

ישנן שתי הוכחות למשפט – אחת באמצעות משפט העתקה מכווצת שראינו בתרגול 2 ואחת מההרצאה. הוכחה של יונתן בהרצאה: משפט פיקארד נובע מהלמה הבאה בעזרת משפט פיאנו.

## למה 1.8

תהי  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ו- $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$  ליפשיצית מקומית. נניח ש- $x(t)$  ו- $y(t)$  שני פתרונות של המשוואה  $\eta'(t) = F(\eta(t))$  כך ש- $x$  מוגדר על הקטע הפתוח  $I \subseteq \mathbb{R}$  ו- $y$  מוגדר על הקטע הפתוח  $J \subseteq \mathbb{R}$ . אם  $0 \in I \cap J$  ו- $x(0) = y(0)$  אזי  $x(t) = y(t)$  לכל  $t \in I \cap J$ .

הוכחה: נוכיח ש- $x(t) = y(t)$  לכל  $t \in I \cap J \cap [0, \infty)$ . נניח שלא ככה ונגדיר  $\tau = \inf\{t \in I \cap J \cap (0, \infty) \mid x(t) \neq y(t)\}$  ומרציפות  $\bar{x} = x(\tau) = y(\tau)$ . ניקח  $r > 0$  כך ש- $\bar{B}_r(\bar{x}) \subseteq U$  וניקח  $\delta > 0$  כך שיתקיים  $[\tau, \tau + \delta] \subseteq I \cap J$  וגם  $x(t), y(t) \in \bar{B}_r(\bar{x})$  לכל  $t \in [\tau, \tau + \delta]$ . נסמן ב- $L$  את קבוע ליפשיץ של  $F|_{\bar{B}_r(\bar{x})}$ , עבור  $t \in [\tau, \tau + \delta]$  מתקיים

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|x(t) - y(t)\|^2 &= 2\langle x(t) - y(t), x'(t) - y'(t) \rangle \\ &= 2\langle x(t) - y(t), F(x(t)) - F(y(t)) \rangle \\ &\stackrel{(*)}{\leq} 2\|x(t) - y(t)\| \cdot \|F(x(t)) - F(y(t))\| \\ &\stackrel{(**)}{\leq} 2L \cdot \|x(t) - y(t)\|^2 \end{aligned}$$

כאשר  $(*)$  זה אי-שוויון קושי-שוורץ ו- $(**)$  זה מהליפשיציות. אז הפונקציה  $f(t) = e^{-2Lt} \|x(t) - y(t)\|^2$  היא מונוטונית יורדת כי מגזירה

$$\frac{d}{dt} f \leq -2Lf(t) + 2Lf(t) = 0$$

הנגזרת לא חיובית ולכן היא מונוטונית יורדת ובנוסף  $f(t)$  אי-שלילית ב- $[\tau, \tau + \delta]$  אבל  $f(\tau) = 0$  ולכן  $f(t) = 0$  לכל  $t \in [\tau, \tau + \delta]$  ולכן  $\|x(t) - y(t)\| = 0$  וזו סתירה להגדרת  $\tau$  בתור אינפימום.

עבור  $t$ -ים שליליים ההוכחה דומה עם  $\sup$  ופונקציה קצת אחרת או להסתכל על  $\tilde{x}(t) = x(-t)$  ומהמשוואה  $\eta'(t) = -F(\eta(t))$ .  $\square$

הוכחה של משפט פיקארד באמצעות משפט העתקה מכווצת: לפי המשפט היסודי בעיית ההתחלה שקולה למשוואה האינטגרלית

$$x(t) = x_0 + \int_0^t F(x(s)) ds$$

נגדיר את אופרטור פיקארד  $K$  הפועל על מרחב פונקציות

$$Kx(t) = x_0 + \int_0^t F(x(s)) ds$$

כעת, הבעיה שקולה למציאת נקודת שבת של האופרטור  $K$ , כלומר פונקציה המקיימת  $Kx = x$ . מכיוון ש- $F$  ליפשיצית מקומית, קיים כדור סגור  $\bar{B}_r(x_0) \subseteq U$  שבו  $F$  חסומה על ידי קבוע  $M_r$  וליפשיצית עם קבוע  $C_r$ .

נגדיר את המרחב המטרי  $X$  להיות מרחב הפונקציות הרציפות מהקטע  $(-\delta, \delta)$  אל הכדור  $\overline{B}_r(x_0)$  עם נורמת הסופרמום וזה מרחב מטרי שלם. נבחר  $\delta > 0$  קטן מספיק כך שיתקיים  $\delta \leq \min\left(\frac{r}{2M_r}, \frac{1}{2C_r}\right)$  ונשים לב שהאופרטור  $K$  מוגדר היטב שכן לכל פונקציה  $x \in X$  מתקיים

$$\|Kx(t) - x_0\| \leq \int_0^t \|F(x(s))\| ds \leq \delta M_r \leq \frac{r}{2} < r$$

ולכן  $Kx$  נשארת בתוך הכדור  $\overline{B}_r(x_0)$ , כלומר האופרטור  $K$  מפה את  $X$  לעצמו. לכל שתי פונקציות  $x, y \in X$  מתקיים

$$\|Kx(t) - Ky(t)\| \leq \int_0^t \|F(x(s)) - F(y(s))\| ds \leq \int_0^t C_r \|x(s) - y(s)\| ds \leq \delta C_r \|x - y\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|x - y\|_\infty$$

ולכן  $K$  היא העתקה מכווצת והמרחב שלם אז ממשפט העתקה מכווצת יש ב- $X$  נקודת שבת יחידה והיא הפיתרון היחיד למשוואה בקטע  $(-\delta, \delta)$ . □

## איטרציות פיקארד

### הגדרה 1.9

משפט העתקה מכווצת מספק לנו גם אלגוריתם קונסטרוקטיבי למציאת הפתרון. אם נתחיל מניחוש התחלתי כלשהו, למשל הפונקציה הקבועה  $y_0(t) = x_0$ , ונפעיל את האופרטור  $K$  באופן איטרטיבי

$$y_n(t) = Ky_{n-1}(t) = x_0 + \int_0^t F(y_{n-1}(s)) ds$$

מובטח לנו שסדרת הפונקציות  $(y_n)_{n=0}^\infty$  (אשר נקראת איטרציות פיקארד) תתכנס במידה שווה לפתרון היחיד של המשוואה.

סוף הרצאה 3 – 13/04

## 1.3 תלות בתנאי ההתחלה

### הפיתרון המקסימלי

#### 1.10 הגדרה

נניח ש- $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  ליפשיץ מקומית. לכל  $p \in U$  יש  $\delta > 0$  כך שלבעיה

$$(\star) \begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

נגדיר

$$J_p^* := \{t \in \mathbb{R} \mid \text{the solution for the problem } (\star) \text{ exists on a segment that contains } t\}$$

ו- $J_p^*$  היינו קטע (כי אם  $t$  נמצא בו ו- $0$  נמצא בו אז כל נקודה בין  $0$  ל- $t$  נמצא בו כי זה מכיל את הקטע). הפיתרון שמוגדר על  $J_p^*$  הוא יחיד (מהלמה שהוכחנו) ופיתרון זה נקרא הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה.

### טריכוטומיה של זרימות של שדה ליפשיץ מקומי

#### 1.11 משפט

תהי  $U \in \mathbb{R}^n$  פתוחה, תהי  $p \in U$  ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  ליפשיץ מקומית ונסמן  $x : J_p^* \rightarrow U$  הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

אזי עבור  $T \in \partial J_p^* \setminus \{\pm\infty\}$  מתקיים אחד משני המקרים הבאים

$$1. \liminf_{t \rightarrow T} \text{dist}(x(t), \partial U) = 0$$

$$2. \limsup_{t \rightarrow T} \|x(t)\| = \infty$$

הוכחה: נניח ש- $\sup J_p^* = T < \infty$  ו- $\liminf_{t \rightarrow T} \text{dist}(x(t), \partial U) > 0$  ו- $\limsup_{t \rightarrow T} \|x(t)\| < \infty$ . כלומר, הקבוצה (התמונה של המסילה)  $x([0, T))$  חסומה ומוכלת בקבוצה הסגורה

$$A_{\varepsilon_0} := \left\{x \mid \text{dist}(x, \partial U) \geq \frac{\varepsilon_0}{2}\right\}, \quad \varepsilon_0 > 0$$

ניקח סדרה  $0 < t_k < T$  כך ש- $t_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} T$  ונבחר  $x_{t_k}$  כולם שייכים לקבוצה  $A_{\varepsilon_0}$  וגם לקבוצה החסומה  $x([0, T))$ . נפעיל את (ההוכחה של) משפט פיקארד עם  $x_{t_k}$  כנקודת התחלה עם אותו  $\delta < 0$  לכולם שכן  $\delta$  תלוי ברדיוס בכדור שניתן לקחת סביב  $x_{t_k}$  ובחוסם על  $\|F\|_B$  אבל את הרדיוס והחוסם על הנורמה ניתן לבחור באופן אחיד (כי  $F$  רציפה ולכן חסומה וזה חוסם את כל הנקודות).

יהי  $K$  כך ש- $T < t_K + \delta$  ונקבל שתירה לכך  $J_p^* = \sup T$  כי ממשפט פיקארד הפיתרון מוגדר מעבר ל- $T$ . משיקולי סימטריה ההוכחה למקרה השני זהה. □

### טענה 1.12

תהי  $U \in \mathbb{R}^n$  פתוחה, תהי  $p \in U$  ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  ליפשיץ מקומית.

נניח שאנחנו יודעים שקיימת קבוצה קומפקטית  $K \subseteq U$  ו- $T > 0$  עובד באופן דומה) כך שלכל  $0 < t < T$  מתקיים שאם  $t \in J_p^*$  אז  $x_p(t) \in K$  אז מתקיים  $[0, T] \subseteq J_p^*$ .

כלומר, אם הפיתרון בתנאי התחלה  $p$  קיים עד לזמן  $t$  שבפיתרון המקסימלי אז  $x_p(t) \in K$  אז אם כל זה קורה,  $[0, T] \subseteq J_p^*$ .

הוכחה: אם  $T > \sup J_p^*$  אז נסמן  $T = \sup J_p^*$  ונקבל ש- $x([0, \tau)) \subseteq K$  אבל אז לא קרה אף אחד מהדברים (לא התפוצצנו ולא נגענו בשפה) בסתירה לכך ש- $T < \infty$ .

□

### הגדרה 1.13

עבור  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  ליפשיצית מקומית עבור  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה נגדיר

$$\Omega := \{(p, t) \mid p \in U, t \in J_p^*\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

לכל  $(p, t) \in \Omega$  נגדיר את  $\Phi(p, t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$  היכן ש- $x_p(t)$  פיתרון ל- $x_p'(t) = F(x_p(t))$  ו- $x_p(0) = p$ .

### תלות רציפה בתנאי ההתחלה

### משפט 1.14

הקבוצה  $\Omega$  היא קבוצה פתוחה וההעתקה  $\Phi : \Omega \rightarrow U$  היא רציפה ( $F$  כמובן ליפשיץ מקומית).

הוכחה: תהי  $(p, t_0) \in \Omega$ , נרצה להראות ש- $\Omega$  מכילה סביבה של  $(p, t_0)$  ושי- $\Phi$  רציפה שם. ניקח  $t_0 \geq 0$  (לשלילי אותו הדבר אבל אנחנו אנשים חיוביים) ותהי

$$C := \{\Phi(p, t) \mid 0 \leq t \leq t_0\} \subseteq U$$

זאת קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית ויש לה מרחק חיובי מהשפה (כלומר, קיים  $r > 0$  כך ש- $\text{dist}(C, \partial U) > 4r$ ). נסמן

$$M := \sup\{\|F(x)\| \mid \text{dist}(x, C) \leq 4r\}, \quad L := \text{Lip } F|_{\text{dist}(x, C) \leq 4r}$$

בשביל ההוכחה הזאת אנחנו צריכים 3 למות.

### למה 1.15

תהי  $q \in U$  כך ש- $\|q - p\| \leq re^{-Lt_0}$  אזי לכל  $0 \leq t \leq t_0$  ש- $(q, t) \in \Omega$  מתקיים

$$\|\Phi(p, t) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

הוכחה של למה 1.15: נסמן  $x_p(t), x_q(t)$  להיות הפתרונות המתאימים.

נניח שקיים  $0 \leq t \leq t_0$  ש- $(q, t) \in \Omega$  אבל  $\|x_p(t) - x_q(t)\| \geq 2e^{Lt}\|p - q\|$ . ברור כי  $q \neq p$  ונסמן

$$\tau := \inf\{t \in [0, t_0] \mid (q, t) \in \Omega, \|x_p(t) - x_q(t)\| \geq 2e^{Lt}\|p - q\|\}$$

אז  $0 < \tau \leq t_0$  (מהרציפות),  $(q, \tau) \in \Omega$  וכן  $\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\| = 2e^{L\tau}\|p - q\|$  ויתרה מזאת, לכל  $t \in [0, \tau]$

$$\|x_p(t) - x_q(t)\| \leq 2e^{Lt}\|p - q\| \leq 2r$$

לכן  $x_p(t), x_q(t) \in [0, \tau]$  לכל  $t$  מוכל בקבוצה

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, C) \leq 2r\}$$

ולכן  $F$  ליפשיץ שם עם קבוע  $L$  ובפרט לכל  $t \in [0, \tau]$

$$\|F(x_p(t)) - F(x_q(t))\| \leq L\|x_p(t) - x_q(t)\|$$

ומכאן

$$\frac{d}{dt}\|x_p(t) - x_q(t)\|^2 \leq 2L\|x_p(t) - x_q(t)\|^2$$

ולכן הפונקציה  $t \mapsto e^{-2Lt}\|x_p(t) - x_q(t)\|^2$  מונוטונית יורדת בקטע  $[0, \tau]$  ומכאן נקבל

$$2\|p - q\| \leq e^{-L\tau}\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\| \leq \|p - q\|$$

וזאת סתירה.

□



### למה 1.16

תהיי  $q$  כזו ש- $\|p - q\| \leq re^{-Lt_0}$ , אם  $(q, t) \in \Omega$  ו- $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$  אזי  $\Phi(q, t) \in \tilde{C}$ .

הוכחה של למה 1.16: בשלילה נניח שיש  $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$  כך ש- $(q, t) \in \Omega$  אבל  $\text{dist}(\Phi(q, t), C) > 4r$  ומהלמה הקודמת עבור  $0 \leq t \leq t_0$  מתקיים  $\text{dist}(\Phi(q, t), C) \leq 2r$  ולכן עבור  $t$  כזה מהנחת השלילה בהכרח מתקיים  $t_0 < r$  ובפרט  $(q, t_0) \in \Omega$ . נסמן  $\tau = \inf\{t_0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M} \mid (q, t) \in \Omega, \text{dist}(q, C) > 4r\}$ . אבל  $t_0 \leq \tau \leq t_0 + \frac{r}{M}$  ו- $\text{dist}(\Phi(q, \tau), C) = 4r$  ויתר על-כן לכל  $t_0 \leq t \leq \tau$  מתקיים  $\text{dist}((q, t), C) \leq 4r$  ובפרט לכל  $0 \leq t \leq \tau$  מתקיים  $\|F(\Phi((q, t)))\| \leq M$

$$\text{dist}(\Phi(q, \tau), C) \leq \|\Phi(q, \tau) - \Phi(q, t_0)\| + \text{dist}(\Phi(q, t_0), C) \leq M \cdot (\tau - t_0) + 2r \leq M \cdot \frac{r}{M} + 2r = 3r$$

□

וזאת כמוכן סתירה.

### למה 1.17

נניח ש- $\|p - q\| \leq re^{-Lt_0}$  ו- $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$  אזי  $(q, t) \in \Omega$  ומתקיים

$$\|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq 2e^{Lt_0}\|p - q\| + M\|t_0 - t\|$$

### הערה

הלמה הזאת מסיימת את ההוכחה של משפט 1.14 עבור  $t_0 \geq 0$ .

ראשית ברור מכאן ש- $\Omega$  פתוחה וכן  $\Phi$  רציפה עבור  $t_0 > 0$  ובמקרה  $t_0 = 0$  מקבלים סביבה ימנית ב- $t$  והרציפות היא רציפות מימין ב- $t$  ומהוכחה דומה עבור  $t_0 \leq 0$  נקבל רציפות משמאל וזה מסיים את ההוכחה.

הוכחה של למה 1.17: הראינו שבתנאים הנתונים לכל  $t$  שעבורו  $(q, t) \in \Omega$  מתקיים  $\text{dist}(\Phi(q, t), C) \leq 4r$  ולכן לכל  $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$  כזה,  $(q, t) \in \Omega$  כי אחרת היה  $0 \leq t_0 \leq t_0 + \frac{r}{M}$  שעבורו הפתרון מגיע לשפה של  $U$  או מתפוצץ אבל זה לא ייתכן. כעת, כדי לקבל את האי-שוויון נכתוב

$$\|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq \|\Phi(p, t_0) - \Phi(q, t_0)\| + \|\Phi(q, t_0) - \Phi(q, t)\| \leq \underbrace{2e^{Lt_0}\|p - q\|}_{\text{Lemma 1}} + \underbrace{M|t - t_0|}_{\Phi(q, t) \in \tilde{C}}$$

□

□

מה בנוגע לגזירות?

נשים לב ש- $\Phi$  גזירה לפי  $t$  שכן

$$x'_p(t) = \frac{\partial \Phi(p, t)}{\partial t} = F \circ \Phi(p, t) = F(x_p(t))$$

מה לגבי הגזירה של  $\Phi$  לפי מיקום?

אם  $\Phi$  גזירה לפי המיקום (נסמן את הגזירת ב- $D\Phi$ ), בזמן 0 היא הזהות על כל  $U$  ולכן  $\Phi$  אכן גזירה ומתקיים  $D\Phi(p, 0) = \text{Id}$

$$\frac{\partial}{\partial t} D\Phi = D\left(\frac{\partial}{\partial t} \Phi\right) = D(F \circ \Phi) = DF(\Phi(p, t))D\Phi(p, t)$$

אז אם  $F$  לא גזירה אין על מה לדבר!

את הטענה הבאה הוכחנו בתרגיל הבית (את ההוכחה לא ראינו בהרצאה)

### משפט 1.18

יהי  $I \subseteq \mathbb{R}$  קטע פתוח המכיל את 0, ותהיי  $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  פונקציה רציפה. אזי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} M'(t) = A(t)M(t) \\ M(0) = \text{Id} \end{cases}$$

קיים פתרון יחיד  $M(t)$  המוגדר על כל הקטע  $I$ .

הוכחה: הפונקציה  $F(M, t) = A(t)M$  היא ליניארית במשתנה  $M$  ורציפה במשתנה  $t$ . עבור כל  $t_0 \in I$ ,  $F$  ליפשיצית מקומית במשתנה  $M$  (שכן על קטע קומפקטי המכיל את  $t_0$ , הנורמה של  $A(t)$  חסומה). לפי משפט פיקארד, קיים פתרון יחיד  $M(t)$  בסביבה של כל נקודה ב- $I$ . נסמן ב- $v_j(t)$  את העמודה ה- $j$  של המטריצה  $M(t)$ . המשוואה המטריצינית שקולה למערכת של  $n$  משוואות וקטוריות בלתי-תלויות

$$v_j'(t) = A(t)v_j(t), \quad v_j(0) = e_j$$

כאשר  $(e_j)_{j=1}^n$  הוא הבסיס הסטנדרטי. מספיק להוכיח שכל עמודה  $v_j(t)$  מוגדרת על כל הקטע  $I$ . עבור  $v_j$ , עלידי אינטגרציה של שני אגפי המשוואה מ-0 עד  $t$  נקבל

$$v_j(t) = e_j + \int_0^t A(s)v_j(s) ds \Rightarrow \|v_j(t)\| \leq \|e_j\| + \int_0^t \|A(s)\| \cdot \|v_j(s)\| ds$$

נניח בשלילה שמשך הקיום המקסימלי של הפתרון חסום בתוך  $I$ , כלומר הפתרון מוגדר על  $[0, T_{\max})$  כאשר  $T_{\max} \in I$  (ההוכחה לשליליים זהה). מרציפות  $A$  על  $[0, T_{\max}]$  נסמן  $L := \max_{s \in [0, T_{\max}]} \|A(s)\| < \infty$  ונסמן  $f(t) = \|v_j(t)\|$ . לכל  $\tau \in [0, T_{\max})$  נקבל

$$f(\tau) \leq 1 + L \int_0^\tau f(s) ds$$

לפי הלמה של גרונוול נובע כי  $f(\tau) \leq e^{L\tau} \leq e^{LT_{\max}}$  ולכן קיבלנו שהגורמה של הפתרון חסומה בתוך הקטע ולכן לא שואפת לאינסוף כאשר  $t \rightarrow T_{\max}$ . ממשפט הטריכוטומיה נובע שניתן להמשיך את הפתרון מעבר ל- $T_{\max}$  וזו סתירה. לכן הפתרון בהכרח מוגדר על כל הקטע  $I$ .  $\square$

## תלות גזירה בתנאי ההתחלה

### משפט 1.19

תהי  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ו- $p \in U$  עם  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  גזירה ברציפות ובפרט ליפשיץ מקומית. יהי  $x_p$  הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

ויהי  $M(t)$  הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} M'(t) = DF(x_p(t))M(t) \\ M(0) = \text{Id} \end{cases}$$

אזי לכל  $T \in J_p^*$ , גזירה ב- $p$  והדיפרנציאל שלה נתון על-ידי  $D\varphi_T(p) = M(t)$ .

סוף הרצאה 5 – 27/04

הוכחה: נניח ש- $T > 0$  (כי אם  $T = 0$  אז זו הזהות ולכן גזירה ועבור  $T < 0$  זה תהליך דומה) ולכל  $q \in U$  נגדיר

$$u(t) = x_q(t) - x_p(t) - M(t)(q - p)$$

צריך להוכיח שלכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta > 0$  כך שאם  $\|q - p\| < \delta$  אז  $\|u(T)\| \leq \varepsilon$  ויהי  $\varepsilon > 0$  ונסמן

$$L := \sup_{t \in [0, T]} \|DF(x_p(t))\|, \quad K = \sup_{t \in [0, T]} \|M(t)\|$$

קיימת  $\eta > 0$  כך שמתקיים  $\eta K T e^{T(L+\eta)} < \varepsilon$  וקיים  $r > 0$  כך שלכל  $t \in [0, T]$  ולכל  $z$  כך ש- $\|z - x_p(t)\| < r$  מתקיים

$$(\diamond) \|F(z) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(z - x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

מרציפות הזרימה בתנאי ההתחלה קיים  $\delta > 0$  כך שאם  $\|q - p\| < \delta$  אז  $\|x_q(t) - x_p(t)\| < r$  לכל  $t \in [0, T]$ . צריך להעריך את  $u(T)$ : אם  $\|u(T)\| = 0$  סיימנו, אחרת נסמן  $\tau := \sup\{0 \leq t \leq T \mid u(t) = 0\}$  אז על הקטע  $(\tau, T]$  מאי-שיוויון קושי-שוורץ

$$(\heartsuit) \frac{d}{dt} \|u(t)\| = \frac{\langle u(t), u'(t) \rangle}{\|u(t)\|} \leq \|u'(t)\|$$

נחשב

$$\begin{aligned} u'(t) &= x_q'(t) - x_p'(t) - M'(t)(q - p) \\ &= F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))M(t)(q - p) \\ &= F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(x_q(t) - x_p(t)) + DF(x_p(t))u(t) \end{aligned}$$

נשים לב שממה שמצאנו לעיל והבחירה שלנו של  $q$

$$\|F(x_q(t)) - F(x_p(t)) - DF(x_p(t))(x_q(t) - x_p(t))\| < \eta \|x_q(t) - x_p(t)\|$$

אז

$$\begin{aligned}
\|u'(t)\| &\leq \eta \|x_q(t) - x_p(t)\| + L\|u(t)\| \\
&= \eta \|u(t) + M(t)(q - p)\| + L\|u(t)\| \\
&\leq (\eta + L)\|u(t)\| + \eta \|M(t)(q - p)\| \\
&\triangleq \\
&\leq \eta K \|q - p\| + (L + \eta)\|u(t)\|
\end{aligned}$$

בפרט עם (♥) נקבל

$$(\star) \quad \frac{d}{dt} \|u(t)\| \leq \eta K \|q - p\| + (L + \eta)\|u(t)\|$$

מאותו טריק של מרכבות על נגזרת של אקספוננט

$$\frac{d}{dt} (e^{-t(L+\eta)} \|u(t)\|) = e^{-t(L+\eta)} \left( -(L + \eta)\|u(t)\| + \frac{d}{dt} \|u(t)\| \right) \stackrel{(\star)}{\leq} \eta K \underbrace{e^{-t(L+\eta)}}_{\leq 1} \|q - p\| \leq \eta K \|q - p\|$$

אבל האחרון זה נגזרת של פונקציה לינארית  $\frac{d}{dt} (\eta K \|q - p\| t)$  ולכן הפונקציה  $e^{-t(L+\eta)} \|u(t)\| - \eta K t \|q - p\|$  היא מונוטונית יורדת באינטרוול  $(\tau, T]$  כי הנגזרת קטנה מאפס (מהצבה) ונקבל

$$e^{-T(L+\eta)} \|u(T)\| - \eta K T \|q - p\| \leq e^{-\tau(L+\eta)} \underbrace{\|u(\tau)\|}_{=0} - \eta K \tau \|q - p\| = -\eta K \tau \|q - p\| \leq 0$$

ובסך-הכל

$$\|u(T)\| \leq e^{T(L+\eta)} \eta K T \|q - p\| < \varepsilon \|q - p\|$$

הערה

הסבר ל-(♦): עד היום תמיד הסכמנו שאם  $\|DG\|_{op} < M$  אז  $\|G(z) - G(w)\| \leq M \|z - w\|$  על המסלול בין  $z$  ל- $w$  (טריק אינטגרציה). אז עבור  $t, p$  נתונים נגדיר  $G(z) = F(z) - DF(x_p(t))z$  ומכללי גזירה

$$DG(z) = DF(z) - DF(x_p(t))$$

ולכן

$$\|DG(z)\| = \|DF(z) - DF(x_p(t))\| < \eta$$

ולכן

$$\|G(z) - G(x_p(t))\| < \eta \|z - x_p(t)\|$$

והצבת הגדרת  $G(z)$  מניבה את הנדרש.

□

סוף הרצאה 6 - 28/04

## 1.4 משוואות לינאריות עם מקדמים קבועים

את המשפט הבא ראינו בתרגיל הבית וההוכחה כאן היא בהשראת הסיכום במודל טענה 4.1.

### 1.20 משפט

יהי  $I \subseteq \mathbb{R}$  קטע שמכיל את 0,  $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  פונקציות רציפות. אזי לכל  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  קיים פתרון יחיד אשר מוגדר על כל  $I$  לבעיית ההתחלה

$$(\star) \quad \begin{cases} x'(t) = A(t)x(t) + g(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

### 1.21 הגדרה

בתנאי המשפט לעיל, אם  $g(t) = 0$  לכל  $t$  המשוואה  $(\star)$  נקראת הומוגנית והיא תקרא אוטונומית אם  $A$  ו- $g$  אינן תלויות ב- $t$  (אם  $A, g$  קבועות אז  $(\star)$  אוטונומית).

הוכחה: מספיק להוכיח את המשפט לכל קטע סגור וחסום  $I_0 \subseteq I$ .

$$F(x, t) := A(t)x + g(t), \quad L := \sup_{t \in I_0} \|A(t)\|_{op}, \quad M := \sup_{t \in I_0} \|g(t)\|$$

מתקיים ש- $L < \infty$  שכן  $A$  רציפה ו- $I_0$  קומפקטי ולכן  $F$  רציפה ב- $\mathbb{R}^n \times I_0$  ומקיימת את תנאי ליפשיץ

$$\|F(x, t) - F(y, t)\| = \|A(t) \cdot (x - y)\| \leq L\|x - y\|$$

ממשפט פיקארד מספיק להניח רציפות של  $F$  במשתנה הזמן וליפשציות מקומית של  $F$  במשתנה המיקום עם קבועי ליפשיץ שלא תלויים בזמן ולכן קיים פתרון יחיד לפרק זמן סופי כלשהו.

מאישיוויון קושי-שוורץ נקבל

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\|x(t)\|^2 &= 2\langle x'(t), x(t) \rangle \\ &= 2\langle A(t)x(t) + g(t), x(t) \rangle \\ &\leq 2\|A(t)x(t) + g(t)\| \cdot \|x(t)\| \\ &\leq 2\|A(t)x(t)\| \cdot \|x(t)\| + 2\|g(t)\| \cdot \|x(t)\| \\ &\leq 2L\|x(t)\|^2 + 2M\|x(t)\| \end{aligned}$$

אז אפשר לקחת  $0 < C$  שתלוי ב- $L, M$  אבל לא תלוי ב- $t$  (כי אחד ריבועי ב- $\|x(t)\|$  והשני לינארי בו) כך שמתקיים

$$2L\|x(t)\|^2 + 2M\|x(t)\| \leq 4L\|x(t)\|^2 + C$$

בלי הגבלת הכלליות  $0 < t$  ואז

$$\frac{d}{dt}[e^{-4Lt}\|x(t)\|^2] \leq Ce^{-4Lt} \leq C$$

מאינטגרציה על התחום  $[0, t]$  נקבל

$$\|x(t)\|^2 e^{-4Lt} - \|x_0\|^2 \leq Ct \implies \|x(t)\|^2 \leq Cte^{4Lt} + \|x_0\|^2 e^{4Lt}$$

כלומר הפיתרון לא יכול להתפוצץ בזמן סופי  $C, M, L$  תלויים בבחירת  $I_0$  שקבועים ולא יכולים להתפוצץ בזמן סופי) ומטריכוטומיה הפתרון מוגדר היטב על כל  $I$ . □

## משפט 1.22

מרחב הפתרונות המקסימלי למשוואה (\*) עם  $g(t) = 0$  לכל  $t$  (ללא תנאי התחלה) הוא מרחב לינארי ממימד  $n$ .

## הערה

קבוצת הפתרונות ל- (\*) כאשר  $g = 0$  סגורה לחיבור וכפל בסקלר שכן אם  $x, y$  פתרונות ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  נסתכל על

$$(\alpha x + \beta y)' = \alpha x' + \beta y' = \alpha A(t)x(t) + \beta A(t)y(t) = A(t)(\alpha x + \beta y)$$

שכן  $x, y$  פתרונות וזאת הוכחה עבור מימד 2 ושאר ההוכחה באינדוקציה על  $n$  ולכן  $\alpha x + \beta y$  פתרון.

הוכחה: נסמן ב- $e_k$  את הוקטור הסטנדרטי ונסמן ב- $x_k$  את הפתרון ל- (\*) עם תנאי ההתחלה  $x_k(0) = e_k$ .  
 $\{x_k\}_{k=1}^n$  בלתי-תלויים שכן אם נניח שמתקיים  $\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j(t) = 0$  לכל  $t$  אז בפרט  $\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j(0) = 0$ . מכיוון  $x_j(0) = e_j$  קיבלנו  $\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j = 0$ .  
מכך שוקטורי הבסיס הסטנדרטי בלתי-תלויים לינארית נסיק כי  $\alpha_j = 0$  לכל  $j$  וקיבלנו בלתי-תלויים.  
היא גם פורשת שכן אם  $y$  פתרון ולכן  $y' = Ay$  וקיימים  $\{B_j\}$  כך ש- $y(0) = \sum B_j e_j$  ו- $y(t) = \sum B_j x_j(t)$  ומיחדיות  $y(0) = \sum B_j e_j$  וקיבלנו שהקבוצה פורשת. □

נתבונן במשוואה הומוגנית עם מקדמים קבועים, כלומר  $x'(t) = A \cdot x(t)$  כאשר  $A$  מטריצה קבועה שאינה תלויה ב- $t$  ו- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ונניח ש- $x(0) = x_0$  ננסה להפעיל את איטרציות פיקארד

$$x_1(t) = x_0 + \int_0^t Ax_0(s) ds = x_0 + A \int_0^t x_0 = x_0 + Atx_0$$

$$x_2(t) = x_0 + \int_0^t x_1(s) ds = x_0 + Atx_0 + \frac{A^2 t^2}{2} x_0$$

⋮

$$x_n(t) = \sum_{i=0}^n \frac{A^i t^i}{i!} x_0 = \left( \text{Id} + At + \dots + \frac{A^n t^n}{n!} \right) x_0$$

מפיקארד התהליך הזה מתכנס ונסמן את הגבול ב- $x_0 \cdot \exp(tA)$  (זה בעצם אקספוננט שמציבים בפנים וקטור).

## הגדרה 1.23

לכל מטריצה  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  נגדיר את  $\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$  כאשר  $A^0 = \text{Id}$ .

### 1.24 טענה

הטור לעיל מתכנס.

הוכחה: נראה זאת בנורמט אינסוף שכן בלאו הכי כל הנורמות שקולות ומספיק להוכיח שסדרת הסכומים האלו היא סדרת קושי, ואכן

$$\left\| \sum_{k=0}^t \frac{A^k}{k!} - \sum_{k=0}^s \frac{A^k}{k!} \right\|_{op} \leq \sum_{k=s+1}^t \frac{1}{k!} \|A^k\|_{op} \leq \sum_{k=s+1}^t \frac{1}{k!} \|A\|_{op}^k$$

□

מהיות  $e^{\|A\|_{op}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \|A\|_{op}^k < \infty$  זה קטן כרצוננו עבור  $s, t$  מספיק גדולים.

### 1.25 טענה

אם  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  כך ש- $AB = BA$  אזי  $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$ .

הוכחה: ממכפלת קושי לטורים ואך ורק בגלל ש- $AB = BA$  ניתן להשתמש בבינום של ניוטון (אחרת הוא לא נכון)

$$\exp(A)\exp(B) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k}{k!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i+j=n} \frac{A^i}{i!} \cdot \frac{B^j}{j!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i+j=n} \frac{1}{n!} \binom{n}{i} \frac{A^i}{i!} \cdot \frac{B^j}{j!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (A+B)^n = \exp(A+B)$$

□

### 1.26 מסקנה

אם  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  אז  $\exp(A)$  מטריצה הפיכה ו- $\exp(-A) = (\exp(A))^{-1}$ .

הוכחה:  $A$  ו- $-A$  מתחלפות ולכן מהטענה הקודמת

$$\text{Id} = \exp(0) = \exp(A + (-A)) = \exp(A) \cdot \exp(-A)$$

□

### 1.27 מסקנה

לכל  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ההעתקה  $t \mapsto \exp(tA)$  (זו ההעתקה  $(\mathbb{R} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R}))$  היא הומומורפיזם של חבורות.

הוכחה: לכל  $s, t \in \mathbb{R}$  ו- $sA, tA$  מתחלפות ואז  $\exp((t+s)A) = \exp(tA)\exp(sA)$  אבל גם מתקיים

$$\exp((t+s)A) = \exp(tA + sA) = \exp(tA) \cdot \exp(sA)$$

□

עד כה ראינו שעבור

$$\begin{cases} x' = Ax \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

מתקיים ש- $x(t) = \exp(tA)x_0$  הוא פתרון למשוואה על קטע (אולי קטן) סביב 0 אבל  $\exp(tA)x_0$  מוגדר לכל  $t$  והפתרון מוגדר לכל  $t \in I$  וטבעי לשאול האם הם מתלכדים – התשובה לכך היא כן.

### 1.28 טענה

יהי  $y$  הפתרון המקסימלי למשוואה

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

ו- $x(t) = \exp(tA)x_0$  אז  $y(t) = \exp(tA)x_0$  לכל  $t \in I$ .

הוכחה: נניח שלא ויש  $t > 0$  כך ש- $x(t) \neq y(t)$  ונסמן  $\tau := \inf\{t > 0 \mid x(t) \neq y(t)\}$ .

מתקיים  $0 < \tau$  כי אנו יודעים שבאיזשהו סביבה ימנית שבה הם מסכימים. נראה שיש סביבה של  $\tau$  שבה  $x, y$  מסכימים ונקבל סתירה. נסמן  $z_* = \exp(\tau A)x_0$  ונתבונן בבעיה

$$(\star\star) \begin{cases} z'(t) = Az(t) \\ z(\tau) = z_* \end{cases}$$

מאיטרציות פיקארד ידוע שיש סביבה  $0 < \delta$  של  $\tau$  כך ש-  $z(t) = \exp((t - \tau)A)z_*$  הוא הפיתרון היחיד לבעיה  $(\star \star)$ .  
נשים לב שמתקיים  $x(\tau) = y(\tau)$  שכן זה אינפמום היכן שהם לא שווים ומרציפות ו-  $y(\tau) = \exp(\tau A)x_0$  ולכן  $y, z$  מתלכדים על סביבה זו של  $\tau$ .  
מצד שני, על הסביבה הזו מתקיים

$$z(t) = \exp((t - \tau)A)z_* = \exp((t - \tau)A) \exp(\tau A)x_0 = \exp(tA - \tau A + \tau A)x_0 = \exp(tA)x_0 = x(t)$$

□

מהגדרה וזו כמובן סתירה.

איך מחשבים את  $\exp(tA)$ ? נשים לב ש-  $P$  מטריצה הפיכה ואז  $\exp(PAP^{-1}) = P \exp(A) P^{-1}$  שכן  $PP^{-1} = \text{Id}$  ואז  $(PAP^{-1})^k = A^k$ .  
שנית, אם  $A$  אלכסונית אז

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \exp(tA) = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & & 0 \\ & e^{t\lambda_2} & \\ & \ddots & \\ & & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix}$$

שלישית, פעולת האקספוננט מכבדת חלוקה לבלוקים, כלומר

$$\exp \begin{pmatrix} \square & 0 \\ & \square \\ & \ddots \\ 0 & \square \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \exp \square & 0 \\ & \exp \square \\ & \ddots \\ 0 & \exp \square \end{pmatrix}$$

## טענה 1.29

לכל בלוק ז'ורדן  $J_\lambda \in \mathbb{C}^{n \times n}$  מתקיים

$$\exp(tJ_\lambda) = e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & t & \dots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

הוכחה: באינדוקציה על  $k$  רואים שמתקיים

$$(tJ_\lambda)^k = t^k \begin{pmatrix} \binom{k}{0} \lambda^k & \binom{k}{1} \lambda^{k-1} & \dots & \binom{k}{n} \lambda^{k-n} \\ & \binom{k}{0} \lambda^k & \dots & \binom{k}{n-1} \lambda^{k-n+1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \binom{k}{0} \lambda^k \end{pmatrix}$$

כאשר  $\binom{k}{j} = 0$  לכל  $j < k$  ומכאן מתקיים

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tJ_\lambda)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \binom{k}{0} \frac{t^k}{k!} \lambda^k & \binom{k}{1} \frac{t^k}{k!} \lambda^{k-1} & \dots & \binom{k}{n} \frac{t^k}{k!} \lambda^{k-n} \\ & \binom{k}{0} \frac{t^k}{k!} \lambda^k & \dots & \binom{k}{n-1} \frac{t^k}{k!} \lambda^{k-n+1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \binom{k}{0} \frac{t^k}{k!} \lambda^k \end{pmatrix}$$

התא  $j$ -ה' בשורה הראשונה של המטריצה המתקבלת הוא

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{j-1} \frac{t^k}{k!} \lambda^{k-j+1} = t^{j-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{k-j+1} \lambda^{k-j+1}}{(j-1)!(k-j+1)!} = e^{t\lambda} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!}$$

□

על-ידי הצבה של הפיתוח הזה בכל אחד מהתאים במטריצה הנוסחה נובעת.

נניח ש- $A = PJ_\lambda P^{-1}$  כלומר  $\begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$  כאשר  $\{v_i\}_{i=1}^n$  הוקטורים העצמיים המוכללים שמתאימים לבלוק ז'ורדן עבור  $J_\lambda$ , כלומר מקיימים  $Av_i = \lambda v_i + v_{i-1}$ ,  $Av_1 = \lambda v_1$  לכל  $2 \leq i \leq m$  אז מהחשבון הקודם נובע לכל  $i$

$$\begin{aligned} \exp(tA)v_i &= P \exp(tJ_\lambda)P^{-1}v_i \\ &= P \exp(tJ_\lambda)e_i \\ &= e^{\lambda t}P \left( \frac{t^{i-1}}{(i-1)!}, \frac{t^{i-2}}{(i-2)!}, \dots, \frac{t^{i-i}}{(i-i)!}, 0, \dots, 0 \right)^T \\ &= e^{\lambda t} \cdot \left( \frac{t^{i-1}}{(i-1)!}v_1 + \frac{t^{i-2}}{(i-2)!}v_2 + \dots + \frac{t^{i-i}}{(i-i)!}v_i \right) \end{aligned}$$

לכל וקטור שהוא צירוף לינארי של הוקטורים  $v_1, \dots, v_n$  כשמופעלים על  $\exp(tA)$  הוא צירוף לינארי של הוקטורים העצמיים המוכללים.

קיבלנו אלגוריתם לחישוב של  $\exp(tA)(x_0)$  לכל בתנאי שאנחנו יודעים לז'ורדן את  $A$  עבור  $x_0 = \sum \alpha_i v_i$ .  
אנחנו מתעניינים ב- $A$  ממשית ובפתרונות ל- $x(t) = A(x)$  עם תנאי התחלה ממשיים ובפרט אנחנו יודעים ש- $x(t) = \exp(tA)(x) \in \mathbb{R}^n$  לכל  $x \in \mathbb{R}^n$  אם  $x \in \mathbb{R}^n$  מהיות  $A$  מטריצה ממשית, אם  $Av = \lambda v$  ו- $\lambda \notin \mathbb{R}$  אז  $\bar{\lambda} \notin \mathbb{R}$  וגם  $\bar{\lambda} \bar{v} = A\bar{v}$  כלומר  $\lambda$  ערך עצמי אם ורק אם  $\bar{\lambda}$  הוא ערך עצמי ואז  $\bar{v} \in \text{Span}\{v, \bar{v}\}$  ואם נפעיל עליו את  $\exp(tA)$  אז ממה שראינו אפשר לתת אותו על-ידי צירוף לינארי של  $v, \bar{v}$ .  
באותו אופן,  $\{v, \bar{v}\} \in \text{Span}\{v, \bar{v}\}$  ויתרה מזאת  $\text{Span}_{\mathbb{C}}\{v, \bar{v}\} = \text{Span}_{\mathbb{C}}\{Im v, Re v\}$  ולכן כל וקטור  $x_0$  ניתן להצגה כצירוף לינארי עם מקדמים מרוכבים של הוקטורים העצמיים המוכללים של  $A$  ולכן אם נכתוב את  $x_0 = \sum \alpha_i v_i$  כאשר  $\{v_i\}$  הם הוקטורים העצמיים המוכללים נקבל

$$\exp(tA)v = \sum \alpha_i \exp(tA)v_i$$

נניח של- $A$  יש ערך עצמי מרוכב  $\lambda = \mu + i\nu$  (כאשר  $\nu \neq 0$ ) ויהי וקטור עצמי שמתאים לו. אז מנוסחת אוילר

$$e^{\lambda t}(v + iw) = e^{\mu t}(\cos(\nu t)v - \sin(\nu t)w) + ie^{\mu t}(\sin(\nu t)v + \cos(\nu t)w)$$

כל פתרון ממשי שהוא צירוף לינארי מהצורה  $\alpha e^{\lambda t}(v + iw) + \beta e^{\bar{\lambda} t}(v - iw)$  ניתן לכתיבה על-ידי

$$ae^{\mu t}(\cos(\nu t)v - \sin(\nu t)w) + be^{\mu t}(\sin(\nu t)v + \cos(\nu t)w)$$

באופן שקול, בכתיב מטריציוני

$$e^{\mu t} \begin{pmatrix} | & | \\ v & w \\ | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\nu t) & \sin(\nu t) \\ -\sin(\nu t) & \cos(\nu t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

אם  $\mu = 0$  אז תנאי ההתחלה הוא בדיוק  $x_0 = av + bw$  והנורמה נשארת חסומה. אם  $\mu > 0$ , ככל שהזמן מתקדם קדימה נקבל ספירלה מתרחבת, ואם  $\mu < 0$  ככל שהזמן מתקדם נקבל ספירלה מתכנסת פנימה.

קרי, החלק המרוכב עושה סיבוב והחלק הממשי מחליט אם הפתרון גדל או דועך. נוכיח ש- $v, w$  (החלק הממשי והמדומה של הוקטור העצמי) הם בלתי-תלויים מעל  $\mathbb{R}$ .  
נניח בשלילה שהם תלויים. מאחר שהם וקטורים ממשיים, קיים  $t \in \mathbb{R}$  כך ש- $w = tv$ , ולכן הוקטור העצמי הוא:

$$v + iw = v + itv = (1 + it)v$$

כלומר הוקטור העצמי הוא כפולה מרוכבת של וקטור ממשי  $v$ . מאחר ש- $A(v + iw) = \lambda(v + iw)$  נקבל:

$$A((1 + it)v) = \lambda(1 + it)v \implies (1 + it)Av = \lambda(1 + it)v \implies Av = \lambda v$$

אבל  $A$  מטריצה ממשית וגם  $v$  וקטור ממשי, ולכן חייב להיות ממשי. זה עומד בסתירה לכך ש- $\lambda$  אינו ממשי (שכן  $\nu \neq 0$ ) ו- $v \neq 0$ .

## 1.5 משוואות לינאריות לא הומוגניות

באופן כללי אנחנו לא יודעים איך לפתור משוואות לינאריות הומוגניות ללא מקדמים קבועים אבל בתנאים מסויימים אנחנו כן יודעים (דוגמה בתרגיל הבית).  
נניח שיש לנו

$$\begin{cases} (\star) & x'(t) = A(t)x(t) \\ (\star\star) & x'(t) = A(t)x(t) + g(t) \end{cases}$$

כאשר אנחנו יודעים לפתור את  $(\star)$  ו- $(\star\star)$  זו משוואה לא הומוגנית כאשר  $A(t)$  היא  $n \times n$ .  
יהיו  $\{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\}$  בסיס למרחב הפתרונות של  $(\star)$ .

הרעיון הוא לכתוב פיתרון כללי למשוואה לא הומוגנית  $(\star \star)$  כצירוף לינארי של ה- $x_i(t)$  עם מקדמים שמשתנים בזמן, כלומר נכתוב את  $y = \sum_{j=1}^n \alpha_j(t) x_j(t)$  כפתרון ל- $(\star \star)$  עם מקדמים שתלויים בזמן (אם זה היה  $\alpha_j$  בלי תלות ב- $t$  זה היה הפיתרון הכללי עבור משוואה הומוגנית). נסמן ב- $\pi(t)$  את מטריצת הפתרונות היסודית (היא הפיכה כי היא בסיס למרחב הפתרונות)

$$\pi(t) = \begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ x_1(t) & x_2(t) & \dots & x_n(t) \\ | & | & \dots & | \end{pmatrix}$$

נשים לב ש- $\sum_{j=1}^n \alpha_j(t) x_j(t) = \pi(t) \alpha(t)$  כאשר  $\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_n(t) \end{pmatrix}$ .

אם  $y(t) = \pi(t) \alpha(t)$  פותר את  $(\star \star)$  אז  $y(0) = \pi(0) \alpha(0)$  אז  $y'(t) = \pi'(t) \alpha(t) + \pi(t) \alpha'(t)$  אבל מצד שני מכך ש- $\pi'$  מקיימת את המשוואה ההומוגנית

$$y'(t) = (\pi(t) \alpha(t))' = \pi'(t) \alpha(t) + \pi(t) \alpha'(t) = A(t) \pi(t) \alpha(t) + \pi(t) \alpha'(t)$$

כלומר

$$\cancel{A(t) \pi(t) \alpha(t)} + g(t) = y'(t) = \underbrace{A(t) \pi(t) \alpha(t)}_{=y(t)} + \pi(t) \alpha'(t) = \cancel{A(t) \pi(t) \alpha(t)} + \pi(t) \alpha'(t)$$

לכן קיבלנו שתנאי הכרחי על  $\alpha$  היינו

$$\pi(t) \alpha'(t) = g(t) \implies \alpha'(t) = \pi(t)^{-1} g(t)$$

אם כך, מהמשפט היסודי נקבל את התנאי ההכרחי הבא וצריך להראות שהוא אכן פיתרון

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1} g(s) ds$$

### משפט 1.30

יהיו  $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  רציפה ו- $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  רציפה כאשר  $I \subseteq \mathbb{R}$  קטע ונסמן ב- $\pi(t)$  את מטריצת הפתרונות היסודית למשוואה  $x'(t) = A(t)x(t)$ . אזי פונקציה  $y(t) = \pi(t) \left( \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1} g(s) ds \right)$  פותרת את המשוואה  $y'(t) = A(t)y(t) + g(t)$  עם תנאי ההתחלה  $y(0) = \pi(0) \alpha(0)$ .

הוכחה:

$$\begin{aligned} y'(t) &= \left[ \pi(t) \left( \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1} g(s) ds \right) \right]' \\ &= \pi'(t) \left( \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1} g(s) ds \right) + \pi(t) \pi(t)^{-1} g(t) \\ &= A(t) \pi(t) \left( \alpha(0) + \int_0^t \pi(s)^{-1} g(s) ds \right) + g(t) \\ &= A(t) y(t) + g(t) \end{aligned}$$

□

### עקרון דוהמל

### מסקנה 1.31

נניח שמטריצת המקדמים קבועה כלומר  $A(t) = A$  ו- $x_i(0) = e_i$  (הבסיס הסטנדרטי ב-0) אז  $\pi(t) = e^{tA}$  ו- $\pi(0) = \text{Id}$  ונקבל

$$y(t) = e^{tA} y_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} g(s) ds$$

### 1.6 התנהגות לוקלית, התנהגות גלובלית ויציבות

לאורך פרק זה יש לנו  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  גזירה ברציפות והסימון הרגיל של  $x_p(t) = \varphi_t(p) = \Phi(p, t)$  היא הנקודה בה נמצא הפיתרון של  $x' = F(x)$  עם תנאי התחלה  $p$  לאחר זמן  $t$ .

### משפט 1.32

תהיי  $p \in U$  ונניח ש- $F(p) \neq 0$ .

אזי קיימות קבוצות פתוחות  $U_0 \subseteq U$  ו- $V \subseteq \mathbb{R}^n$  כך ש- $0 \in V \subseteq \mathbb{R}^n$  ודיפאומורפיזם גזיר ברציפות  $\alpha : U_1 \rightarrow V$  ו- $\delta > 0$  כך ש- $\alpha(p) = 0$  ולכל  $x \in U_0$  ו- $t \in (-\delta, \delta)$  מתקיים  $\varphi_t(x) \in U_1$  ו- $\alpha(\varphi_t(x)) = \alpha(x) + (t, 0, \dots, 0)$ .



הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נניח  $p = 0$  ונתבונן בנגזרות החלקיות של  $\Phi(t, x)$  בראשית  $\frac{\partial \Phi}{\partial t}|_{(0,0)} = F(0) \neq 0$ ,  $\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}|_{(0,0)} = e_i$  היות ש- $F(0) \neq 0$  ניתן לבחור  $n - 1$  איברים מאיברי  $(e_1, \dots, e_n)$  ונסמנם  $e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-1}}$  כך שבלי הגבלת הכלליות  $\{F(0), e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-1}}\}$  זה בסיס. נגדיר העתקה  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  סביבת 0 ב- $\mathbb{R}^n$  על ידי  $\beta(t, x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \varphi_t(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)$ . ממשפט הפונקציה ההפוכה יש סביבה  $p \in U_1$  וסביבה  $0 \in V$  כך ש- $\beta : V \rightarrow U_1$  היא דיפאומורפיזם גזיר ברציפות ונגדיר  $\alpha = \beta^{-1}$ . קיימת סביבה פתוחה  $U_0 \subseteq U_1$  ו- $p \in U_0$  כך שלכל  $x \in U_0$  ו- $t \in (-\delta, \delta)$  מתקיים  $\varphi_t(x) \in U_1$ . נשאר לבדוק: יהי  $x \in U_0$  אז יש  $s, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$  כך ש- $x = \beta(s, y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$  כלומר  $x = \varphi_s(y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$  ואז עבור  $|t| < \delta$  מתקיים  $\varphi_t(x) \in U_1$  ולכן  $\alpha(\varphi_t(x)) = \alpha(\varphi_t(\varphi_s(y_1, \dots, y_{n-1}, 0))) = \alpha(\varphi_{t+s}(y_1, \dots, y_{n-1}, 0)) = \alpha(\beta(t+s, y_1, \dots, y_{n-1})) = (s, y_1, \dots, y_{n-1}) + (t, 0, \dots, 0) = \alpha(x) + (t, 0, \dots, 0)$

□

## נקודת שיווי משקל

### 1.33 הגדרה

הנקודה  $p \in U$  נקראת נקודת שיווי משקל (לפעמיים נקודת שבת) אם  $F(p) = 0$ .

## נקודת שיווי משקל יציבה

### 1.34 הגדרה

נקודת שיווי משקל  $p$  תקרא נקודת שיווי משקל יציבה אם לכל  $\varepsilon > 0$  יש  $\delta > 0$  כך שלכל  $q \in B_\delta(p)$  ולכל  $t > 0$  מתקיים  $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ .

## נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית

### 1.35 הגדרה

נקודת שיווי משקל  $p$  תקרא נקודת שיווי משקל אסימפטוטית אם יציבה וקיימת גם  $\eta > 0$  כך שלכל  $q \in B_\eta(p)$  מתקיים  $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$ .

## הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית

### 1.36 משפט

תהי  $p \in U$  נקודת שיווי משקל של  $F$  ונניח שלכל ערך עצמי של  $DF(p)$  יש חלק ממשי שלילי. אזי  $p$  יציבה אסימפטוטית.

### למה 1.37

תהי  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  מטריצה עם קבוצת ערכים עצמיים  $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$  ונניח  $\max_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{Re}(\lambda) < 0$ . אזי לכל  $0 < \alpha < \min_{\lambda \in \Lambda} |\operatorname{Re}(\lambda)|$  יש  $C > 0$  כך שלכל  $t \geq 0$  מתקיים  $\|\exp(tA)\|_{op} \leq Ce^{-t\alpha}$  ובפרט  $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(tA) = 0$ .

הוכחה: נניח ש- $J = PAP^{-1}$  צורת ז'ורדן של  $A$  ואז  $J = J + \alpha I$  היא מטריצה בצורת ז'ורדן שלכל ערכייה העצמיים חלק ממשי שלילי ולכן עבור  $t \geq 0$  הערכים של  $\exp(t(J + \alpha I))$  הם פולינומים ב- $t$  כפול אקספוננט עם מעריך שלילי ב- $t$  ולכן קיים  $C' > 0$  כך שמתקיים

$$\sup_{t \geq 0} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \leq C'$$

לכן

$$\begin{aligned} \|\exp(tA)\|_{op} &= \|\exp(tP^{-1}JP)\|_{op} \\ &\leq \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ + t\alpha I - t\alpha I)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \cdot e^{-t\alpha} \\ &\leq C' \cdot e^{-t\alpha} \end{aligned}$$

□

כאשר המעבר האחרון נובע מתכונת החילופיות של האקספוננט למטריצות מתחלפות.

סוף הרצאה 9 - 11/05

הוכחה של משפט 1.36, הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית: כזכור לכל  $t \in J_p^*$ ,  $\varphi_t(x)$  גזירה ב- $p$  ו- $M = D\varphi_t(p)$  מקיימת

$$(*) \quad \frac{d}{dt}[D\varphi_t(p)] = DF(\varphi_t(p))D\varphi_t(p), \quad D\varphi_0(p) = \operatorname{Id}$$

אבל  $p$  נקודת שיווי משקל כלומר  $F(p) = 0$  ולכן  $\varphi_t(p) = p$  ולכן  $t$  ומכאן נובע ש- $(*)$  היא משוואה לינארית במקדמים קבועים ולכן  $M' = DF(p)M$

$$D\varphi_t(p) = \exp(tDF(p))$$

בפרט מלמה 1.37 נובע ש- $\|\exp(tDF(p))\|_{op} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$  ולכן יש  $T > 0$  שעבורו

$$\|\exp(TDF(p))\|_{op} < \frac{1}{4}$$

יהי  $\varepsilon > 0$  וקיימת  $\delta > 0$  כך שלכל  $q \in B_\delta(p)$  ולכל  $t \in [0, T]$  מתקיים  $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$  (מתלות רציפה בתנאי ההתחלה). בנוסף מהקירוב הלינארי

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + D\varphi_T(p)(q - p) + o(\|q - p\|)$$

ולכן על-ידי הקטנה של  $\delta$  אם צריך נוכל להניח שהמחבר  $o(p - q)$  לא עולה על  $\frac{1}{4}\|p - q\|_{op}$ , כלומר  $\|\varphi_T(q) - \varphi_T(p)\|_{op} \leq \frac{\|q - p\|_{op}}{2}$ .  
בפרט  $\varphi_T(q) \in B_\delta(p)$  שכן  $\varphi_T(p) = p$  ושוב לכל  $0 \leq t \leq T$  מתקיים  $\varphi_{T+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$  (שוב מהרציפות בתנאי ההתחלה) ואם נחזור על התהליך נקבל

$$\|\varphi_{kT}(q) - p\|_{op} \leq 2^{-k}\|q - p\|$$

לכל  $t \in [0, T]$  ולכל  $k \in \mathbb{N}$  מתקיים  $\varphi_{kT+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$  כלומר לכל  $t > 0$  מתקיים  $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$  וזו בידיקו ההגדרה של יציבות.  
נשאר להראות יציבות אסימפטוטית: קיבלנו ש- $\varphi_{kT}(q) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} p$  לכל  $q \in B_\delta(p)$  ושוב מתלות רציפה בתנאי ההתחלה נקבל  $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$  שכן לכל  $\varepsilon' > 0$  יש  $\delta' > 0$  כך שאם  $y \in B_{\delta'}(p)$  אז לכל  $t \in [0, T]$  נקבל  $\|\varphi_t(y) - p\|_{op} < \varepsilon'$ .  
□

## פונקציית ליאפונוב

### 1.38 הגדרה

יהי  $B \subseteq \mathbb{R}^n$  כדור סביב  $p$ . נאמר ש- $L : B \rightarrow \mathbb{R}$  גזירה ברציפות היא פונקציית ליאפונוב ל- $F$  ב- $p$  אם  $\langle \nabla L(x), F(x) \rangle \leq 0$  לכל  $x \in B$  ול- $L$  יש מינימום חזק ב- $p$  (כלומר  $L(p) \leq L(x)$  עם שוויון אם ורק אם  $x = p$ ).  
נאמר ש- $L$  היא פונקציית ליאפונוב חזקה אם היא פונקציית ליאפונוב ומתקיים בנוסף  $\langle \nabla L(x), F(x) \rangle < 0$  לכל  $x \neq p$ .

## משפט ליאפונוב

### 1.39 משפט

תהי  $x_0 \in U$  נקודת שיווי משקל של  $F$ . אם ל- $F$  יש פונקציית ליאפונוב ב- $x_0$  אז  $x_0$  יציבה ואם ל- $F$  יש פונקציית ליאפונוב חזקה ב- $x_0$  אז  $x_0$  יציבה אסימפטוטית.

סוף הרצאה 10 – 12/05

הוכחה: אם יש פונקציית ליאפונוב אז יש יציבות: יהי  $r > 0$  ו- $L \in C^1(B(x_0, r))$  פונקציית ליאפונוב.

נשים לב שלכל  $p \in B(x_0, r)$  הפונקציה  $L(x_p(t))$  מונוטונית יורדת לכל זמן שהיא מוגדרת מהגדרת פונקציית ליאפונוב ומכלל השרשרת

$$\frac{d}{dt}(L(x_p(t))) = \langle \nabla L(x_p(t)), x'_p(t) \rangle = \langle \nabla L(x_p(t)), F(x_p(t)) \rangle \leq 0$$

יהי  $\varepsilon > 0$ . מכך ש- $x_0$  מינימום חזק של  $L$  נקבל  $L(x_0) < \min_{x \in \partial B(x_0, \varepsilon)} L(x)$  ולכן קיימת  $\delta > 0$  כך ש- $L(x) < \min_{x \in \partial B(x_0, \varepsilon)} L(x)$  כעת, אם  $p \in B(x_0, \delta)$  ויש  $t > 0$  שעבורו  $x_p(t) \notin B(x_0, \varepsilon)$  אז קיים  $t_*$  כך ש- $x_p(t_*) \in \partial B(x_0, \varepsilon)$  ו- $L(x_p(t_*)) > L(x_p(0)) = L(p)$  בסתירה למונוטוניות.  
אם יש ליאפונוב חזקה אז יש יציבות אסימפטוטית: יהי  $0 < R < r$  ומהיציבות לעיל יש  $\eta > 0$  כך שלכל  $p \in B(x_0, \eta)$  ולכל  $t \geq 0$  מתקיים ש- $x_p(t) \in B(x_0, R)$ .  
נרצה להראות שלכל  $p \in B(x_0, \eta)$  מתקיים ש- $x_p(t) \rightarrow x_0$  שכן אם לא יש  $p \in B(x_0, \eta)$  ויש  $\varepsilon > 0$  וסדרת זמנים  $t_k \rightarrow \infty$  כך ש- $d(x_p(t_k), x_0) \geq \varepsilon$  ונסמן

$$M := \max_{x \in B(x_0, R)} \|F(x)\|, \quad C := \max\left\{ \langle \nabla L(x), F(x) \rangle \mid \frac{\varepsilon}{2} \leq \|x - x_0\| \leq R \right\} < 0$$

נשים לב שאם  $\|x_p(t) - x_0\| > \varepsilon$  אז לכל  $t \leq s \leq t + \frac{\varepsilon}{2M}$  מתקיים ש- $\frac{\varepsilon}{2} \leq \|x_p(s) - x_0\|$  מאי-שוויון המשולש ההפוך שכן

$$\|x_p(s) - x_p(t)\| = \left\| \int_t^s x'_p(u) du \right\| \leq M|s - t| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

כעת נניח על-ידי צמצום לתת-סדרה (אם צריך) ש- $|t_{k+1} - t_k| < \frac{\varepsilon}{2M}$  ונחשב את  $L(x_p(t))$  עבור  $t > 0$

$$\begin{aligned} L(x_p(t)) &= L(p) + \int_0^t (L(x_p(s)))' ds \\ &= L(p) + \int_0^t \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n \int_{t_k}^{t_{k+1}} \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n \int_{t_k}^{t_k + \frac{\varepsilon}{2M}} \langle \nabla L(x_p(s)), F(x_p(s)) \rangle ds \\ &\leq L(p) + \sum_{k=1}^n C \cdot \frac{\varepsilon}{2M} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} -\infty \end{aligned}$$

אבל זאת סתירה כי  $L$  חסומה ב- $\overline{B_R(x_0)}$  לכן לכל  $p \in B_\eta(x_0)$  מתקיים  $x_p(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} x_0$ .  
□

נניח ש- $H : U \rightarrow \mathbb{R}$  גזירה ברציפות (כרגיל  $U$  פתוחה) ו- $J$  מטריצה אנטי-סימטרית ( $J^t = -J$ ) ונגדיר  $F = J(\nabla H)$  אז  $H$  פונקציית ליאפונוב (לא חזקה) עבור  $F$  היכן ש- $x_0$  היא נקודת מינימום של  $H$  (ברור שאם  $x_0$  מינימום של  $H$  אז  $F(x_0) = 0$ ) ו- $H$  פונקציית ליאפונוב שכן

$$\langle F, \nabla H \rangle = \langle J \nabla H, \nabla H \rangle = \langle \nabla H, J^t \nabla H \rangle = \langle J^t \nabla H, \nabla H \rangle = -\langle J \nabla H, \nabla H \rangle = 0$$

אז  $x_0$  נקודת שיווי משקל יציבה. האם ייתכן ש- $x_0$  נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית? לא ייתכן דבר כזה שכן  $\langle F, \nabla H \rangle = 0$  אומר ש- $H$  נשארת קבועה לאורך המסלולים (זה בעצם קווי גובה) למה? כי

$$\frac{d}{dt} H(x_p(t)) = \langle \nabla H, x'_p(t) \rangle = \langle \nabla H, F \rangle = 0$$

## החוק השני של ניוטון

נניח שהכוח משמר כלומר  $-\nabla V = f = ma$  (עבור  $f$  כוח,  $m$  מסה ו- $a$  תאוצה) ונסמן את המיקום ב- $q$  והתנע זה  $p = \frac{d}{dt}mq$ . בהינתן  $N$  גופים תלת-מימדיים יש  $3N$  קורדינאטות מיקומים ו- $3N$  קורדינאטות של תנעים  $x = (q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N})$  ונרצה לתאר את זה כפונקציה של זמן

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} p_i &= (-\nabla V)_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i} \\ \frac{d}{dt} q_i &= \frac{p_i}{m} = \frac{\partial}{\partial p_i} \left( \frac{p_i^2}{2m} \right) \end{aligned}$$

$$H = \underbrace{\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{V(q_1, \dots, q_{3N})}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}}$$

ומגזירה נקבל

$$\frac{d}{dt} p_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{d}{dt} q_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_{3N} \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{3N} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & I_{3N} \\ -I_{3N} & 0 \end{pmatrix}}_{6N \times 6N} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q_1} \\ \frac{\partial H}{\partial q_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial q_{3N}} \\ \frac{\partial H}{\partial p_1} \\ \frac{\partial H}{\partial p_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial p_{3N}} \end{pmatrix}$$

המסקנה היא שתחת כוח משמר (שתלוי רק במיקום) נובע ש- $H$  קבועה לאורך המסילות (כלומר בזמן המערכת) ולכן  $H$  נקראת האנרגיה של המערכת (או ההמילטוניאן).

תהי  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  שדה גזיר ברציפות ו- $x_0 \in U$  נקודת שיווי משקל. אם ל- $DF(x_0)$  יש ערך עצמי עם חלק ממשי חיובי אז  $x_0$  לא יציבה.

הוכחה: נוכיח את המשפט תחת ההנחה שלכל הערכים העצמיים של  $A := DF(x_0)$  יש חלק ממשי שאינו אפס כלומר אין ל- $A$  ערכים עצמיים עם חלק ממשי אפס. נסמן  $H_+$  יהיה תת-המרחב של  $\mathbb{R}^n$  הנפרש על-ידי הוקטורים העצמיים (המוכללים אם צריך) עם ערך עצמי של חלק ממשי גדול מאפס ו- $H_-$  עם ערך עצמי של חלק ממשי קטן מאפס ומההנחה  $\mathbb{R}^n = H_+ \oplus H_-$  ונסמן ב- $\pi_\pm$  את ההטלות המתאימות לסכום הישר (ההנחה של המשפט אומר ש- $\{0\} \neq H_+$ ).

סוף הרצאה 11 – 18/05

נניח ש- $x_0 = 0$  ונניח בשלילה ש- $0$  יציבה, כלומר: לכל  $\varepsilon > 0$  יש  $\delta > 0$  כך שאם  $p \in B_\delta(0)$  אז  $x_p(t) \in B_\varepsilon(0)$  נגדיר את הפונקציה  $g(x) = F(x) - Ax$  כך שיתקיים

$$x'(t) = F(x(t)) = Ax(t) + g(x(t))$$

לכן ניתן לכתוב את הפתרון למשוואה באופן הבא (עקרון דוהמל)

$$(\star \star) \quad x(t) = e^{tA}x(0) + \int_0^t e^{(t-s)A}g(x(s)) \, ds$$

להמשך ההוכחה אנחנו צריכים שתי למות

#### למה 1.41

קיים  $R > 0$  כך שאם  $x : [0, \infty) \rightarrow B_R(0)$  פותרת את המשוואה  $x'(t) = F(x(t))$  אז

$$x(t) = e^{tA}\pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_-g(x(s)) \, ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A}\pi_+g(x(s)) \, ds$$

הוכחה של למה 1.41: מכך ש- $F(0) = 0$  מפיתוח טיילור נקבל

$$g(x) = F(x) - Ax = o(\|x\|)$$

בפרט, מהגדרת הגבול יש  $R > 0$  כך שלכל  $x \in B_R(0)$  מתקיים  $\|g(x)\| \leq \|x\|$ . (♥)

נכפול את  $(\star \star)$  ב- $e^{-tA}$  ונפעיל את  $\pi_+$  ונקבל (כי  $\pi_+$  זו העתקה לינארית וגם אינטגרל הוא לינארי ובנוסף מתקיים  $\pi_\pm e^{tA} = e^{tA}\pi_\pm$ )

$$(\star \star \star) \quad e^{-tA}\pi_+x(t) = \pi_+(x(0)) + \int_0^t e^{-sA}\pi_+g(x(s)) \, ds \implies \pi_+(x(0)) = - \int_0^\infty e^{-sA}\pi_+g(x(s)) \, ds$$

נרצה להראות את החץ מימין: קיים קבוע  $C > 0$  המקיים  $\|\pi_\pm\|_{op} \leq C$  כך שאם  $\lambda \in \text{ערך עצמי של } A$  אז  $0 < \mu < \min\{|\operatorname{Re}(\lambda)|\}$  נקבל

$$\forall t > 0, \quad \|e^{tA}\pi_-x\| \leq Ce^{-\mu t}\|x\|$$

$$\forall t < 0, \quad \|e^{tA}\pi_+x\| \leq Ce^{-\mu|t|}\|x\|$$

לכן אם  $x(t) \in B_r(0)$  לכל  $t < 0$  נובע

$$\|e^{-tA}\pi_+(x(t))\| \leq C^2e^{-\mu t}R \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

יחד עם (♥) לכל  $s > 0$  נקבל

$$\|e^{-sA}\pi_+g(x(s))\| \leq C^2e^{-s\mu}R$$

וזה אינטגרביילי ב- $s$  ולכן ניתן ל- $t$  לשאוף לאינסוף ב- $(\star \star \star)$  ונקבל את ההצדקה לחץ מימין.

בחזרה ל- $(\star \star)$  עם הפיצול לסכום ישר וממה שמצאנו לעיל נקבל

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{tA}\pi_+(x(0)) + e^{tA}\pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_-g(x(s)) \, ds + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_+g(x(s)) \, ds \\ &= e^{tA}\pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_-g(x(s)) \, ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A}\pi_+g(x(s)) \, ds \end{aligned}$$

□

#### למה 1.42

קיים  $R > R_0 > 0$  מהלמה הקודמת כך שאם  $x, y : [0, \infty) \rightarrow B_{R_0}(0)$  הם פתרונות ל- $x' = F(x)$  כך ש- $\pi_-(x(0)) = \pi_-(y(0))$  אז  $x(t) = y(t)$  לכל  $t$ .

הוכחה של למה 1.42: לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $R > R_0 > 0$  מהלמה הקודמת כך שלכל  $z_1, z_2 \in B_{R_0}(0)$  מתקיים

$$\|g(z_1) - g(z_2)\| < \varepsilon \|z_1 - z_2\|$$

הערה

זה נובע מהגזירות ברציפות של  $F$ : כי לכל  $z_1, z_2$  מתקיים

$$F(z_2) = F(z_1) + DF(z_1)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|) = F(z_1) + A(z_2 - z_1) + (DF(z_1) - A)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|)$$

לכן

$$g(z_2) - g(z_1) = (DF(z_1) - A)(z_2 - z_1) + o(\|z_2 - z_1\|)$$

סוף הרצאה 12 – 19/05

נקבע  $R_0 = R_0(\varepsilon)$  עבור  $\varepsilon = \varepsilon(C, \mu)$  עבור  $\mu$  מהלמה הקודמת שנגדיר בהמשך.

נניח ש- $x, y$  פתרונות עם  $\pi_-(y(0)) = \pi_-(x(0))$  כך ש- $x \neq y$  ל- $t > 0$  ו- $x(t), y(t) \in B_{R_0}(0)$  ונסמן

$$d = \sup_{t \in [0, \infty)} \|x(t) - y(t)\|$$

היות ש- $R > R_0$  ו- $x(t), y(t) \in B_R(0)$  ל- $t > 0$  המסקנה של הלמה הקודמת נכונה עבורם ולכן

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &= \left\| \int_0^t e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s)) - g(y(s))) \, ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s)) - g(y(s))) \, ds \right\| \\ &\leq \int_0^t \|e^{(t-s)A} \pi_-(g(x(s)) - g(y(s)))\| \, ds + \int_t^\infty \|e^{(t-s)A} \pi_+(g(x(s)) - g(y(s)))\| \, ds \\ &\leq \int_0^t C e^{-(t-s)\mu} \|g(x(s)) - g(y(s))\| \, ds + \int_t^\infty C e^{(t-s)\mu} \|g(x(s)) - g(y(s))\| \, ds \\ &\leq \varepsilon \int_0^t C e^{-(t-s)\mu} \|x(s) - y(s)\| \, ds + \varepsilon \int_t^\infty C e^{(t-s)\mu} \|x(s) - y(s)\| \, ds \\ &\leq 2\varepsilon C d \left( \int_0^t e^{-s\mu} \, ds + \int_t^\infty e^{-s\mu} \, ds \right) \\ &= 2\varepsilon C d \int_0^\infty e^{-s\mu} \, ds \\ &= \frac{2\varepsilon C d}{\mu} \end{aligned}$$

כאשר אי-השוויון השני נובע מהלמה הקודמת.

אז נבחר  $\varepsilon = \frac{\mu}{4C}$  ונקבל לעיל  $\frac{d}{2}$  אבל זו סתירה כי זה אומר ש- $d = 0$  (נזכר ש- $d = \|x(t) - y(t)\|$ ).

נבחין שההוכחה של למה 1.42 מראה שיציבות היא בלתי אפשרית.

שכן, אם  $x_0$  נקודה יציבה אז קיימת  $\eta > 0$  כך שלכל  $p \in B_\eta(0)$  מתקיים  $x_p(t) \in B_{R_0}(0)$  לכל  $t > 0$ .

בפרט, קיימים  $x \neq y$  כמו בלמה עם  $\pi_-(x) = \pi_-(y)$  ולכן  $x(0) = y(0)$ .

## 2 מערכות שטורם-ליוביל

### 2.1 מוטיבציה קצרה

מה המשוואה שמתארת את התזוזה של מיתר? היא נתונה על-ידי  $u = (x, t)$  ומתקיים

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$c$  הוא קבוע פיזיקלי ועבורנו הוא 1.

נניח שניתן לכתוב פתרון  $u$  בצורה  $u(x, t) = \varphi(x)\psi(t)$  אז

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \varphi(x)\psi''(t) & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \varphi''(x)\psi(t) \\ \Rightarrow \varphi(x)\psi''(t) &= \varphi''(x)\psi(t) & \Leftrightarrow \frac{\psi''(t)}{\psi(t)} &= \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = \lambda \end{aligned}$$

כלומר  $\psi''(t) = \lambda\psi(t)$  וגם  $\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$ .

מה התנאים הטבעיים שהמיתר מספר לנו?

$$\forall t, u(0, t) = u(\pi, t) = 0$$

אז

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

התנאי שלנו של  $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$  זה לא תנאי התחלתי זה תנאי שפה.

אז אם נסתכל על המערכת  $\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$  אז עבור  $\lambda > 0$  הפתרונות הם צירוף לינארי של  $e^{\pm\sqrt{\lambda}x}$  אבל זה כמו כן לא ייתכן,  $\lambda = 0$  זה פיתרון טריוויאלי ואם  $\lambda < 0$  נסמן  $\lambda = -m^2$  ונקבל

$$\varphi(x) = A_m \cos(mx) + B_m \sin(mx)$$

אבל  $\varphi(0) = 0$  ולכן  $A_m = 0$  אבל גם  $\varphi(\pi) = 0$  אז  $m \in \mathbb{Z}$  ולכן  $\varphi_m(x) = B_m \sin(mx)$ .

### 2.2 משוואות עם תנאי שפה

#### מערכת שטורם ליוביל

#### הגדרה 2.1

יהי  $\mathbb{R} \supseteq [a, b]$  קטע ויהיו  $p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  גזירות ברציפות. המשוואה

$$\frac{d}{dt} \left[ p(t) \frac{d}{dt} u(t) \right] + q(t)u(t) = 0$$

נקראת משוואת שטורם-ליוביל (S-L).

נאמר שהיא רגולרית אם  $p(t) > 0$  לכל  $t \in [a, b]$  ואנחנו נתבונן רק במשוואות רגולריות.

נוסיף למשוואה תנאי שפה – כלומר תנאים על  $u$  בנקודות  $a, b$ , למשל

1. תנאי דיריכלה –  $u(a) = 0 = u(b)$

2. תנאי דיריכלה מוכלל –  $u(a) = A, u(b) = B$

3. תנאי נוימן –  $u'(a) = 0 = u'(b)$

4. תנאי נוימן מוכלל –  $u'(a) = A, u'(b) = B$

5. מעורבב –  $u(a) = A, u'(b) = B$

6. מחזוריים –  $u(a) = u(b), u'(a) = u'(b)$

משוואת S-L עם תנאי שפה נקראת מערכת  $S - L$ .

ראינו שלמשוואה  $u''(t) + u(t) = 0$  על  $[0, \pi]$  עם  $u(0) = u(\pi) = 0$  יש אינסוף פתרונות (למעשה כל כפולה בסקלר של  $\sin(t)$ ). מצד שני, אותה משוואה עם התנאים  $u(0) = 0, u(\pi) = 1$  אין בכלל פתרון.

עבור משוואות S-L רגולרית הבאים שקולים

1. לכל  $A, B \in \mathbb{R}$  יש פתרון יחיד  $u$  שמקיים  $u(a) = A, u(b) = B$ .
2. הפתרון היחיד עברו תנאי השפה דיריכלה  $u(a) = 0 = u(b)$  הוא פתרון ה-0.

הוכחה: ברור ש-1 גורר את 2. בכיוון השני, יהיו  $A, B \in \mathbb{R}$ .

מרחב הפתרונות למשוואה הוא מרחב לינארי דו-מימדי (זו משוואה לינארית מסדר 2). נתבונן בהעתקה ששולחת פתרון  $u$  לערכים  $\begin{pmatrix} u(a) \\ u(b) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ . זו העתקה לינארית ומההנחה שלנו הגרעין שלה הוא הגרעין הטריוויאלי – וקטור האפס ולכן זו העתקה חד-חד ערכית ועל וזה בידוק מה שרצינו. (הגרעין הוא טריוויאלי ולכן חד-חד ערכית וזו העתקה מ- $\mathbb{R}^2$  ל- $\mathbb{R}^2$  ולכן על).

## הערה

מעשה נתבונן במערכות S-L עם תנאי שפה דיריכלה.

1. יש עוד משוואות דיפרנציאליות חלקיות שפיתרון שלהן בעזרת הפרדת משתנים מוביל למערכת S-L ולא רק משוואת המיתר שלנו.
2. הביטוי במערכת S-L עם תנאי שפה דיריכלה

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) (=0)$$

$$u(a) = 0 = u(b)$$

מגדירה העתקה לינארית (למשל) ממרחב הפונקציות החלקות על  $[a, b]$  עם תנאי השפה לעצמו. לשם הדיון נניח  $p, q$  חלקות ובהקשר הזה מאוד טבעי לשאול על וקטורים עצמיים, כלומר פונקציות  $u$  שמקיימות

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) = \lambda u(t)$$

משוואות המיתר הובילה אותנו למשוואה כזו! משוואות הערכים העצמיים שקולה בעצם למשוואה

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) - \lambda)u(t) = 0$$

נתמקד בפיתרון בעיית הערכים העצמיים עבור מערכת S-L. למעשה, נתבונן בבעיה כללית יותר

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) + \lambda\rho(t))u(t) = 0$$

יש המון מערכות עם התנהגות דומה (דיסקרטיות, רציפות ואחרות)

3. בהקשר הזה, מוטיבציה נוספת מגיעה מכך שההעתקה הלינארית המתוארת על-ידי משוואת S-L מתארת המילטוניאן קוונטי

$$\underbrace{(p(t)u'(t))'}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{q(t)u(t)}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}}$$

והערכים העצמיים הם הגדלים שניתן לקבל במדידת האנרגיה של המערכת

האסטרטגיה שלנו לחקר מערכת S-L: נעביר את הוקטור  $\begin{pmatrix} u(t) \\ p(t)u'(t) \end{pmatrix}$  לקורדינאטות פולאריות, נכתוב עבורן משוואות ונגדיר

$$u(t) = r(t) \sin(\theta(t))$$

$$p(t)u'(t) = r(t) \cos(\theta(t))$$

$u$  מקיימת

$$(p(t)u'(t))' + q(t)u(t) = 0$$

מתקיים

$$\frac{d}{dt}u(t) - \frac{1}{p}(p(t)u'(t)) = 0$$

אז

$$r'(t) \sin(\theta(t)) + r(t) \cos(\theta(t))\theta'(t) - \frac{1}{p(t)}r(t) \cos(\theta(t)) = 0$$

ובנוסף, מהמשוואה

$$r'(t) \cos(\theta(t)) - r(t) \sin(\theta(t))\theta'(t) + q(t)r(t) \sin(\theta(t)) = 0$$

מכאן

$$r'(t) = \left(\frac{1}{p} - q(t)\right)r(t) \cos(\theta(t)) \sin(\theta(t))$$

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

יונתן טוען שהראשונה לא חשובה והשנייה כן – היא לא לינארית אבל היא מסדר ראשון.

נבחין שעבור  $k \in \mathbb{Z}$  מתקיים

$$\theta(t) = \pi k \iff u(t) = 0$$

לכן אם נתרגם  $u(0) = 0$  ל- $\theta(0) = 0$  נקבל ש- $u$  פתרון למערכת המשוואות שלנו עם תנאי שפה דיריכלה אם ורק אם  $\theta(b) = \pi k$  לאיזשהו  $k \in \mathbb{Z}$ .  
נתמקד כרגע במשוואה הבאה עבור מערכת S-L

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

### טענה 2.3

נניח ש- $\theta, \tilde{\theta}$  שתי פונקציות המקיימות

$$\theta'(t) \geq q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

$$\tilde{\theta}'(t) \leq q(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))$$

ונניח בנוסף ש- $\tilde{\theta}(a) \geq \tilde{\theta}(b)$  אזי  $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$  לכל  $t \in [a, b]$ .  
יתרה מזאת, אם  $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$  אז  $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$  לכל  $t \in [a, b]$ .

הוכחה:

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq q(t)(\sin^2(\theta(t)) - \sin^2(\tilde{\theta}(t))) + \frac{1}{p(t)}(\cos^2(\theta(t)) - \cos^2(\tilde{\theta}(t)))$$

ידוע שמתקיים

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y| \implies |\sin^2(x) - \sin^2(y)| = |(\sin(x) + \sin(y))(\sin(x) - \sin(y))| \leq 2|x - y|$$

וזה נכון גם עבור  $\cos$  ולכן

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq q(t)(\sin^2(\theta(t)) - \sin^2(\tilde{\theta}(t))) + \frac{1}{p(t)}(\cos^2(\theta(t)) - \cos^2(\tilde{\theta}(t))) \geq -L|\theta - \tilde{\theta}|$$

עבור  $L > 0$ .

נניח בשלילה שיש  $a < t_1 \leq b$  כך ש- $\theta(t_1) < \tilde{\theta}(t_1)$  ונסמן  $t_0 = \sup\{t \in [a, t_1], \theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)\}$  ואז  $\theta(t_0) = \tilde{\theta}(t_0)$  ולכל  $t \in [t_0, t_1]$  מתקיים  $\theta(t) \leq \tilde{\theta}(t)$  או בקטע הפתוח  $t \in (t_0, t_1]$  מתקיים  $\theta(t) < \tilde{\theta}(t)$ . לכן בקטע  $[t_0, t_1]$  מתקיים

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq L(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

ולכן הפונקציה  $e^{-Lt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$  מונוטונית עולה בקטע  $[t_0, t_1]$  ולכן

$$e^{-Lt_1}(\theta(t_1) - \tilde{\theta}(t_1)) \geq 0$$

בפרט  $\theta(t_1) \geq \tilde{\theta}(t_1)$  בסתירה להנחה שלנו ולכן  $\theta(t) \geq \tilde{\theta}(t)$  בפרט, לכל  $t \in [a, b]$  מתקיים

$$\frac{d}{dt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \geq -L(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$$

□

כלומר הפונקציה  $e^{Lt}(\theta(t) - \tilde{\theta}(t))$  מונוטונית עולה ואי-שלילית בקטע ולכן אם  $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$  אז  $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$  לכל  $t \in [a, b]$ .



## מסקנה 2.4

בניח שהפונקציה  $\theta$  (על הקטע  $[a, b]$ ) מקיימת את אי-השוויון

$$\theta'(t) \geq q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

ויהי  $k \in \mathbb{Z}$  כך ש- $\theta(a) \geq \pi k$  אזי  $\theta(b) > \pi k$ .

הוכחה: נגדיר  $\tilde{\theta} \equiv \pi k$  אזי

$$0 = \tilde{\theta}' < \underbrace{q(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t))}_{=0} + \underbrace{\frac{1}{p(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))}_{>0}$$

□ ומתקיים  $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$  ולכן  $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b)$  ולמעשה האי-שוויון חזק כי אחרת היה שוויון ואז הייתה קבוצה והיינו מקבלים  $\theta' \equiv 0$  ולכן  $\theta(b) > \pi k$ .

## מסקנה 2.5

יהי  $p, \tilde{p}, q, \tilde{q}$  פונקציות גזירות ברציפות ב- $[a, b]$  כך ש- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t)$  ו- $q(t) \geq \tilde{q}(t)$  לכל  $t \in [a, b]$ . יהיו  $u, \tilde{u}$  פתרונות למשוואות שטורם-ליוביל המתאימות ו- $\theta, \tilde{\theta}$  הזוויות המתאימות (פונקציות הפאזה המתאימות/משותני פרופר המתאימים). אם  $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$  אז  $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b)$  ואם  $\theta(b) = \tilde{\theta}(b)$  אז  $\theta(t) = \tilde{\theta}(t)$  לכל  $t \in [a, b]$ .

הוכחה:

$$\theta'(t) = q(t) \sin^2(\theta(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta(t))$$

$$\tilde{\theta}'(t) = \tilde{q}(t) \sin^2(\tilde{\theta}(t)) + \frac{1}{\tilde{p}(t)} \cos^2(\tilde{\theta}(t))$$

□ ולכן המשפט הוא מסקנה ישירה של הטענה (אם נחלק ונשתמש ב- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t), q(t) \geq \tilde{q}(t)$ ).

## משפט ההשוואה של שטורם

## מסקנה 2.6

בניח ש- $0 < p(t) \leq \tilde{p}(t)$  ו- $q(t) \geq \tilde{q}(t)$  לכל  $t$  ויהיו  $u, \tilde{u}$  פתרונות לא טריוויאליים למשוואות S-L המתאימות. אם  $\tilde{u}(a) = \tilde{u}(b) = 0$  אז קיים  $\tau \in (a, b)$  כך ש- $u(\tau) = 0$ .

הוכחה: נתבונן ב- $\theta, \tilde{\theta}$  פונקציות הפאזה המתאימות. על-ידי הכפלה ב- $(-1)$  אם יש כך צורך ניתן לדאוג ש- $\theta(a) \in [0, \pi)$  באותו אופן ניתן להניח ש- $\tilde{\theta}(a) = 0$  ולכן  $\tilde{\theta}(b) > 0$  מהמסקנה לפני הקודמת.

□ אבל  $\tilde{u}(b) = 0$  ולכן  $\tilde{\theta}(b) = \pi k$  לאיזשהו  $k \in \mathbb{Z}$  ולכן  $\tilde{\theta}(b) \geq \pi$  ומהמסקנה הקודמת  $\theta(a) \geq \tilde{\theta}(a)$  ומהמסקנה הקודמת  $\theta(b) \geq \tilde{\theta}(b) \geq \pi$  וממשפט ערך הביניים יש  $\tau \in (a, b)$  ש- $\theta(\tau) = \pi$  אבל אז  $u(\tau) = 0$  כנדרש.

## 2.3 ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות

יהיו  $p, q, \rho : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות גזירות ברציפות בקטע  $[a, b]$  כך ש- $p, \rho > 0$  בקטע.

## הגדרה 2.7

נאמר ש- $\lambda \in \mathbb{R}$  הוא ערך עצמי של המערכת S-L המתאימה לפונקציות  $p, q, \rho$  אז יש פתרון שהוא לא זהותית אפס למערכת

$$(\star) \quad \frac{d}{dt} \left( p(t) + \frac{d}{dt} u(t) \right) + (q(t) - \lambda \rho(t)) u(t) = 0$$

וכן  $u(a) = u(b) = 0$  פתרון  $u$  למערכת הזו ייקרא פונקציה עצמית.

כידוע, לכל  $\lambda$  ישנו פתרון יחיד למשוואה

$$(p(t)u'(t))' + (q(t) + \lambda \rho(t))u(t) = 0$$

המקיים

$$u(a) = 0, \quad u'(a) = 1$$

נסמן אותו ב- $u_\lambda$ .

## טענה 2.8

$\lambda$  הוא ערך עצמי של המערכת אם ורק אם  $u_\lambda(b) = 0$  ובמקרה הזה כל וקטור/פונקציה עצמית היא כפל של  $u_\lambda$  בסקלר.

הוכחה: אם  $u_\lambda(b) = 0$  אז  $\lambda$  הוא ערך עצמי. מצד שני, אם  $\lambda$  הוא ערך עצמי אז קיימת פונקציה  $u$  כך ש- $u(a) = u(b) = 0$  כאשר  $u'(a) \neq 0$  המקיימת את  $(*)$  בהגדרה 2.7. נתבונן ב- $\tilde{u} = u'(a)u_\lambda$ .

נשים לב ש- $\tilde{u}(a) = u'(a)$  ולכן מיחדות  $u = \tilde{u}$  כי הם מסכימים על תנאי ההתחלה ובפרט

$$u'(a)u_\lambda(b) = \tilde{u} = u(b) = 0$$

ולכן  $u_\lambda(b) = 0$ .

נגדיר  $r_\lambda, \theta_\lambda$  להיות פונקציות האמפליטודה והפאזה של  $u_\lambda$

$$\begin{pmatrix} p(t)u'_\lambda(t) \\ u_\lambda(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_\lambda(t) \cos(\theta_\lambda(t)) \\ r_\lambda(t) \sin(\theta_\lambda(t)) \end{pmatrix}$$

נשים לב ש- $\theta_\lambda(a) = 0$  כי הנגזרת של  $u_\lambda(a)$  היא 1 ובפרט היא חיובית (אנחנו שומרים על מערכת המשוואות לעיל) ולכן ממה שראינו  $\theta_\lambda(t) > 0$  לכל  $b \geq t > a$ .

## טענה 2.9

$\lambda$  הוא ערך עצמי אם ורק אם  $\theta_\lambda(b) = \pi n$  עבור  $n \in \mathbb{N}$ .

הוכחה: אנחנו יודעים ש- $\lambda$  ערך עצמי אם ורק אם  $u_\lambda(b) = 0$  וזה קורה אם ורק אם  $\theta_\lambda(b) = \pi n$  לאיזשהו  $n \in \mathbb{Z}$  אבל  $\theta_\lambda(b) > 0$ . (הראינו שאם  $\theta(a) = \pi n$  אז  $\theta(b) > \pi n$ )

## דוגמה

כשהסתכלנו על משוואת המיתר

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}u(t) + \lambda u(t) &= 0 \\ u(a) &= 0 = u(b) \end{aligned}$$

מהי  $u_\lambda$ ?

$$u_\lambda(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sin(\sqrt{\lambda}(t-a)) & \lambda > 0 \\ t-a & \lambda = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-\lambda}} \sinh(\sqrt{-\lambda}(t-a)) & \lambda < 0 \end{cases}$$

מתקיים ש- $u_\lambda(b) = 0$  אפשרי רק עבור  $\lambda > 0$  (כי סינוס היפרבולי לא מתאפס) ואז זה קורה אם ורק אם  $\sqrt{\lambda}(b-a) = \pi n$  עבור  $n \in \mathbb{N}$ . כלומר הערכים העצמיים הם

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2}$$

והפונקציות העצמיות הן

$$u(t) = C \sin\left(\frac{\pi n(t-a)}{b-a}\right)$$

עבור  $C$  קבוע כלשהו.

## טענה 2.10

אם  $\theta_\lambda(b) = \pi n$  אז לפונקציה  $u_\lambda(t)$  יש בידיוק  $n-1$  אפסים בקטע הפתוח  $(a, b)$ .

הוכחה: לכל  $0 \leq k \leq n$  נגדיר  $\tau_k := \inf\{t \in [a, b] \mid \theta_\lambda(t) \geq \pi k\}$ . נשים לב ש- $a = \tau_0$  ו- $\tau_n = b$  ומהגדרת האימום זאת סדרה עולה

$$a = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_n = b$$

לכל  $t < \tau_k$  מתקיים  $\theta_\lambda(t) < \pi k$  ו- $\theta_\lambda(\tau_k) = \pi k$  ועבור  $t > \tau_k$  מתקיים  $\theta_\lambda(t) > \pi k$ . אבל  $u_\lambda(t) = 0$  אם ורק אם  $\theta_\lambda(t) = \pi k$  לאיזשהו  $k$  וזה קורה אם ורק אם  $t = \tau_k$ .

אנחנו רוצים להבין מתי וליאזה  $\lambda$  מתקיים  $\theta_\lambda(b) = \pi n$  ונראה כעת שלכל  $n \in \mathbb{N}$  יש  $\lambda$  יחיד כזה.

הפונקציה  $\lambda \mapsto \theta_\lambda(b)$  היא רציפה ומונוטונית עולה ממש ויתרה מזאת

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$$

סוף הרצאה 16 – 02/06

הוכחה: את רציפות הפונקציה  $\lambda \mapsto \theta_\lambda(b)$  נראה בתרגיל.

יהיו  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  עם  $\lambda > \mu$  מתקיים

$$\frac{d}{dt} \left( p(t) \frac{d}{dt} u_\lambda(t) \right) + (q(t) + \lambda \rho(t)) u_\lambda(t) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left( p(t) \frac{d}{dt} u_\mu(t) \right) + (q(t) + \mu \rho(t)) u_\mu(t) = 0$$

מתקיים  $\theta_\lambda(b) \geq \theta_\mu(b)$  ולכן  $q(t) + \lambda \rho(t) > q(t) + \mu \rho(t)$  אם יש שוויון, כלומר  $\theta_\lambda(b) = \theta_\mu(b)$  ולכן  $\theta_\lambda(t) = \theta_\mu(t)$  לכל  $t$ , אבל נשים לב

$$\theta'_\lambda(t) = (q(t) + \lambda \rho(t)) \sin^2(\theta_\lambda(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta_\lambda(t))$$

$$\theta'_\mu(t) = (q(t) + \mu \rho(t)) \sin^2(\theta_\mu(t)) + \frac{1}{p(t)} \cos^2(\theta_\mu(t))$$

אז בפרט גם  $\theta'_\lambda = \theta'_\mu$  ולכן נובע ש- $\mu = \lambda$ . בסתירה. ולכן  $\lambda \rightarrow \theta_\lambda(b)$  היא מונוטונית עולה ממש.

נראה ש- $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty$

יהי  $n \in \mathbb{N}$  נגדיר

$$\hat{\mu}(t) = \sin\left(\pi n \frac{t-a}{b-a}\right)$$

נשים לב ש- $\hat{u}$  פותרת את המשוואה

$$\frac{d}{dt} \left( p_{\max} \frac{d}{dt} \hat{u}(t) + \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2} p_{\max} \hat{u}(t) \right) = 0$$

היכן ש- $p_{\max} = \max\{p(t) \mid t \in [a, b]\}$  ונשים לב שמתקיים

$$\hat{u}(a) = 0 = \hat{u}(b)$$

נגדיר

$$p_{\max} \frac{d}{dt} \hat{u}(t) = \hat{r}(t) \cos(\hat{\theta}(t))$$

$$\hat{u}(t) = \hat{r}(t) \sin(\hat{\theta}(t))$$

$$\hat{\theta}(t) = 0$$

ניתן לבחור  $\lambda$  כך שיתקיים

$$\lambda \rho_{\min} \geq \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2} p_{\max} - q_{\min}$$

ולכן

$$q(t) + \lambda \rho(t) \geq q_{\min} + \lambda \rho_{\min} \geq \frac{\pi^2 n^2}{(b-a)^2} p_{\max}$$

יתרה מזאת,  $p(t) \leq p_{\max}$  ולכן  $\theta_\lambda(b) \geq \hat{\theta}(b) = \pi n$  אבל  $\theta_\lambda(b) \geq \pi n$  ומשרירותיות  $n \in \mathbb{N}$  ולכן  $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty$  (הגבול קיים ממונוטוניות).

נראה ש- $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$

יהי  $\varepsilon < \pi$  ונבחר  $0 < \lambda < \pi$  כך שיתקיים

$$(q_{\max} + \lambda \rho_{\min}) \sin^2(\varepsilon) + \frac{1}{p_{\min}} \cos^2(\varepsilon) < 0$$

היות ש- $\rho$  פונקציה חיובית נוכל לבחור  $\lambda$  קטנה דיו שהביטוי לעיל יהיה שלילי (ובהתאם  $\sin$  לא מתאפס שם), נראה ש- $\theta_\lambda(b) \leq \varepsilon$ . נניח שלא, כלומר  $\theta_\lambda(b) > \varepsilon$  ונגדיר

$$\tau = \inf\{t \in [a, b] \mid \theta_\lambda(t) > \varepsilon\}$$

וקיימת סדרה  $t_j \downarrow \tau$  כך ש- $\theta_\lambda(t_j) > \varepsilon$  ולכן  $\theta'_\lambda(\tau) \geq 0$ . מצד שני

$$\begin{aligned}\theta'_\lambda(\tau) &= (q(\tau) + \lambda\rho(\tau)) \sin^2(\theta_\lambda(\tau)) + \frac{1}{p(\tau)} \cos^2(\theta_\lambda(\tau)) \\ &= (q(\tau) + \lambda\rho(\tau)) \sin^2(\varepsilon) + \frac{1}{p(\tau)} \cos^2(\varepsilon) \\ &\leq (q_{\max} + \lambda\rho_{\min}) \sin^2(\varepsilon) + \frac{1}{p_{\min}(\tau)} < 0\end{aligned}$$

□

וזאת סתירה מההנחה שלנו לעיל ולכן  $\theta_\lambda(b) < \varepsilon$  ומשרירותיות  $\varepsilon$  נקבל  $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$ .

## 2.12 מסקנה

קיימת סדרה עולה של מספרים ממשיים  $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots$  כך שמתקיים

1.  $\lambda_n$  הוא הפיתרון היחיד של המשוואה  $\theta_\lambda(b) = \pi n$

2.  $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$

3.  $\lambda$  הוא ערך עצמי של המערכת S-L אם ורק אם  $\lambda \leq \lambda_n$  עבור  $n \in \mathbb{N}$

4. לכל  $n \in \mathbb{N}$  הפונקציה  $\mu_{\lambda_n}$  היא פונקציה עצמית של המערכת S-L עם ערך עצמי  $\lambda_n$ . יתרה מזאת, לפונקציה  $\mu_{\lambda_n}$  יש בידיוק  $n - 1$  אפסים בקטע  $(a, b)$

הוכחה: לכל  $n \in \mathbb{N}$  יש  $\lambda_n$  כך ש- $\theta_{\lambda_n} = \pi n$  זאת משום הפונקציה  $\theta_\lambda(b)$  היא רציפה ומתקיים

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \theta_\lambda(b) = \infty, \quad \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \theta_\lambda(b) = 0$$

אז ממשפט ערך הביניים  $\lambda_n$  יחיד כי הפונקציה מונוטונית ממש וזה מוכיח את 1.

נשים לב ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{\lambda_n}(b) = \infty$  אבל הפונקציה  $\theta_\lambda(b)$  היא פונקציה רציפה וזה גורר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$  וזה סוגר את 2.

□

הראנו ש- $\lambda$  ערך עצמי אם ורק אם  $\theta_\lambda(b) = \pi n$  אם ורק אם  $\lambda = \lambda_n$  וזה סוגר את 3 ואת 4 הראינו כבר.

## 2.13 מסקנה

לכל מערכת S-L רגולריות ( $\rho, p > 0$ ) עם תנאי שפה דיריכלה יש אינסוף ערכים עצמיים.

### 3 משוואות דיפרנציאליות חלקיות

#### 3.1 משוואת לפלס

##### הגדרה 3.1

עבור  $u \in C^2(\Omega)$  עבור  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה נגדיר את משוואת לפלס להיות המשוואה

$$\Delta u = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = 0$$

ל- $\Delta u$  אנחנו קוראים הלפליסאן ול- $u$  אנחנו קוראים פונקציה הרמונית.

##### הערה

1. באופן שקול,  $\Delta u = \text{div}(\nabla)$  (הדיברגנס הופך שדה לסקלר והסקלר אומר מה הקצב של ההתרחבות של השדה) וזה בעצם אנלוג טבעי לנגזרת השנייה במימד אחד.
2. אם  $u \in C^2(\Omega)$ ,  $H$  ההסיאן כאשר  $H_{ij} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  מטריצת הנגזרות החלקיות. אז  $\Delta u = \text{tr } H(u)$ .  
היות שהעקבה לא משתנה תחת שינוי בסיס,  $\Delta u$  אינווריאנטי לסיבובים ולהזזות.

##### דוגמה

1. אם  $n = 1$  הרמונית אז  $u(x) = ax + b$
2. אם  $n = 2$  טבעי להסתכל על המרוכבים אז  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  הולומורפית כלומר גזירה לפי  $z$  אז  $f(z) = u + iv$  עבור  $u, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  הרמוניות כאשר  $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ .  
כאשר  $u(x, y) = \text{Re}(f(x + iy))$ ,  $v(x, y) = \text{Im}(f(x + iy))$  למה? כי פונקציה הולומורפית מקיימת את משוואות קושי רימן

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{aligned}$$

$f$

##### סימון

תהי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ותהי  $u \in C^2(\Omega)$  ויהי  $\overline{B(x_0, r_0)} \subseteq \Omega$  (כדור שהסגור שלו ב- $\Omega$ ).

$$\begin{aligned} \int_{B(x_0, r_0)} u \, dV &:= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_{B(x_0, r_0)} u \, dV \\ \int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, dS &= \frac{1}{\text{Area}(\partial B(x_0, r_0))} \int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, dS \end{aligned}$$

#### תכונת הערך הממוצע של פונקציות הרמוניות

#### משפט 3.2

תהי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ותהי  $u \in C^2(\Omega)$  אזי  $u$  הרמונית ב- $\Omega$  אם ורק אם לכל  $\overline{B(x_0, r_0)} \subseteq \Omega$  מתקיים

$$\int_{B(x_0, r_0)} u \, dV = u(x_0) = \int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, dS$$

הוכחה:  $\Leftarrow$  נניח ראשית ש- $u$  הרמונית ויהי  $\overline{B(x_0, r_0)} \subseteq \Omega$  נראה ש- $u(x_0) = \int_{\partial B(x_0, r_0)} u \, dS$ .  
לכל  $0 < r \leq r_0$  נגדיר

$$\varphi(r) = \int_{\partial B(x_0, r)} u \, dS$$

מרציפות  $u$  מתקיים  $\lim_{r \rightarrow 0} \varphi(r) = u(x_0)$  (✓) ולכן מספיק שנראה ש- $\varphi'(r) = 0$  ואז נקבל ש- $u$  קבועה.  
נגדיר  $\psi_r : \overline{B(0, 1)} \rightarrow \overline{B(x_0, r)}$  על-ידי  $\psi_r(y) = x_0 + ry$  אז  $\psi_r$  הוא דיפאומורפיזם בין השפות עם יעקוביאן  $r^{n-1}$ .

$$\int_{\partial B(0, 1)} (u \circ \psi_r) \, dS = \frac{1}{\text{Area}(\partial B(0, 1)) \cdot r^{n-1}} \int_{\partial B(0, 1)} (u \circ \psi_r) r^{n-1} \, dS = \frac{1}{\text{Area}(\partial B(x_0, r))} \int_{\partial B(x_0, r)} u \, dS = \varphi(r)$$

#### תרגיל 3.3

$$\text{Area}(\partial B(0, 1)) \cdot r^{n-1} = \text{Area}(\partial B(x_0, r))$$

$$\begin{aligned}
\varphi'(r) &= \int_{\partial B(0,1)} \frac{\partial}{\partial r} (u \circ \psi_r) dS \\
&= \int_{\partial B(0,1)} \langle \nabla u, \hat{n} \rangle dS \\
&\stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\text{Area}(\partial B(0,1))} \int_{B(0,1)} \text{div}(\nabla u) dV \\
&\stackrel{(**)}{=} \frac{1}{\text{Area}(\partial B(0,1))} \int_{B(0,1)} \Delta u dV \\
&\stackrel{(***)}{=} 0
\end{aligned}$$

כאשר  $(*)$  זה משפט הדיברגנץ,  $(**)$  זו הגדרת הלפליסיאן ו- $(***)$  זה מהיות  $u$  הרמונית ולכן  $\varphi$  פונקציה קבועה ומהרציפות נסיק קבועה  $u(x_0)$ .  
נשאר להראות ש- $u$  מקיימת את תכונת ערך הממוצע על כדורים

$$\begin{aligned}
\int_{B(x_0, r_0)} u dv &= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_0^{r_0} dr \int_{\partial B(x_0, r)} u dS \\
&= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_0^{r_0} dr \frac{\text{Area}(\partial B(x_0, r))}{\text{Area}(\partial B(x_0, r_0))} \int_{\partial B(x_0, r)} u dS \\
&= \frac{u(x_0)}{\text{Vol}(B(x_0, r_0))} \int_0^{r_0} \text{Area}(\partial B(x_0, r)) dr \\
&= u(x_0)
\end{aligned}$$

אז הראינו שאם  $u$  הרמונית אזי  $\int_{\partial B(x_0, r_0)} u dS = u(x_0)$  והראינו ש- $\int_{B(x_0, r_0)} u dv = u(x_0)$ .  
 $\Rightarrow$  בכיוון השני, נניח ש- $u$  לא הרמונית ולכן יש כדור קטן שעליו  $\Delta u > 0$  (בלי הגבלת הכלליות, יכול להיות גם קטן מאפס) אבל אז מההנחה ש- $\int_{\partial B(x_0, r_0)} u dS = u(x_0)$  נקבל ש- $\varphi'(r) = 0$  אבל זאת סתירה.

הערה

הסבר ל- $(\heartsuit)$ : שכן לכל  $\varepsilon > 0$  יש  $\delta > 0$  כך שאם  $y \in B(x_0, \delta)$  אז  $|u(y) - u(x_0)| < \varepsilon$  ואז עבור  $0 < r < \delta$  מתקיים

$$|u(x_0) - \varphi(r)| = \left| \int_{\partial B(x_0, r)} u(s) dS - u(x_0) \right| \leq \int_{\partial B(x_0, r)} |u(s) - u(x_0)| dS < \varepsilon \int_{\partial B(x_0, r)} dS = \varepsilon$$

□

הערה

במהלך ההוכחה בעצם גם הראינו שעבור פונקציות  $C^2$  תכונת ערך הממוצע על כדורים שקולה לתכונת הערך הממוצע על ספירות (אנחנו עשינו רדוקציה מספירות לכדורים בעזרת אינטגרל, באותה מידה אפשר לעשות רדוקציה מכדורים לספירות בעזרת נגזרת).

סוף הרצאה 18 - 09/06

### עיקרון המקסימום לפונקציות הרמוניות

### משפט 3.4

- נניח ש- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה וחסומה ונניח ש- $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$  הרמונית.
- העיקרון החלש - המקסימום מתקבל על השפה, כלומר  $\max u(\overline{\Omega}) = \max u(\partial\Omega)$
  - העיקרון החזק - אם  $\Omega$  קשירה וקיים  $x_0 \in \Omega$  כך ש- $u(x_0) = \max u(\overline{\Omega})$  אז  $u$  קבועה

הוכחה:

- יהי  $x_0 \in \overline{\Omega}$  כך ש- $u(x_0) = \max u(\overline{\Omega})$ . אם  $x_0 \in \partial\Omega$  אז סיימנו. אחרת, יש  $r > 0$  כך ש- $B(x_0, r) \subseteq \Omega$  ומתקיים  $u(x_0) = \int_{B(x_0, r)} u dV$ . אבל זה אומר שלכל  $y \in B(x_0, r)$  מתקיים  $u(y) = u(x_0)$  שכן אם לא מתקיים  $u(y) < u(x_0)$  (כי  $u(x_0)$  מקסימום) ולכן מרציפות יש קבוצה פתוחה המוכללת ב- $B(x_0, r)$  שעליה  $u < u(x_0)$  ואז  $\int_{B(x_0, r)} u dV < u(x_0)$  וזה נכון לכל  $r \leq \text{dist}(x_0, \partial\Omega)$  ולכן לכל  $y \in \partial\Omega \cap \partial B(x_0, \text{dist}(x_0, \partial\Omega))$  מתקיים  $u(y) = u(x_0) = \max u(\overline{\Omega})$ .
- נניח ש- $x_0 \in \Omega$  מקיימת  $u(x_0) = \max u(\Omega)$  ונתבונן בקבוצה  $A := \{y \in \Omega \mid u(x_0) = u(y)\}$ . ברור ש- $A$  לא ריקה כי  $x_0 \in A$ , נראה שהיא סגורה ופתוחה ומקשירות  $\Omega$  נסיים.  $A$  סגורה מרציפות שכן אם  $(y_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$  כך ש- $y_n \rightarrow y$  עבור  $y \in \Omega$  נובע ש- $u(y_n) = M$  לכל  $n \in \mathbb{N}$  ולכן

$$u(y) = u\left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} u(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} M = M$$

אז  $u(y) = M$  ולכן  $y \in A$  ו- $A$  סגורה כי היא מכילה את נקודות הגבול שלה.  
 $A$  פתוחה כי אם  $y \in A$ , מהיות  $\Omega$  פתוחה נובע שיש  $r > 0$  עבורו  $B(y, r) \subseteq \Omega$  ומהיות  $u$  הרמונית מתכונת ערך הממוצע לפונקציות הרמוניות נקבל בכדור

$$M = u(y) = \frac{1}{\text{Vol}(B(y, r))} \int_{B(y, r)} u(z) dz$$

$M$  הוא מקסימום גלובלי ולכן לכל  $z \in B(y, r)$  מתקיים  $u(z) \leq M$ .  
 אם בשלילה יש  $z_0 \in B(y, r)$  כך ש- $u(z_0) < M$ , מרציפות  $u$  קיימת סביבה של  $z_0$  שבה  $u$  קטנה ממש מ- $M$  אבל אז

$$\int_{B(y, r)} u(z) dz < \int_{B(y, r)} M dz = M \text{Vol}(B(y, r))$$

כלומר

$$\frac{1}{\text{Vol}(B(y, r))} \int_{B(y, r)} u(z) dz < M$$

בסתירה לתכונת ערך הממוצע ולכן לכל  $z \in B(y, r)$  מתקיים  $u(z) = M$  כלומר  $B(y, r) \subseteq A$  כלומר  $A$  פתוחה.  
 $A$  פתוחה, סגורה, לא ריקה ו- $\Omega$  קשירה ולכן נובע  $A = \Omega$ .

□

## הערה

אם  $u$  הרמונית אז  $-u$  הרמונית גם כן ולכן המשפט לגבי עיקרון המקסימום נכון גם למינימום.

## מסקנה 3.5

אם  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$  כאשר  $\Omega$  פתוחה וחסומה ומתקיים  $u|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega}$  אז  $\Delta u = \Delta v$ .  
 הוכחה:  $u - v$  פונקציה הרמונית ב- $\Omega$  ומקיימת  $\min(u - v) = \max(u - v) = 0$  ולכן זו פונקציית האפס ו- $u = v$ .

□

נקבע פונקציה חלקה ואי-שלילית  $\eta : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת  $\eta|_{[0, \frac{1}{2}]} = 1$  ועבור  $x \geq 1$  ניקח  $\eta(x) = 0$ .  
 בהינתן  $\varepsilon > 0$  נגדיר  $\varphi_\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  על-ידי

$$\varphi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^n} \frac{\eta\left(\frac{\|x\|}{\varepsilon}\right)}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|y\|) dy}$$

$\varphi_\varepsilon$  חלקה, רדיאלית הנתמכת על  $B(0, \varepsilon)$  ומקיימת  $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(y) dy = 1$ .

## שיכוך

## 3.6 הגדרה

יהי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  תחום ולכל  $\varepsilon > 0$  נסמן  $\Omega_\varepsilon := \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ .  
 עבור  $u \in C(\Omega)$  ו- $\varepsilon > 0$  נגדיר את השיכוך של  $u$  בסקאלה  $\varepsilon$  להיות הפונקציה  $u^\varepsilon : \Omega_\varepsilon \rightarrow \mathbb{R}$  שנתונה על-ידי

$$u^\varepsilon = \varphi_\varepsilon * u = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(x - y) u(y) dy$$

בפרט  $u^\varepsilon$  חלקה (הוכחנו בתרגיל 10).

## משפט 3.7

תהיי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  פתוחה ונניח ש- $u \in C(\Omega)$  מקיימת את תכונת הערך הממוצע ב- $\Omega$ . אזי  $u \in C^\infty(\Omega)$  (חלקה) ובפרט הרמונית.

הוכחה: מספיק להראות שלכל  $\varepsilon > 0$  מתקיים  $u|_{\Omega_\varepsilon} = u^\varepsilon$ . אז עבור  $x \in \Omega_\varepsilon$  מתקיים

$$\begin{aligned} u^\varepsilon(x) &= \int_{B(x, \varepsilon)} \varphi_\varepsilon(x - y) u(y) dV(y) \\ &= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(x, r)} \varphi_\varepsilon(x - y) u(y) dS(y) dr \\ &= \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(\frac{r}{\varepsilon})}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x,r)} u(x) dS(y) dr \\
& = \frac{u(x)}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(\frac{r}{\varepsilon})}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x,r)} dS(y) dr \\
& = u(x) \int_{B(x,\varepsilon)} \varphi^\varepsilon(x-y) dV(y) \\
& = u(x) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi^\varepsilon(y) dy \\
& \stackrel{(**)}{=} u(x)
\end{aligned}$$

□

כאשר  $(*)$  זה מתכונת ערך הממוצע ו- $(**)$  זה מכיוון ש- $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi^\varepsilon(y) dy = 1$  מהגדרה.

### מסקנה 3.8

פונקציות הרמוניות הן חלקות.

### מסקנה 3.9

גבול במידה שווה של פונקציות הרמוניות הוא הרמוני (ב- $\mathbb{R}^n \subseteq \Omega$  פתוח).

הוכחה: אם  $(f_n)_{n=1}^\infty$  סדרת פונקציות הרמוניות ו- $f_n \rightrightarrows f$  (במידה שווה). אז  $f_n$  רציפות ולכן  $f$  רציפה. בנוסף, לכל  $x \in \Omega$  מתקיים

$$\int_{B(x,r)} f(y) dV(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B(x,r)} f_n(y) dV(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

□

### הערכת נגזרות לפונקציות הרמוניות

### משפט 3.10

לכל  $n, k \in \mathbb{N}$  יש קבוע  $0 < C(n, k)$  כך שלכל קבוצה פתוחה  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  ולכל  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  הרמונית ולכל מולטי-אינדקס  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  (אינדקס וקטורי) עם  $|\alpha| = \sum \alpha_i = k$  ולכל  $\overline{B(x, r)} \subseteq \Omega$  מתקיים

$$|D^\alpha u(x)| = \left| \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}} \dots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} u(x) \right| \leq \int_{B(x,r)} |D^\alpha \varphi_r(x-y)| |u(y)| dy \leq \frac{C(n, k)}{r^{n+k}} \int_{B(x,r)} |u(y)| dy$$

הוכחה: מתקיים  $u|_{\Omega_r} = u^r$  ולכן  $D^\alpha u(x) = D^\alpha \varphi_r * u$  כאשר

$$\varphi_r(x-y) = \frac{1}{r^n \int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \eta\left(\frac{\|x-y\|}{r}\right)$$

על-כל גזירה יוצאת חזקה של  $r$  החוצה ואת שאר הגורמים ניתן לחסום יוניפורמית מכך ש- $\eta$  נתמכת קומפקטית וחלקה ואז (וגם את הנגזרות שלה מסדר גדול שווה ל- $k$  וגם לחסום צירופים לינאריים ומכפלות שלהם) ולכן יש  $C(n, k)$  גדול מספיק החוסם כנדרש.

□

סוף הרצאה 19 - 15/06

### אי-שוויון הרנאק

### משפט 3.11

יהי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  קבוצה פתוחה ותהי  $V \subseteq \Omega$  פתוחה, קשירה וחסומה כך ש- $\overline{V} \subseteq \Omega$ . אזי יש קבוע  $0 < C(\Omega, V)$  כך שלכל  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  הרמונית ואי-שלילית מתקיים

$$\sup u(V) \leq C(\Omega, V) \cdot \inf u(V)$$

הוכחה: נביח קודם מקרה פרטי. נניח ש- $V = B(x, r)$  ונניח גם ש- $\overline{B(x_0, 4r)} \subseteq \Omega$  ונקבע  $x_0, x_1 \in V$  מאי-שוויון המשולש  $B(x_1, r) \subseteq B(x_0, 3r) \subseteq \overline{B(x_0, 3r)} \subseteq \Omega$  ולכן מערך הממוצע ומאי-שליליות של  $u$

$$\begin{aligned}
u(x_0) &= \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, 3r))} \int_{B(x_0, 3r)} u(y) dy \\
&\geq \frac{1}{\text{Vol}(B(x_0, 3r))} \int_{B(x_1, r)} u(y) dy \\
&= \frac{\text{Vol}(B(x_1, r))}{\text{Vol}(B(x_0, 3r))} u(x_1) \\
&= 3^{-n} u(x_1)
\end{aligned}$$



כלומר עבור המקרי הפרטי אפשר לקחת את הקבוע להיות  $3^n$ .  
 למקרה הכללי, מקומפקטיות יש אוסף סופי של נקודות  $p_1, \dots, p_M \in \bar{V}$  ורדיוסים  $r_1, \dots, r_M > 0$  כך ש- $\bigcup_{i=1}^M B(p_i, r_i) \supseteq \bar{V} \subseteq \Omega$  לכל  $i$ .  
 נקבע  $x_0, x_1 \in V$  ומכך ש- $V$  תת-קבוצה פתוחה וקשירה של  $\mathbb{R}^n$  אז היא קשירה מסילתית. לכן נקבע איזושהי מסילה ב- $V$  שמקשרת בין  $x_0$  ו- $x_1$  והמסילה מכוסה על-ידי כלל היותר  $M$  מהכדורים. בלי הגבלת הכלליות אפשר להניח שאפשר להתקדם מ- $x_0$  ל- $x_1$  על-גבי המסילה כאשר בכל צעד אנחנו עוברים מכדור נתון לכדור שעדיין לא ביקרנו בו ובכל מעבר כזה אנחנו צוברים פקטור של לכל היותר  $3^{-n}$  בהפרש בין ערכי  $u$  על נקודות הקצה של המעבר ולכן  $C(\Omega, V) = 3^{nM}$  הקבוע הנדרש.  $\square$

### 3.2 בעיית דיריכלה

נתונה קבוצה פתוחה וחסומה  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  יפה מספיק ונתונות פונקציות  $g \in C(\partial\Omega)$  ו- $f \in C(\bar{\Omega})$ . איך למצוא  $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$  כך ש- $u|_{\partial\Omega} = g$  ו- $\Delta u|_{\Omega} = f$ .  
 זו בעיית דיריכלה למשוואת פואסון והמקרה הפרטי  $f = 0$  נקרא בעיית דיריכלה למשוואת לפלס/לפונקציות הרמוניות.  
 איך פותרים בעיה כזאת? האסטרטגיה שלנו היא שאם נניח שיש לנו פונקציה  $K : \Omega \times \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת שלכל  $y, \Delta_x K(x, y) = 0$  ונניח בנוסף שמתקיים

$$\lim_{x \rightarrow y_0} \int_{\partial\Omega} K(x, y) g(y) ds(y) = g(y_0)$$

אז אם  $K$  מספיק "יפה" כדי שיהיה אפשר להצדיק גזירה מתחת לסמן האינטגרל, אז עבור

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} K(x, y) g(y) ds(y) \implies \Delta u(x) = \int_{\partial\Omega} \Delta_x K(x, y) g(y) ds(y) = 0$$

אז נקבל פונקציה הרמונית ובנוסף  $\lim_{x \rightarrow y_0 \in \partial\Omega} u(x) = g(y_0)$ .

דוגמה

נזהה  $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ . נתבונן בפונקציה  $K(z, w) = \operatorname{Re}\left(\frac{z+w}{w-z}\right)$  כאשר  $z \in \mathbb{D}, w \in \partial\mathbb{D}$  ו- $\Omega = \mathbb{D}$ .  $K$  הרמונית כי החלק הממשי של פונקציה הולומורפית.

$$K(z, w) \underset{\substack{w=e^{it} \\ z=re^{i\theta}}}{=} \operatorname{Re}\left(\frac{e^{it} + re^{i\theta}}{e^{it} - re^{i\theta}}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{1 + re^{i(\theta-t)}}{1 - re^{i(\theta-t)}}\right)$$

אנחנו רוצים להבין את ההתנהגות של  $K(z, w)$  כאשר  $z \rightarrow w_0 = e^{it_0} \in \partial\mathbb{D}$  נסמן  $\theta' = \theta - t$  ואנחנו רוצים להתבונן באינטגרל

$$\int_{\partial\mathbb{D}} K(z, w) g(w) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K(re^{i\theta}, e^{it}) g(e^{it}) dt \xrightarrow[r \rightarrow 1]{\theta \rightarrow t_0} ?$$

נניח ש- $\theta = t_0$  אזי

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K(re^{it_0}, e^{it}) g(e^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Re}\left(\frac{1 + re^{i(t_0-t)}}{1 - re^{i(t_0-t)}}\right) g(t) dt$$

נשים לב שאם נסמן  $t' = t_0 - t$  נקבל

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1 + re^{it'}}{1 - re^{it'}}\right) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(t') + r^2}$$

וזה בעצם גרעין פואסון! כאשר  $t' = 0$  מתקיים

$$\frac{1 - r^2}{1 - 2r + r^2} = \frac{(1-r)(1+r)}{(1-r)^2} = \frac{1+r}{1-r} \xrightarrow{r \rightarrow 1} \infty$$

סוף הרצאה 20 - 16/06

### 3.3 שיטת Perron לפתרון בעיית דיריכלה

המטרה שלנו היא לפתור את בעיית דיריכלה עבור משוואת לפלס  $\Delta u|_{\Omega} = 0$  כאשר  $u|_{\partial\Omega} = g$ .

פונקציה תת-הרמונית

הגדרה 3.12

תהיי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  תחום (קבוצה פתוחה וקשירה).  $v \in C(\Omega)$  תקרא תת-הרמונית ב- $\Omega$  אם לכל  $B \subseteq \Omega$  כדור פתוח כך ש- $\bar{B} \subseteq \Omega$  ולכל  $h \in C(\bar{B})$  הרמונית ב- $B$  המקיימת  $v|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$  מתקיים  $v \leq h$  ב- $B$ .

הגדרה שקולה לפונקציה תת-הרמונית במימד אחד

טענה 3.13

במימד אחד פונקציה  $v$  היא תת-הרמונית אם ורק אם  $v$  קמורה.

## עיקרון המקסימום החזק לפונקציות תת-הרמוניות

## משפט 3.14

יהי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  תחום ותהי  $u \in C(\Omega)$  תת-הרמונית ב- $\Omega$ . אם  $u$  מקבלת מקסימום ב- $\Omega$  אז  $u$  קבועה ב- $\Omega$ .

הוכחה: נסמן

$$M := \max_{x \in \Omega} u(x), \quad A := \{x \in \Omega \mid u(x) = M\}$$

מאחר ש- $u$  רציפה נובע ש- $A$  סגורה ב- $\Omega$  ולא ריקה ויהי  $x_0 \in A$  כדור  $B = B(x_0, r)$  כדור כך ש- $\bar{B} \subseteq \Omega$ .

תהי  $h$  הרמונית ב- $B$  ורציפה ב- $\bar{B}$  המקיימת  $h|_{\partial B} = u|_{\partial B}$ .

מאחר ש- $u \leq M$  בכל  $\Omega$ , בפרט נקבל ש- $u|_{\partial B} \leq M$  אבל  $h|_{\partial B} = u|_{\partial B} \leq M$  ובפרט בנקודה  $x_0$  מתקיים  $M = u(x_0) \leq h(x_0)$ .

מצד שני,  $u$  תת-הרמונית ולכן  $u|_B \leq h|_B$  ובפרט בנקודה  $x_0$  מתקיים  $M = u(x_0) \leq h(x_0)$ .

קיבלנו ש- $h \leq M$  בכל הכדור, אך  $h(x_0) \geq M$  ולכן בהכרח  $h(x_0) = M$ . כלומר הפונקציה ההרמונית  $h$  מקבלת מקסימום בנקודה פנימית, ולכן מעיקרון המקסימום החזק לפונקציות הרמוניות נובע ש- $h \equiv M$  בכל  $\bar{B}$ .

מכאן שעל שפת הכדור,  $u|_{\partial B} = h|_{\partial B} = M$  וזה נכון לכל  $r$  ולכן  $B \subseteq A$  כלומר  $A$  פתוחה.

$A = \Omega$  סגורה ולא ריקה ולכן מקשירות  $\Omega$  נקבל  $A = \Omega$ .

□

## עקרון המקסימום החלש לפונקציות תת-הרמוניות

## משפט 3.15

יהי  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  תחום חסום ותהי  $u \in C(\bar{\Omega})$  תת-הרמונית,  $h \in C(\bar{\Omega})$  הרמונית ב- $\Omega$ . אם  $u \leq h$  על  $\partial\Omega$  אז  $u \leq h$  ב- $\Omega$ .

הערה

למשל, אם  $u \leq M$  על  $\partial\Omega$  אז  $u \leq M$  ב- $\Omega$  (זה בעצם ניסוח שקול).

הוכחה: נביט ב- $w = u - h$  והיא תת-הרמונית (מהגדרה ואריתמטיקה של פונקציות תת-הרמוניות).

תהי  $x_0 \in \bar{\Omega}$  כך ש- $w(x_0) = \max_{\bar{\Omega}} w$ . נתון ש- $w \leq 0$  על  $\partial\Omega$  ונחלק למקרים

- אם  $x_0 \in \Omega$  אז  $w$  קבועה על  $\bar{\Omega}$  מעיקרון המקסימום החזק ולכן  $w \leq 0$  על  $\partial\Omega$  גורר ש- $w \leq 0$  ב- $\Omega$ .
- אם  $x_0 \in \partial\Omega$  אז לכל  $x \in \bar{\Omega}$  מתקיים  $0 \leq w(x) \leq w(x_0) \leq 0$  כאשר האי-שוויון הראשון זה כי נקודת מקסימום והשני זה ש- $x_0 \in \partial\Omega$ .

בכל מקרה  $w \leq 0$  ב- $\Omega$  כלומר  $u \leq h$  ב- $\Omega$ .

□

## טענה 3.16

אם  $u_1, u_2, \dots, u_N$  תת-הרמוניות ב- $\Omega$  אז  $u = \max\{u_1, u_2, \dots, u_N\}$  היא תת-הרמונית ב- $\Omega$ .

הוכחה: יהי  $\bar{B} \subseteq \Omega$  ו- $h \in C(\bar{B})$  הרמונית ב- $B$  כך ש- $u|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$ .

אז מתקיים לכל  $1 \leq j \leq n$  גם ש- $u_j|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$  אבל  $u_j|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$  וזה נכון לכל  $j$  ולכן גם  $u \leq h$ .

הרעיון של שיטת Perron זה לחפש פונקציות תת-הרמוניות  $v$  שמקיימות  $v|_{\partial\Omega} \leq g$  ופותרת את מערכת המשוואה הבאה ב- $\Omega$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

 $u^{per}$ 

## הגדרה 3.17

$$u^{per}(x) = \sup \{v(x) \mid v|_{\partial\Omega} \leq g, v \in C(\bar{\Omega}) \text{ sub-harmonic}\}$$

## הרמה ההרמונית

## הגדרה 3.18

תהי  $v$  תת-הרמונית ב- $\Omega$  ו- $\bar{B} \subseteq \Omega$ . נגדיר את הרמה ההרמונית של  $v$  לכדור  $B$  ב- $V$  כך ש- $V \in C(\Omega)$  המוגדרת על-ידי

$$V(x) = \begin{cases} v(x) & x \notin B \\ \bar{v}(x) & x \in B \end{cases}$$

כאשר  $\bar{v} \in C(\bar{B})$ ,  $\bar{v}|_{\partial B} = v|_{\partial B}$  ו- $\bar{v}$  הרמונית ב- $B$ .

בהרצאה דן (שהחליף את יונתן) סימן את ההרמה הרמונית בתור  $\bar{v}^B$  ול- $\bar{v}$  הוא קרא  $h$  אבל מצאתי את זה מבלבל בהוכחה של משפט פרון אז נצמדתי לסימונים מהמודל.

ההרמה ההרמונית מצדיקה את השם שלה בגלל שמתקיים  $v \leq V$  ב- $\Omega$  שכן אם  $\bar{v}$  הרמונית ב- $B$  אז מכך  $v = \bar{v}$  על  $\partial B$  ובפרט  $v \leq \bar{v}$  על  $\partial B$  הרי ש- $v \leq \bar{v}$  ב- $B$  מעצם הגדרת  $v$  כפונקציה תת-הרמונית ולכן בסך-הכל  $v \leq V$  ב- $\Omega$ .

### טענה 3.19

$V$  היא תת-הרמונית ב- $\Omega$ .

הוכחה: יהי  $C \subseteq \Omega$  כדור כך ש- $\bar{C} \subseteq \Omega$ , ותהי  $h \in C(\bar{C})$  הרמונית ב- $C$  כך ש- $V|_{\partial C} \leq h|_{\partial C}$ . נרצה להראות ש- $V \leq h$  ב- $C$ .  
 $v$  תת-הרמונית ב- $\Omega$  ולכן  $v \leq V$  בכל  $\Omega$ . מההנחה שלנו, מתקיים  $V \leq h$  על  $\partial C$ , ומכאן שגם  $v \leq h$  על  $\partial C$ .  $h$  הרמונית ו- $v$  תת-הרמונית ולכן מעקרון המקסימום עבור פונקציות תת-הרמוניות נקבל ש- $v \leq h$  בכל  $C$ . לפי הגדרת ההרמה, ב- $C \setminus B$  מתקיים  $V = v$ , כלומר קיבלנו ש- $V \leq h$  ב- $C \setminus B$ . נסמן  $U := B \cap C$  ונבחן את

$$\partial U = \underbrace{(\partial B \cap \bar{C})}_I \cup \underbrace{(\bar{B} \cap \partial C)}_{II}$$

על  $II$  מתקיים  $V \leq h$  מההנחה ועל  $I$ , לפי הגדרת ההרמה מתקיים  $V = v$  והראינו ש- $v \leq h$  בכל  $C$ , נובע כי  $V \leq h$  גם על  $I$  ולכן  $V \leq h$  על כל  $\partial U$ .  
 ב- $U \subseteq B$  מתקיים  $V = \bar{v}$  שהיא הרמונית ב- $B$  ולכן  $V - h \leq 0$  הרמוני ב- $U$  המקיים  $V - h \leq 0$  על  $\partial U$  ומעיקרון המקסימום אי-השוויון נשמר גם ב- $U$ .  
 □

### משפט 3.20

תהיי  $u_n$  סדרה חסומה של פונקציות הרמוניות ב- $\Omega$ . אזי קיימת תת-סדרה  $u_{n_k}$  המתכנסת לפונקציה הרמונית ב- $\Omega$  (ההתכנסות היא במידה שווה על כל תת-קבוצה קומפקטית של  $\Omega$ ).

הוכחה: נביט ב- $\partial_i u$  (כלומר  $\frac{\partial u}{\partial x_i}$ ) והיא גם פונקציה הרמונית ולכן לכל  $x_0 \in \Omega$  מתקיים

$$\begin{aligned} \partial_i u(x_0) &= \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} (\partial_i u)(x) dx \\ &= \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} (\partial_i u)(x) \cdot 1 dx \\ &= -\frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} u \cdot (\partial_i 1) dx + \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{\partial B(x_0, r)} u \cdot 1 \cdot n_i d\text{Vol}_{n-1} \\ &\leq \frac{|\partial B(x_0, r)| \cdot \max |u|}{|B(x_0, r)|} \\ &\leq \frac{C_n r^{n-1}}{C'_n r^n} \cdot \max_{\bar{\Omega}} |u| \\ &= \frac{\max_{\bar{\Omega}} |u|}{r} \end{aligned}$$

כאשר  $r$  קטן דיו עבור  $\text{dist}(K, \partial\Omega) < r$  עבור  $K \subseteq \Omega$  קומפקטית ולכן לכל  $x \in K$  מתקיים

$$|u_n(x) - u_n(y)| \leq \max_K |\nabla u_n| \cdot |x - y| \leq \frac{\max_{\bar{\Omega}} |u|}{r} |x - y|$$

אז  $u_n$  רציפה במידה שווה ואפילו ליפשיצית והיא לא תלויה ב- $n$  ולכן רציפה במידה אחידה וממשפט ארצלה-אסקולי נקבל שקיימת תת-סדרה  $u_{n_k}$  שמתכנסת במידה שווה על  $K$  והגבול הזה הרמוני כי הוא גבול במידה שווה.

כדי להרחיב זאת לכל  $\Omega$ , נבחר סדרה עולה של קבוצות קומפקטיות  $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots$  כך ש- $\bigcup_m K_m = \Omega$ . ממשפט ארצלה-אסקולי קיימת תת-סדרה שמתכנסת במידה שווה על  $K_1$ . מתוכה נוציא תת-סדרה שמתכנסת במידה שווה על  $K_2$ , וכן הלאה. נפעיל את טיעון האלכסון של קנטור ונקבל שתת-הסדרה  $u_{n_k}$  מתכנסת במידה שווה על כל קבוצה קומפקטית ב- $\Omega$ .  
 □

לא דיברנו על זה (אבל כן ראינו ביריעות) ש- $v \in C^2(\Omega)$  תת-הרמונית אם ורק אם  $\Delta v \geq 0$  ולכן יש הרבה מאוד פונקציות תת-הרמוניות וקל לייצר כאלו.

$$S_g := \left\{ v \in C(\overline{\Omega}) \mid v \text{ sub-harmonic}, v|_{\partial\Omega} \leq g \right\}, \quad u^{per} := \sup\{v \mid v \in S_g\}$$

אז  $u^{per}$  הרמונית ב- $\Omega$  (כלומר מועמד רציני לפיתרון).

הוכחה: יהי  $y \in \Omega$  ולכן קיימת סדרה  $v_n \in S_g$  כך ש- $v_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$ .

מעיקרון המקסימום מתקיים  $v_n \leq \sup_{\partial\Omega} g$  ונגדיר  $\tilde{v}_n := \max\{v_n, \inf_{\partial\Omega} g\}$  ומתקיים

$$\inf g \leq \tilde{v}_n \leq \sup g, \quad v_n(y) \leq \tilde{v}_n(y) \leq u^{per}(y)$$

ומכלל הכריך נובע ש- $\tilde{v}_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$  וזו סדרה של פונקציות חסומות ב- $S_g$ .

יהי  $B = B(y, r) \subseteq \Omega$  כך ש- $\overline{B} \subseteq \Omega$ , נשים לב שעם ההרמה ההרמונית וטענה 3.19 ולכן  $\tilde{v}_n \leq V_n$  ונקבל את שרשרת אי-השוויונות  $\tilde{v}_n \leq V_n \leq u^{per}$  ולכן בנקודה  $y$  נקבל  $V_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$ .

אז  $(V_n)_{n=1}^\infty$  היא סדרה חסומה של פונקציות הרמוניות בכדור  $B$  וממשפט 3.20 קיימת תת-סדרה  $V_{n_k}$  שמתכנסת ב- $B$  לפונקציה הרמונית  $h_v$  כך שמתקיים  $V_{n_k} \rightarrow h_v$  נקודתית ומיחידות הגבול  $V_{n_k}(y) \rightarrow u^{per}(y)$  וכן  $V_{n_k}(y) \rightarrow h_v(y)$ .

נרצה להראות שזה מתקיים לכל נקודה ב- $B$ : כבר ידוע  $h_v \leq u^{per}$  ב- $B$  ולכן נשאר להראות את האי-שוויון השני; נניח בשלילה שקיימת  $z \in B$  עבורה  $h_v(z) < u^{per}(z)$ . תהי  $w_k \in S_g$  כך ש- $w_k \geq V_{n_k}$  ו- $w_k(z) \rightarrow u^{per}(z)$ .

מהגדרת  $\sup$  נקבל שקיימת סדרה  $\hat{w}_k \in S_g$  המקיימת את התנאי השני ונחליף  $w_k := \max\{\hat{w}_k, V_{n_k}\} \in S_g$  ומתקיים  $V_{n_k} \leq w_k \leq u^{per}$  ובפרט  $w_k(z) \rightarrow u^{per}(z)$  וכן  $w_k(y) \rightarrow u^{per}(y)$ .

ושוב עם ההרמה ההרמונית,  $W_k \in S_g$  ומתקיים  $V_{n_k} \leq w_k \leq W_k \leq u^{per}$  ונוכל למצוא תת-סדרה מתכנסת  $W_{k_n}$  ב- $B$  לפונקציה הרמונית  $h_w$  ומתקיים

$$h_v \leq h_w, \quad h_v(y) = h_w(y) = u^{per}(y), \quad h_v(z) < h_w(z) = u^{per}(z)$$

לכן הפונקציה  $h_v - h_w \leq 0$  היא פונקציה הרמונית שאינה קבועה ומקבלת מקסימום 0 בנקודה פנימית  $y$  בסתירה לעקרון המקסימום ולכן  $h_v \equiv u^{per}$  ב- $B$ .  
משרירותיות  $B, y$  נקבל ש- $u^{per}$  הרמונית ב- $\Omega$ .

□

### 3.4 תנאי שפה

#### משפט 3.22

אם  $\Omega$  הוא תחום  $C^2$  ו- $\partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$   $g$ : רציפה אז ניתן לפתור באופן יחיד את בעיית דיריכלה ב- $\Omega$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

נשים לב שהפיתרון הוא יחיד שכן אם יש שני פתרונות ונסתכל על ההפרש שלהם מעיקרון המקסימום והמינימום (זה מתאפס על השפה). כיצד נפתור את הבעיה הכללית (בעיית פואסון)?

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{in } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

$$u_1 := \Gamma * f$$

$$\begin{cases} \Delta u_2 = 0 \\ u_2|_{\partial\Omega} = g - u_1|_{\partial\Omega} \end{cases}$$

נקבל  $u_1 + u_2 = u$  ולכן

$$\begin{aligned} \Delta u &= \Delta u_1 + \Delta u_2 = f \\ u|_{\partial\Omega} &= u_2|_{\partial\Omega} + u_1|_{\partial\Omega} = g \end{aligned}$$

ועכשיו בעזרת פרון אנחנו יודעים לפתור גם את משוואות פואסון.