Estudo de Caso – Jogo Educativo

Identificação do Caso

Cenário: Unidade de Clínica Médica / Enfermaria
Nível do jogo: Intermediário (Nível 3 – Integração Clínica) (?)
Competência central: Raciocínio clínico e tomada de decisão com apoio do POCUS

Perfil do Paciente

Paciente fictício: Sr. José A.
Idade: 68 anos
Sexo: Masculino
Antecedentes: Hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca
Queixa principal: Dispneia progressive

(Os dados da identificação do caso e do perfil do paciente devem ser fornecidos pelo jogo, ou seja, nao sofrem alterações pelo jogador, seriam dados prontos. Nesse momento o jogador/enfermeiro precisa avaliar o paciente e identificar as possíveis causas da dispnéia.)

1ª MISSAO DO JOGADOR: DESENVOLVER O EXAME FÍSICO

Ao desenvolver o exame físico, o enfermeiro deve criar comandos para receber essas informações:

- Sinais Vitais

FC: 108 bpm
PA: 150 x 95 mmHg
FR: 28 irpm
SpO_2: 89% em ar ambiente
Temperatura: 36,5 ºC

- Exame Físico de Enfermagem – Inspeção, Palpação, Ausculta pulmonar e cardíaca

Uso de musculatura acessória
Estertores crepitantes bibasais
Edema de membros inferiores +2/+4

(nesse momento seria importante que o jogador tivesse a iniciativa de perguntar ao jogo os dados acima… caso ele nao pergunte ele nao terá a resposta, o que dificultará adiante a tomada de decisão clínica… nesse sentido ele poderia "perder pontos" por nao realizar um exame físico completo)

2ª MISSÃO DO JOGADOR: Decisão Clínica – Uso do POCUS

O jogador/enfermeiro precisa perguntar a si mesmo: “Há indicação de utilizar o POCUS (ultrassom) neste momento?”

Exemplo de opções que ele pode decidir:

- Seguir apenas com oxigenioterapia (errada)
- Complementar o exame físico com o uso do POCUS (certa)
- Solicitar avaliação médica (errada)

(Neste momento, caso o jogador/enfermeiro escolha as opções erradas, o jogo se encerraria, ele seria “eliminado”. Caso opte pela escolha certa, da-se a sequencia…)

3ª MISSÃO DO JOGADOR: Escolha adequada do equipamento

Avaliação POCUS Pulmonar

Transdutor: Convexo (certo)

Linear (errado)

Setorial (errado)

Ajustes adequados de ganho e profundidade
Achados: Linhas B bilaterais e difusas associadas a pequeno derrame pleural

(Neste momento, caso o jogador/enfermeiro acerte todas as escolhas, apareceria pra ele uma imagem nítida do caso, ao contrário, apareceria uma imagem de dificil interpretação, do tipo “borrada”. Nesse caso ele pode ter a opção de escolher outros ajustes e/ou equipamentos… tipo voltar etapas, até encontrar a imagem perfeita.)

4ª MISSÃO DO JOGADOR: Qual a intrepretação mais compativel com os achados em relação ao exame físico?

(Nesse momento Podemos oferecer opções e ele selecionar a que julga a mais adequada. Caso erre, é eliminado. Se acertar da sequencia….)

Interpretação dos Achados

Achados compatíveis com congestão pulmonar secundária à insuficiência cardíaca.

5ª MISSÃO DO JOGADOR: Selecionar e priorizar os diagnósticos de enfermagem

Diagnósticos de Enfermagem

Padrão respiratório ineficaz
Débito cardíaco diminuído

(Aqui Podemos pensar em algo do tipo: quanto mais diagnósticos acertar, maior a pontuação)

6ª MISSÃO DO JOGADOR: Escolher e selecionar a ordem de prioridade das intervenções de enfermagem

Intervenções de Enfermagem

Elevar cabeceira do leito
Monitorar padrão respiratório e saturação de oxigênio
Iniciar oxigenoterapia conforme protocolo
Comunicar achados à equipe multiprofissional

(Nesta etapa Podemos gerar alertas do tipo: "Segurança do paciente em risco", caso o jogador cometa erros nas prioridades)

7ª MISSÃO DO JOGADOR: Reavaliar o paciente e avaliar seus cuidados

Desfecho Clínico

Melhora da dispneia
SpO_2: 94%
Redução da frequência respiratoria

(Aqui encerraria o caso com vitória e uma pontuação X)