# EXEMPLO DE CASO CLÍNICO – AVALIAÇÃO DA BEXIGA

**1. Tema:** Avaliação da bexiga – Anúria por obstrução de sonda vesical

Obs: O jogador não tem acesso a essa informação, ela serve apenas para estruturar os casos.

**2. Objetivo Educacional:**

- Identificar anúria em paciente sondado
- Reconhecer sinais de obstrução da sonda vesical, percebendo se é mecânica ou dinâmica
- Utilizar POCUS para avaliação de bexiga distendida
- Realizar conduta segura e eficaz evitando complicações

Obs: O jogador não tem acesso a essa informação, ela serve apenas para estruturar os casos.

**3. Necessidades Básicas Afetadas:**

- Eliminação urinária
- Conforto
- Segurança

Obs: O jogador não tem acesso a essa informação, ela serve apenas para estruturar os casos.

**4. Cenário:**

- Ambiente: UTI
- Nível: Intermediário
- Evolução: Aguda

Obs: O jogador não tem acesso a essa informação, ela serve apenas para estruturar os casos.

**5. Identificação do Paciente:**

- Nome: João da Silva

- Idade: 68 anos

- Sexo: Masculino

- Diagnóstico médico: Pós-operatório de prostatectomia

- Uso de sonda vesical de demora

(Prontuário)

**6. Descrição Breve:**

Paciente apresenta ausência de débito urinário nas últimas horas e desconforto abdominal.

(Isso aparece quando o jogador clica pra começar a jogar aquele caso)

**7. Queixa Principal:**

“Minha barriga está doendo!.”

(Esse paciente está em recuperação de uma cirurgia e está acordado, então pensei em clicar em cima dele e ele falar isso)

**8. História Clínica:**

- Última diurese há 6 horas

- Uso de opioides

- Relato de dor abdominal crescente

(Prontuário)

**9. Exame Físico:**

Sinais vitais:

- PA: 140x90 mmHg

- FC: 98 bpm

- FR: 20 irpm

- Temp: 36,8°C

- SpO2: 97%

Abdome:

- Distendido

- Doloroso à palpação


- Massa suprapúbica palpável

**10. Caso o jogador clique no ultrassom:**


- Bexiga distendida

- Volume estimado: 700 ml

Ele verá essa imagem se escolher o transdutor convexo, index à direita e depois cefálico, preset abdominal (CERTO)



Ele verá essa imagem se configurar o ultrassom errado




**11. Possíveis condutas:**

(1) Desobstruir ou trocar a sonda vesical – CORRETO

(2) Administrar analgésico – ERRADO

(3) Aumentar ingestão hídrica – ERRADO

(4) Avaliar a cada 2h – ERRADO

(5) Solicitar exames laboratoriais – ERRADO

**12. Diagnósticos de Enfermagem (NANDA):**

Corretos:

- Retenção urinária

- Eliminação urinária prejudicada

- Dor aguda

Incorretos:

- Troca gasosa prejudicada

- Integridade da pele prejudicada

- Nutrição desequilibrada

**13. Intervenções (NIC):**

Corretas:

- Verificar permeabilidade da sonda

- Realizar troca da sonda se necessário

- Monitorar débito urinário

Incorretas:

- Oxigenoterapia

- Curativo estéril

- Administração de dieta enteral

**14. Desfechos:**

Positivo:

- Retorno da diurese

- Alívio da dor

- Estabilização clínica

Negativo:

- Lesão renal

- Infecção urinária

- Agravamento clínico

**15. Feedback:**

Jogador acertou:

“Parabéns, você identificou corretamente uma obstrução da sonda e realizou intervenção adequada.”

(ganha pontuação)

Erro:

“O paciente apresentava sinais claros de obstrução da sonda. A não intervenção pode causou complicações graves.”

(perde vida no jogo como se fossem corações ou perde pontuação)