תשובות סופיות

כיתה 6 · אוספים ומייצגים נתונים · רמת מצוינות

שאלה 16

לדוגמה: לבחור באקראי תלמידים מכל כיתה בשתי השכבות, כך שחלקה של כל כיתה במדגם יהיה יחסי לגודלה; להשתמש באותו שאלון ובאותו שבוע, ולהגדיר קריאה בדקות ליום. כך אין העדפה לכיתה מסוימת, וחוק המדידה זהה בשתי הקבוצות. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה הדגימה אקראית ומייצגת את שתי השכבות, וההגדרה, התקופה ושיטת המדידה זהות.

שאלה 20

דוגמה למחקר: „כמה דקות ביום קוראים תלמידי כיתה ו׳ להנאתם?״ מדגם: 30 תלמידים שייבחרו באקראי מכל כיתות השכבה, לפי גודל הכיתות, כדי לצמצם הטיית בחירה. רישום במשך שבוע רגיל מפחית תלות ביום יחיד. ייצוג: תרשים עמודות של מספר התלמידים בכל קבוצת זמני קריאה, כדי לראות את התפלגות הנתונים. מדדים: ממוצע לתיאור זמן הקריאה הכללי וטווח לתיאור הפיזור. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה יש שאלה מדידה, מדגם הוגן, ייצוג מתאים ושני מדדים מוסברים.