

# 判別分析

## 基本的な考え方

村田 昇

## 講義の内容

- 第1回：判別分析の考え方
- 第2回：分析の評価

## 判別分析の例

### 乳癌の良性・悪性の判別




Figure 1: 9 種類の生検の散布図

## 判別分析の考え方

### 判別分析

- 判別分析 (discriminant analysis) の目的  
個体の特徴量からその個体の属するクラスを予測する関係式を構成する方法




Figure 2: 主成分分析を用いて 2 次元に縮約した生検と良性・悪性の関係




Figure 3: 線形判別関数による判別関数値の分布

- 関係式：判別関数 (discriminant function)
  - 説明変数： $X = (X_1, \dots, X_q)$
  - 目的変数： $Y$  ( $K(\geq 2)$  個のクラスラベル)
- 判別関数による分類
  - 1 次式の場合：線形判別分析 (linear discriminant analysis)
  - 2 次式の場合：2 次判別分析 (quadratic discriminant analysis)

## 判別分析の例

- 検査結果から患者が病気を罹患しているか判定する
  - $X$  = 検査結果
  - $Y$  = 病気・健康
- 今日の経済指標から明日株価を予測する
  - $X$  = 今日の経済指標
  - $Y$  = 明日株価の上昇・下降
- 今日の大気の状態から、明日の天気を予測する
  - $X$  = 今日の大気の状態
  - $Y$  = 晴・くもり・雨・雪

## 判別分析の考え方

- 確率による定式化
  1.  $X = \mathbf{x}$  の下で  $Y = k$  となる 条件付確率 を計算

$$p_k(\mathbf{x}) = P(Y = k | X = \mathbf{x})$$

2. 所属する確率が最も高いクラスに個体を分類

- 観測データ： $n$  個の  $(Y, X_1, \dots, X_q)$  の組

$$\{(y_i, x_{i1}, \dots, x_{iq})\}_{i=1}^n$$

- 観測データから  $Y$  の条件付確率  $p_k(\mathbf{x})$  を構成

## 条件付確率

- 以下では  $X$  は離散型の  $q$  次元確率変数として説明
- 事象  $X = \mathbf{x}$  が起きたという条件の下で事象  $Y = k$  が起きる条件付確率

$$p_k(\mathbf{x}) = P(Y = k | X = \mathbf{x}) = \frac{P(Y = k, X = \mathbf{x})}{P(X = \mathbf{x})}$$

- 連続な確率変数の場合は確率密度関数を用いる

## 条件付確率の表現

- $Y$  の条件付確率  $p_k(\mathbf{x})$  のモデル化の方針
  - $p_k(\mathbf{x})$  を直接モデル化する (例: ロジスティック回帰)
  - $Y = k$  の下での  $X$  の条件付き確率質量関数

$$f_k(\mathbf{x}) = P(X = \mathbf{x} | Y = k) = \frac{P(X = \mathbf{x}, Y = k)}{P(Y = k)}$$

のモデル化を通じて  $p_k(\mathbf{x})$  をモデル化する

- 本講義では 後者 について説明

## 演習

### 問題

- 以下の問に答えなさい
  - $X, Y$  を離散確率変数とするとき,  $P(X = x | Y = k)$  から  $P(Y = k | X = x)$  を計算する式を導け

### 解答例

- Bayes の定理を用いればよい  
事象で書くと以下のようなになる

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

離散変数の場合は

$$P(Y = k | X = x) = \frac{P(Y = k)P(X = x | Y = k)}{P(X = x)}$$

と書くことができる

## 事後確率による判別

### Bayes の公式

- $f_k(\mathbf{x})$  から  $p_k(\mathbf{x})$  を得る数学的原理  
原因  $X = \mathbf{x}$  から結果  $Y = k$  が生じる確率を結果  $Y = k$  が生じる原因が  $X = \mathbf{x}$  である確率から計算する方法
- Bayes の公式 (Bayes' formula)

$$p_k(\mathbf{x}) = P(Y = k | X = \mathbf{x}) = \frac{f_k(\mathbf{x})P(Y = k)}{\sum_{l=1}^K f_l(\mathbf{x})P(Y = l)}$$

- $p_k(\mathbf{x})$ : 原因  $X = \mathbf{x}$  から結果  $Y = k$  が生じる確率
- $f_k(\mathbf{x})$ : 結果  $Y = k$  が生じる原因が  $X = \mathbf{x}$  である確率

## Bayes の公式の略証

- 定義より

$$f_k(\mathbf{x}) = P(X = \mathbf{x} | Y = k) = \frac{P(X = \mathbf{x}, Y = k)}{P(Y = k)}$$

- 求める条件付確率

$$p_k(\mathbf{x}) = P(Y = k | X = \mathbf{x}) = \frac{f_k(\mathbf{x})P(Y = k)}{P(X = \mathbf{x})}$$

- 分母の展開

$$\begin{aligned} P(X = \mathbf{x}) &= \sum_{l=1}^K P(X = \mathbf{x}, Y = l) \\ &= \sum_{l=1}^K f_l(\mathbf{x})P(Y = l) \end{aligned}$$

## 事前確率と事後確率

- 事前確率:  $\pi_k = P(Y = k)$  (prior probability)
  - $X = \mathbf{x}$  が与えられる前に予測されるクラス確率
- 事後確率:  $p_k(\mathbf{x})$  (posterior probability)
  - $X = \mathbf{x}$  が与えられた後に予測されるクラス確率
- Bayes の公式による書き換え

$$p_k(\mathbf{x}) = \frac{f_k(\mathbf{x})\pi_k}{\sum_{l=1}^K f_l(\mathbf{x})\pi_l} = \frac{f_k(\mathbf{x})}{\sum_{l=1}^K f_l(\mathbf{x})\pi_l} \cdot \pi_k$$

- 事前確率が説明変数の条件付確率の重みで変更される

## 事前確率の決め方

- 事前に特別な情報がない場合  
データから自然に決まる確率

$$\pi_k = \frac{Y = k \text{ のサンプル数}}{\text{全サンプル数}}$$

- 事前に情報がある場合

食事・運動・飲酒・ストレスなどの生活の特徴から生活習慣病か否かを判別

- 健常者の食事・運動・飲酒・ストレスなどの特徴量を収集
- 罹患者の食事・運動・飲酒・ストレスなどの特徴量を収集
- 事前確率は 別の調査の日本人の罹患率 を利用

## 線形判別分析

### 判別関数

- 判別の手続き
  - 説明変数  $X = \mathbf{x}$  の取得
  - 事後確率  $p_k(\mathbf{x})$  の計算
  - 事後確率最大のクラスにデータを分類
- 判別関数:  $\delta_k(\mathbf{x})$  ( $k = 1, \dots, K$ )

$$p_k(\mathbf{x}) < p_l(\mathbf{x}) \Leftrightarrow \delta_k(\mathbf{x}) < \delta_l(\mathbf{x})$$

- 事後確率の順序を保存する計算しやすい関数

- 判別関数  $\delta_k(\mathbf{x})$  を最大化するクラス  $k$  に分類

### 線形判別

- $f_k(\mathbf{x})$  の仮定
  - $q$  変量正規分布の密度関数
  - 平均ベクトル  $\boldsymbol{\mu}_k$ : クラスごとに異なる
  - 共分散行列  $\Sigma$ : すべてのクラスで共通

$$f_k(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{q/2} \sqrt{\det \Sigma}} \exp \left( -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k) \right)$$

- 線形判別関数:  $\mathbf{x}$  の 1 次式

$$\delta_k(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_k - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_k^T \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_k + \log \pi_k$$

### 平均・分散の推定

- 平均の推定 (クラスごとに行う)

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i: y_i = k} \mathbf{x}_i$$

- ただし  $n_k$  は  $y_i = k$  であるようなデータの総数

- 分散の推定 (まとめて行う)

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n-K} \sum_{k=1}^K \sum_{i: y_i = k} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_k)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_k)^T$$

## 演習

### 問題

- 以下の問に答えなさい
    - $X$  の条件付確率  $f_k(\mathbf{x})$  に関する仮定
      - \*  $q$  変量正規分布の密度関数
      - \* 平均ベクトル  $\boldsymbol{\mu}_k$ : クラスごとに異なる
      - \* 共分散行列  $\Sigma$ : すべてのクラスで共通
- のもとで事後確率と線形判別関数の同値性

$$p_k(\mathbf{x}) < p_l(\mathbf{x}) \Leftrightarrow \delta_k(\mathbf{x}) < \delta_l(\mathbf{x})$$

を示しなさい

### 解答例

- 同値関係を順に確認すればよい

$$\begin{aligned} p_k(\mathbf{x}) &< p_l(\mathbf{x}) \\ \Leftrightarrow f_k(\mathbf{x})\pi_k &< f_l(\mathbf{x})\pi_l \\ &\text{(分母は共通)} \\ \Leftrightarrow \log f_k(\mathbf{x}) + \log \pi_k &< \log f_l(\mathbf{x}) + \log \pi_l \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k)^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k) + \log \pi_k \\ &< -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_l)^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_l) + \log \pi_l \\ &\text{(2 次の項は右辺と左辺で共通)} \\ \Leftrightarrow \delta_k(\mathbf{x}) &< \delta_l(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

## 2 次判別分析

### 2 次判別

- $f_k(\mathbf{x})$  の仮定
  - $q$  変量正規分布の密度関数
  - 平均ベクトル  $\boldsymbol{\mu}_k$ : クラスごとに異なる
  - 共分散行列  $\Sigma_k$ : **クラスごとに異なる**

$$f_k(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{q/2} \sqrt{\det \Sigma_k}} \exp \left( -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k)^\top \Sigma_k^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k) \right)$$

- 2 次判別関数:  $\mathbf{x}$  の 2 次式

$$\delta_k(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \det \Sigma_k - \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k)^\top \Sigma_k^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k) + \log \pi_k$$

## 平均・分散の推定

- 平均の推定 (クラスごとに行う)

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i:y_i=k} \mathbf{x}_i$$

– ただし  $n_k$  は  $y_i = k$  であるようなデータの総数

- 分散の推定 (クラスごとに行う)

$$\hat{\Sigma}_k = \frac{1}{n_k - 1} \sum_{i:y_i=k} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_k)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_k)^\top$$

## 演習

### 問題

- 以下の問に答えなさい
    - $X$  の条件付確率  $f_k(\mathbf{x})$  に関する仮定
      - \*  $q$  変量正規分布の密度関数
      - \* 平均ベクトル  $\boldsymbol{\mu}_k$ : クラスごとに異なる
      - \* 共分散行列  $\Sigma_k$ : クラスごとに異なる
- のもとで事後確率と 2 次判別関数の同値性

$$p_k(\mathbf{x}) < p_l(\mathbf{x}) \Leftrightarrow \delta_k(\mathbf{x}) < \delta_l(\mathbf{x})$$

を示しなさい

### 解答例

- 同値関係を順に確認すればよい

$$\begin{aligned} p_k(\mathbf{x}) &< p_l(\mathbf{x}) \\ \Leftrightarrow f_k(\mathbf{x})\pi_k &< f_l(\mathbf{x})\pi_l \\ \Leftrightarrow \log f_k(\mathbf{x}) + \log \pi_k &< \log f_l(\mathbf{x}) + \log \pi_l \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \det \Sigma_k - \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k)^\top \Sigma_k^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k) + \log \pi_k \\ &< -\frac{1}{2} \det \Sigma_l - \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_l)^\top \Sigma_l^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_l) + \log \pi_l \\ \Leftrightarrow \delta_k(\mathbf{x}) &< \delta_l(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

## さまざまな多値判別

### 多値判別の構成方法

- 判別関数の比較
  - 判別関数  $\delta_k$  を比較
  - 正規分布を仮定する場合は一般には 2 次判別



- 2 値判別の統合
  - 2 クラスでの比較: 最大の組合せ数  $K C_2$
  - グループでの比較: 最大の組合せ数  $2^K - 2$
- $K-1$  個の特徴量への変換
  - 説明変数の線形結合による特徴量の構成
  - 異なる  $K$  種の点の集合を  $K-1$  次元空間に配置
  - **Fisher の線形判別**

## 変動の分解

- 3 種類の変動
  - $A = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)(x_i - \mu)^T$ : **全変動**
  - $W = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_{y_i})(x_i - \mu_{y_i})^T$ : **群内変動**
  - $B = \sum_{k=1}^K n_k (\mu_k - \mu)(\mu_k - \mu)^T$ : **群間変動**  
( $n_k$  はクラス  $k$  のデータ数)
- 変動の関係

$$(\text{全変動}) = (\text{群内変動}) + (\text{群間変動})$$

$$A = W + B$$

## 演習

### 問題

- 以下の問に答えなさい
  - 全変動が群内・群間変動に分解されることを示しなさい
  - 説明変数の線形結合で新たな特徴量を構成する

$$Z = \alpha^T X$$

このとき  $Z$  の群内変動と群間変動を求めなさい

### 解答例

- 定義どおりに計算する

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)(x_i - \mu)^T \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_{y_i} + \mu_{y_i} - \mu)(x_i - \mu_{y_i} + \mu_{y_i} - \mu)^T \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_{y_i})(x_i - \mu_{y_i})^T + \sum_{i=1}^n (\mu_{y_i} - \mu)(\mu_{y_i} - \mu)^T \\ &\quad + \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_{y_i})(\mu_{y_i} - \mu)^T + \sum_{i=1}^n (\mu_{y_i} - \mu)(x_i - \mu_{y_i})^T \end{aligned}$$

- 添字の扱いに注意する

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{y_i})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{y_i})^\top + \sum_{k=1}^K \sum_{i:y_i=k} (\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu})^\top \\
&\quad + \sum_{k=1}^K \sum_{i:y_i=k} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k)(\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu})^\top + \sum_{k=1}^K \sum_{i:y_i=k} (\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k)^\top \\
&= \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{y_i})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{y_i})^\top + \sum_{k=1}^K n_k (\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{\mu}_k - \boldsymbol{\mu})^\top \\
&= W + B
\end{aligned}$$

- 定義どおりに計算する

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n (z_i - \mu_{y_i})^2 &= \sum_{i=1}^n (z_i - \mu_{y_i})(z_i - \mu_{y_i}) \\
&= \sum_{i=1}^n (\boldsymbol{\alpha}^\top \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{\mu}_{y_i})(\boldsymbol{\alpha}^\top \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{\mu}_{y_i})^\top \\
&= \boldsymbol{\alpha}^\top \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{y_i})(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{y_i})^\top \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}^\top W \boldsymbol{\alpha} \\
\sum_{k=1}^K n_k (\mu_k - \mu)^2 &= \boldsymbol{\alpha}^\top B \boldsymbol{\alpha}
\end{aligned}$$

## Fisher の判別分析

### Fisher の線形判別

- 判別のための特徴量  $Z = \boldsymbol{\alpha}^\top X$ 
  - 特徴量  $Z$  のばらつきの計算は主成分分析と同様
  - 変動  $A, W, B$  を Gram 行列とみなせばよい
- 良い  $Z$  の基準
  - クラス内では集まっているほど良い ( $\boldsymbol{\alpha}^\top W \boldsymbol{\alpha}$  は小)
  - クラス間では離れているほど良い ( $\boldsymbol{\alpha}^\top B \boldsymbol{\alpha}$  は大)
- Fisher の基準

$$\text{maximize } \boldsymbol{\alpha}^\top B \boldsymbol{\alpha} \quad \text{s.t.} \quad \boldsymbol{\alpha}^\top W \boldsymbol{\alpha} = \text{const.}$$

- クラス内変動を一定にしてクラス間変動を最大化する

### Fisher の線形判別の解

- $\boldsymbol{\alpha}$  は  $W^{-1}B$  の固有ベクトル (主成分分析と同様)
  - $K = 2$  の場合: 最大固有値を用いる (線形判別と一致)

$$\boldsymbol{\alpha} \propto W^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2) = \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)$$

- 一般の  $K$  の場合: 第 1 から第  $K-1$  固有値を用いる

- 判別の手続き
  - 特徴量とクラスを中心までの距離を用いる
    1.  $d_k = \sum_{l=1}^{K-1} (\alpha_l^T \mathbf{x} - \alpha_l^T \mu_k)^2$  を計算
    2. 最小の  $d_k$  となるクラス  $k$  に判別
  - 特徴量  $Z$  の空間をクラスごとの平均を用いて Voronoi 分割している

## 解析の事例

### データについて

- 気象庁より取得した東京の気候データ
  - 気象庁 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>
  - データ [https://noboru-murata.github.io/multivariate-analysis/data/tokyo\\_weather.csv](https://noboru-murata.github.io/multivariate-analysis/data/tokyo_weather.csv)

### 気温と湿度による月の判別

- 9,10 月のデータの散布図




Figure 4: 散布図

- 線形判別 (2 値)
- 線形判別 (2 値)
- 2 次判別 (2 値)
- Fisher の線形判別 (多値)




Figure 5: 線形判別 (判別関数の値)




Figure 6: 線形判別 (判別境界)




Figure 7: 2 次判別




Figure 8: 多値判別

## 次回の予定

- 第 1 回 : 判別分析の考え方
- 第 2 回 : 分析の評価

ID	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	class
1000025	5	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1002945	5	4	4	5	7	10	3	2	1	benign
1015425	3	1	1	1	2	2	3	1	1	benign
1016277	6	8	8	1	3	4	3	7	1	benign
1017023	4	1	1	3	2	1	3	1	1	benign
1017122	8	10	10	8	7	10	9	7	1	malignant
1018099	1	1	1	1	2	10	3	1	1	benign
1018561	2	1	2	1	2	1	3	1	1	benign
1033078	2	1	1	1	2	1	1	1	5	benign
1033078	4	2	1	1	2	1	2	1	1	benign
1035283	1	1	1	1	1	1	3	1	1	benign
1036172	2	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1041801	5	3	3	3	2	3	4	4	1	malignant
1043999	1	1	1	1	2	3	3	1	1	benign
1044572	8	7	5	10	7	9	5	5	4	malignant
1047630	7	4	6	4	6	1	4	3	1	malignant
1048672	4	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1049815	4	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1050670	10	7	7	6	4	10	4	1	2	malignant
1050718	6	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1054590	7	3	2	10	5	10	5	4	4	malignant
1054593	10	5	5	3	6	7	7	10	1	malignant
1056784	3	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1059552	1	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1065726	5	2	3	4	2	7	3	6	1	malignant
1066373	3	2	1	1	1	1	2	1	1	benign
1066979	5	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1067444	2	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1070935	1	1	3	1	2	1	1	1	1	benign
1070935	3	1	1	1	1	1	2	1	1	benign
1071760	2	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1072179	10	7	7	3	8	5	7	4	3	malignant
1074610	2	1	1	2	2	1	3	1	1	benign
1075123	3	1	2	1	2	1	2	1	1	benign
1079304	2	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1080185	10	10	10	8	6	1	8	9	1	malignant
1081791	6	2	1	1	1	1	7	1	1	benign
1084584	5	4	4	9	2	10	5	6	1	malignant
1091262	2	5	3	3	6	7	7	5	1	malignant
1099510	10	4	3	1	3	3	6	5	2	malignant
1100524	6	10	10	2	8	10	7	3	3	malignant
1102573	5	6	5	6	10	1	3	1	1	malignant
1103608	10	10	10	4	8	1	8	10	1	malignant
1103722	1	1	1	1	2	1	2	1	2	benign
1105257	3	7	7	4	4	9	4	8	1	malignant
1105524	1	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1106095	4	1	1	3	2	1	3	1	1	benign
1106829	7	8	7	2	4	8	3	8	2	malignant
1108370	9	5	8	1	2	3	2	1	5	malignant
1108449	5	3	3	4	2	4	3	4	1	malignant
1110102	10	3	6	2	3	5	4	10	2	malignant
1110503	5	5	5	8	10	8	7	3	7	malignant
1110524	10	5	5	6	8	8	7	1	1	malignant
1111249	10	6	6	3	4	5	3	6	1	malignant
1112209	8	10	10	1	3	6	3	9	1	malignant
1113038	8	2	4	1	5	1	5	4	4	malignant
1113483	5	2	3	1	6	10	5	1	1	malignant
1113906	9	5	5	2	2	2	5	1	1	malignant
1115282	5	3	5	5	3	3	4	10	1	malignant
1115293	1	1	1	1	2	2	2	1	1	benign
1116116	9	10	10	1	10	8	3	3	1	malignant
1116132	6	3	4	1	5	2	3	9	1	malignant
1116192	1	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1116998	10	4	2	1	3	2	4	3	10	malignant
1117152	4	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1118039	5	3	4	1	8	10	4	9	1	malignant
1120559	8	3	8	3	4	9	8	9	8	malignant
1121732	1	1	1	1	2	1	3	2	1	benign
1121919	5	1	3	1	2	1	2	1	1	benign
1123061	6	10	2	8	10	2	7	8	10	malignant
1124651	1	3	3	2	2	1	7	2	1	benign
1125035	9	4	5	10	6	10	4	8	1	malignant
1126417	10	6	4	1	3	4	3	2	3	malignant
1131294	1	1	2	1	2	2	4	2	1	benign
1132347	1	1	4	1	2	1	2	1	1	benign
1133041	5	3	1	2	2	1	2	1	1	benign
1133136	3	1	1	1	2	3	3	1	1	benign
1136142	2	1	1	1	3	1	2	1	1	benign
1137156	2	2	2	1	1	1	7	1	1	benign
1143978	4	1	1	2	2	1	2	1	1	benign
1143978	5	2	1	1	2	1	3	1	1	benign
1147044	3	1	1	1	2	2	7	1	1	benign
1147699	3	5	7	8	8	9	7	10	7	malignant
1147748	5	10	6	1	10	4	4	10	10	malignant
1148278	3	3	6	4	5	8	4	4	1	malignant
1148873	3	6	6	6	5	10	6	8	3	malignant
1152331	4	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1155546	2	1	1	2	15	1	2	1	1	benign
1156272	1	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1156948	3	1	1	2	2	1	1	1	1	benign
1157734	4	1	1	1	2	1	3	1	1	benign
1158247	1	1	1	1	2	1	2	1	1	benign
1160476	2	1	1	1	2	1	3	1	1	benign