

回帰分析

回帰モデルの考え方と推定

村田 昇

講義の内容

- 第 1 回: 回帰モデルの考え方と推定
- 第 2 回: モデルの評価
- 第 3 回: モデルによる予測と発展的なモデル

回帰分析の考え方

回帰分析

- ある変量を別の変量で説明する関係式を構成する
- 関係式: **回帰式** (regression equation)
 - 説明される側: **目的変数**, 被説明変数, 従属変数, 応答変数
 - 説明する側: **説明変数**, 独立変数, 共変量
- 説明変数の数による分類
 - 一つの場合: **単回帰** (simple regression)
 - 複数の場合: **重回帰** (multiple regression)

一般の回帰の枠組

- 説明変数: x_1, \dots, x_p (p 次元)
- 目的変数: y (1 次元)
- 回帰式: y を x_1, \dots, x_p で説明するための関係式

$$y = f(x_1, \dots, x_p)$$

- 観測データ: n 個の (y, x_1, \dots, x_p) の組

$$\{(y_i, x_{i1}, \dots, x_{ip})\}_{i=1}^n$$

線形回帰

- 任意の f では一般的すぎて分析に不向き
- f として **1 次関数** を考える
ある定数 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ を用いた式：

$$f(x_1, \dots, x_p) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p$$

- 1 次関数の場合：**線形回帰** (linear regression)
- 一般の場合：**非線形回帰** (nonlinear regression)
- 非線形関係は新たな説明変数の導入で対応可能
 - 適切な多項式： $x_j^2, x_j x_k, x_j x_k x_l, \dots$
 - その他の非線形変換： $\log x_j, x_j^\alpha, \dots$
 - 全ての非線形関係ではない

回帰係数

- 線形回帰式

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p$$

- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ ：**回帰係数** (regression coefficients)
- β_0 ：**定数項 / 切片** (constant term / intersection)
- 線形回帰分析 (linear regression analysis)
未知の回帰係数をデータから決定する分析方法

回帰の確率モデル

- 回帰式の不確定性
 - データは一般に観測誤差などランダムな変動を含む
 - 回帰式がそのまま成立することは期待できない
- 確率モデル：データのばらつきを表す項 ϵ_i を追加

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

- $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ ：**誤差項 / 攪乱項** (error / disturbance term)
 - * 誤差項は独立な確率変数と仮定
 - * 多くの場合、平均 0、分散 σ^2 の正規分布を仮定
- **推定** (estimation)：観測データから $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)$ を決定

回帰係数の推定

残差

- **残差** (residual)：回帰式で説明できない変動
- 回帰係数 $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)^T$ を持つ回帰式の残差

$$e_i(\beta) = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip}) \quad (i = 1, \dots, n)$$

- 残差 $e_i(\beta)$ の絶対値が小さいほど当てはまりがよい

最小二乗法

- 残差平方和 (residual sum of squares)

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^n e_i(\boldsymbol{\beta})^2$$

- 最小二乗推定量 (least squares estimator)

残差平方和 $S(\boldsymbol{\beta})$ を最小にする $\boldsymbol{\beta}$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_p)^\top = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} S(\boldsymbol{\beta})$$

行列の定義

- デザイン行列 (design matrix)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix}$$

ベクトルの定義

- 目的変数, 誤差, 回帰係数のベクトル

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$$

行列・ベクトルによる表現

- 確率モデル

$$\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

- 残差平方和

$$S(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - X\boldsymbol{\beta})^\top (\mathbf{y} - X\boldsymbol{\beta})$$

解の条件

- 解 $\boldsymbol{\beta}$ では残差平方和の勾配は零ベクトル

$$\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}} S(\boldsymbol{\beta}) = \left(\frac{\partial S}{\partial \beta_0}(\boldsymbol{\beta}), \frac{\partial S}{\partial \beta_1}(\boldsymbol{\beta}), \dots, \frac{\partial S}{\partial \beta_p}(\boldsymbol{\beta}) \right)^\top = \mathbf{0}$$

演習

問題

- 残差平方和 $S(\boldsymbol{\beta})$ をベクトル $\boldsymbol{\beta}$ で微分して解の条件を求めなさい

解答例

- 残差平方和を展開しておく

$$\begin{aligned} S(\boldsymbol{\beta}) &= (\mathbf{y} - X\boldsymbol{\beta})^\top (\mathbf{y} - X\boldsymbol{\beta}) \\ &= \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \mathbf{y}^\top X\boldsymbol{\beta} - (X\boldsymbol{\beta})^\top \mathbf{y} + (X\boldsymbol{\beta})^\top X\boldsymbol{\beta} \\ &= \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \mathbf{y}^\top X\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\beta}^\top X^\top \mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}^\top X^\top X\boldsymbol{\beta} \end{aligned}$$

- ベクトルによる微分を行うと以下ようになる

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\beta}} S(\boldsymbol{\beta}) &= -(\mathbf{y}^\top X)^\top - X^\top \mathbf{y} + (X^\top X + (X^\top X)^\top) \boldsymbol{\beta} \\ &= -2X^\top \mathbf{y} + 2X^\top X\boldsymbol{\beta} \end{aligned}$$

- したがって $\boldsymbol{\beta}$ の満たす条件は以下となる

$$\begin{aligned} -2X^\top \mathbf{y} + 2X^\top X\boldsymbol{\beta} &= 0 \quad \text{より} \\ X^\top X\boldsymbol{\beta} &= X^\top \mathbf{y} \end{aligned}$$

補足

- 成分ごとの計算は以下ようになる

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_j}(\boldsymbol{\beta}) = -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{k=0}^p \beta_k x_{ik} \right) x_{ij} = 0$$

ただし, $x_{i0} = 1$ ($i = 1, \dots, n$), $j = 0, 1, \dots, p$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \left(\sum_{k=0}^p x_{ik} \beta_k \right) = \sum_{i=1}^n x_{ij} y_i \quad (j = 0, 1, \dots, p)$$

x_{ij} は行列 X の (i, j) 成分であることに注意

正規方程式

正規方程式

- 正規方程式 (normal equation)

$$X^\top X\boldsymbol{\beta} = X^\top \mathbf{y}$$

- $X^\top X$: **Gram 行列** (Gram matrix)
 - $(p+1) \times (p+1)$ 行列 (正方行列)
 - 正定対称行列 (固有値が非負)

正規方程式の解

- 正規方程式の基本的な性質
 - 正規方程式は必ず解をもつ (一意に決まらない場合もある)
 - 正規方程式の解は最小二乗推定量であるための必要条件
- 解の一意性の条件
 - Gram 行列 $X^T X$ が **正則**
 - X の列ベクトルが独立 (後述)
- 正規方程式の解

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

最小二乗推定量の性質

解析の上での良い条件

- 最小二乗推定量がただ一つだけ存在する条件
 - $X^T X$ が正則
 - $X^T X$ の階数が $p+1$
 - X の階数が $p+1$
 - X の列ベクトルが **1 次独立**

これらは同値条件

解析の上での良くない条件

- 説明変数が 1 次従属: **多重共線性** (multicollinearity)
- 多重共線性が強くないように説明変数を選択
 - X の列 (説明変数) の独立性を担保する
 - 説明変数が互いに異なる情報をもつように選ぶ
 - 似た性質をもつ説明変数の重複は避ける

推定の幾何学的解釈

- **あてはめ値 / 予測値** (fitted values / predicted values)

$$\hat{y} = X\hat{\beta} = \hat{\beta}_0 X_{\text{第 0 列}} + \cdots + \hat{\beta}_p X_{\text{第 } p \text{ 列}}$$

- 最小二乗推定量 \hat{y} の幾何学的性質
 - $L[X]$: X の列ベクトルが張る \mathbb{R}^n の部分線形空間
 - X の階数が $p+1$ ならば $L[X]$ の次元は $p+1$ (解の一意性)
 - \hat{y} は y の $L[X]$ への直交射影
 - **残差** (residuals) $\hat{\epsilon} = y - \hat{y}$ はあてはめ値 \hat{y} に直交

$$\hat{\epsilon} \cdot \hat{y} = 0$$




図 1: $n = 3, p + 1 = 2$ の場合の最小二乗法による推定

線形回帰式と標本平均

- $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, \dots, x_{ip})^\top$: 説明変数の i 番目の観測データ
- 説明変数および目的変数の標本平均

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i,$$

- $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ が最小二乗推定量のとき以下が成立

$$\bar{y} = (1, \bar{\mathbf{x}}^\top) \hat{\boldsymbol{\beta}}$$

演習

問題

- 最小二乗推定量について以下を示しなさい
 - 残差の標本平均が 0 となる
 以下を示せばよい

$$\mathbf{1}^\top (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \mathbf{1}^\top \hat{\boldsymbol{\epsilon}} = 0$$

ただし $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$ とする

- 回帰式が標本平均を通る

$$\bar{y} = (1, \bar{\mathbf{x}}^\top) \hat{\boldsymbol{\beta}}$$

解答例

- 残差の表現を整理する

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\epsilon}} &= \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y} - \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ &= \mathbf{y} - \mathbf{X} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \end{aligned}$$

- 左から X^T を乗じる

$$X^T y - X^T X (X^T X)^{-1} X^T y = X^T y - X^T y = 0$$

- 行列 X の 1 列目が $\mathbf{1}$ であることより明らか
- 説明変数の標本平均をデザイン行列で表す

$$\mathbf{1}^T X = n(1, \bar{x}^T)$$

- したがって以下が成立する

$$\begin{aligned} n(1, \bar{x}^T) \hat{\beta} &= \mathbf{1}^T X \hat{\beta} \\ &= \mathbf{1}^T \hat{y} = \mathbf{1}^T y \\ &= n\bar{y} \end{aligned}$$

残差の分解

最小二乗推定量の残差

- 観測値と推定値 $\hat{\beta}$ による予測値の差

$$\hat{\epsilon}_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \cdots + \hat{\beta}_p x_{ip}) \quad (i = 1, \dots, n)$$

- 誤差項 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ の推定値
- 全てができるだけ小さいほど良い
- 予測値とは独立に偏りが無いほど良い

- 残差ベクトル

$$\hat{\epsilon} = y - \hat{y} = (\hat{\epsilon}_1, \hat{\epsilon}_2, \dots, \hat{\epsilon}_n)^T$$

平方和の分解

- $\bar{y} = \bar{y}\mathbf{1} = (\bar{y}, \bar{y}, \dots, \bar{y})^T$: 標本平均のベクトル
- いろいろなばらつき
 - $S_y = (y - \bar{y})^T (y - \bar{y})$: 目的変数のばらつき
 - $S = (y - \hat{y})^T (y - \hat{y})$: 残差のばらつき ($\hat{\epsilon}^T \hat{\epsilon}$)
 - $S_r = (\hat{y} - \bar{y})^T (\hat{y} - \bar{y})$: あてはめ値 (回帰) のばらつき
- 3 つのばらつき (平方和) の関係

$$(y - \bar{y})^T (y - \bar{y}) = (y - \hat{y})^T (y - \hat{y}) + (\hat{y} - \bar{y})^T (\hat{y} - \bar{y})$$

$$S_y = S + S_r$$

演習

問題

- 以下の関係式を示しなさい
 - あてはめ値と残差のベクトルが直交する

$$\hat{\mathbf{y}}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \hat{\mathbf{y}}^T \hat{\boldsymbol{\epsilon}} = 0$$

- 残差平方和の分解が成り立つ

$$S_y = S + S_r$$

解答例

- 残差の表現を整理する

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\epsilon}} &= \mathbf{y} - \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T) \mathbf{y}\end{aligned}$$

- 左から $\hat{\mathbf{y}}$ を乗じる

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{y}}^T \hat{\boldsymbol{\epsilon}} &= \hat{\boldsymbol{\beta}}^T \mathbf{X}^T (\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T) \mathbf{y} \\ &= \hat{\boldsymbol{\beta}}^T (\mathbf{X}^T - \mathbf{X}^T \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T) \mathbf{y} \\ &= \hat{\boldsymbol{\beta}}^T (\mathbf{X}^T - \mathbf{X}^T) \mathbf{y} = 0\end{aligned}$$

- 以下の関係を用いて展開すればよい

$$\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}}$$

$$\text{ただし } \bar{\mathbf{y}} = \bar{y} \mathbf{1}$$

- このとき以下の項は 0 になる

$$(\hat{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}})^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \hat{\mathbf{y}}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) - \bar{y} \mathbf{1}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = 0$$

決定係数

回帰式の寄与

- ばらつきの分解

$$S_y \text{ (目的変数)} = S \text{ (残差)} + S_r \text{ (あてはめ値)}$$

- 回帰式で説明できるばらつきの比率

$$(\text{回帰式の寄与率}) = \frac{S_r}{S_y} = 1 - \frac{S}{S_y}$$

- 回帰式のあてはまり具合を評価する代表的な指標

決定係数 (R^2 値)

- 決定係数 (R-squared)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- 自由度調整済み決定係数 (adjusted R-squared)

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n-p-1} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- 不偏分散で補正している

解析の事例

データについて

- 気象庁より取得した東京の気候データ
 - 気象庁 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>
 - データ https://noboru-murata.github.io/multivariate-analysis/data/tokyo_weather.csv

東京の8月の気候の分析

- 気候 (気温, 降雨, 日射, 降雪, 風向, 風速, 気圧, 湿度, 雲量) に関するデータ (の一部)

	month	day	day_of_week	temp	rain	solar	snow	wdir	wind	press	humid	cloud
213	8	1	Sun	28.7	0.0	26.58	0	SSE	3.2	1000.2	76	2.3
214	8	2	Mon	28.6	0.5	19.95	0	SE	3.4	1006.1	80	7.0
215	8	3	Tue	29.0	3.0	19.89	0	S	4.0	1009.9	80	6.3
216	8	4	Wed	29.5	0.0	26.52	0	S	3.0	1008.2	76	2.8
217	8	5	Thu	29.1	0.0	26.17	0	SSE	2.8	1005.1	74	5.8
218	8	6	Fri	29.1	0.0	24.82	0	SSE	2.9	1004.2	75	4.0
219	8	7	Sat	27.9	2.0	11.43	0	NE	2.5	1003.1	85	9.0
220	8	8	Sun	25.9	90.5	3.43	0	N	3.0	998.0	97	10.0
221	8	9	Mon	28.1	2.0	13.34	0	S	6.1	995.4	84	6.0
222	8	10	Tue	31.0	0.0	22.45	0	SSW	4.7	996.3	58	4.8
223	8	11	Wed	29.2	0.0	21.12	0	SE	2.9	1008.0	61	9.3
224	8	12	Thu	26.0	0.5	8.34	0	SSE	2.4	1008.8	84	9.5
225	8	13	Fri	22.5	20.5	4.36	0	NE	2.7	1008.0	97	10.0
226	8	14	Sat	22.3	77.0	2.76	0	N	2.7	1003.6	100	10.0

- 関連するデータの散布図
- 気温を説明する5つの線形回帰モデルを検討する
 - モデル 1: 気温 = F(気圧)
 - モデル 2: 気温 = F(日射)
 - モデル 3: 気温 = F(気圧, 日射)
 - モデル 4: 気温 = F(気圧, 日射, 湿度)




図 2: 散布図




図 3: モデル 1

- モデル 5: 気温 = F(気圧, 日射, 雲量)
- モデル 1 の推定結果
- モデル 2 の推定結果




図 4: モデル 2

- モデル 3 の推定結果
- 観測値とあてはめ値の比較
- 決定係数・自由度調整済み決定係数
 - モデル 1: 気温 = F(気圧)
 - [1] "R2: 0.0483 ; adj. R2: 0.0155"
 - モデル 2: 気温 = F(日射)
 - [1] "R2: 0.663 ; adj. R2: 0.651"
 - モデル 3: 気温 = F(気圧, 日射)
 - [1] "R2: 0.703 ; adj. R2: 0.681"
 - モデル 4: 気温 = F(気圧, 日射, 湿度)
 - [1] "R2: 0.83 ; adj. R2: 0.811"
 - モデル 5: 気温 = F(気圧, 日射, 雲量)
 - [1] "R2: 0.703 ; adj. R2: 0.67"

次回の予定

- 第 1 回: 回帰モデルの考え方と推定
- **第 2 回: モデルの評価**
- 第 3 回: モデルによる予測と発展的なモデル




図 5: モデル 3




図 6: モデルの比較