

# 一般の確率空間

## 確率・統計 - 第2講

村田 昇

### 前回のおさらい

- 有限試行の確率空間
  - 確率論の基本用語：試行，標本点，標本空間，事象
  - 事象は標本空間の部分集合
  - 事象の演算は集合の演算と等価
  - 確率測度の基本的な性質 (正值性，加法性，全確率)
  - 確率空間は標本空間，事象の集合，確率測度の3つ組

### 有理数の可算性

#### 可算集合

- 定義  
集合の全ての要素に自然数で順番に番号が与えられることを**可算 (可付番) (enumerable, countable)** という.
- 自明な可算集合の例
  - 要素が有限個の集合
  - 自然数

#### 有理数の可算性

- 区間  $(0, 1)$  に含まれる全ての有理数は可算
  - 有理数と自然数に1対1の対応があることを示せばよい

分子 \ 分母	2	3	4	5	6	...
1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	...
2		2/3	2/4	2/5	2/6	...
3			3/4	3/5	3/6	...
4				4/5	4/6	...
5					5/6	...
⋮						...

- 対応づけ出来そうだが規則の記述は難しそう

### Bernstein の定理

- 1対1の対応が存在することを示す代わりに， $A$  と  $B$  の部分集合，および  $A$  の部分集合と  $B$  の間にそれぞれ1対1の対応が存在することを示せばよい.




図 1: Bernstein の定理

## 有理数の可算性 (再考)

- Bernstein の定理を用いた場合
  - 全ての自然数  $n$  から有理数の部分集合  $1/q$  への 1 対 1 対応

$$n \mapsto \frac{1}{q} = \frac{1}{n+1}$$

(有理数としては  $1/q$  の形しか用いない)

- 全ての有理数  $p/q$  から自然数  $n$  の部分集合への 1 対 1 対応

$$\frac{p}{q} \mapsto n = 2^p \times 3^q$$

(自然数としては 2 と 3 の倍数しか用いない)

## 演習

### 練習問題

- 整数が可算であることを示せ.
- 自然数の組  $(m, n)$  が可算であるかどうか論じよ.
- 1 以上の有理数が可算であるかどうか論じよ.

## 無理数の非可算性

### 非可算集合

- 定義
 

可算でないことを**非可算 (unenumerable, uncountable)** という. (不可算と書かれている場合もある)
- 非可算集合の例
  - 区間  $(0, 1)$  に含まれる無理数
  - 実数全体

## Cantor の対角線論法

- 無理数の非可算性の証明 (背理法)
- 証明の概要 (詳しくは講義資料)
  - その 1  
区間  $(0, 1)$  に含まれる **無理数の集合は可算** と仮定する.
  - その 2  
有理数の集合は可算なので, 仮定より無理数と有理数の和である実数も可算となる.
- その 3  
自然数との対応付けを行い, 番号順に並べる.

$$\begin{array}{lcl} 1: & 0.d_1^1 d_2^1 d_3^1 d_4^1 \cdots \\ 2: & 0.d_1^2 d_2^2 d_3^2 d_4^2 \cdots \\ 3: & 0.d_1^3 d_2^3 d_3^3 d_4^3 \cdots \\ 4: & 0.d_1^4 d_2^4 d_3^4 d_4^4 \cdots \\ & \vdots \end{array}$$

ただし, 有限桁の小数の場合は 0 で埋める.

- その 4  
第  $n$  番の数の第  $n$  桁目  $d_n^n$  とは **異なる数**  $\tilde{d}_n^n \neq d_n^n$  を選び, これらを並べた次の数を考える.  
$$0.\tilde{d}_1^1 \tilde{d}_2^2 \tilde{d}_3^3 \tilde{d}_4^4 \cdots$$
- その 5  
区間  $(0, 1)$  に含まれるこの数の番号を探す.
- その 6  
第  $n$  番の数とは第  $n$  桁目が **違っている** ので, この数は区間  $(0, 1)$  の **全ての実数を並べたはずの表にはない**.
- その 7  
番号が振られていない数が存在するので区間  $(0, 1)$  の実数が可算である (並べて番号が付けられる) ことに矛盾する.
- その 8  
つまり最初の仮定 “**無理数の集合は可算**” が間違っていたということ.

## 集合の分類

- 無限集合を更に分類 (可算と非可算) する必要がある
- **集合の濃度**
  - この講義で必要な概念は以下の 3 つ  
**有限の濃度** 有限個の要素からなる集合  
**可算の濃度** 自然数, 有理数など  
**連続の濃度** 無理数, 実数など
- より詳しくは位相と集合の本を参照

## 演習

### 練習問題

- 以下の集合の濃度を答えなさい.
  - 区間  $(0, 1)$  に含まれる有理数
  - 区間  $(0, 1)$  に含まれる無理数
  - 実数  $\mathbb{R}$  (区間  $(-\infty, \infty)$ )
  - 2 つの実数の組  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$
  - 2 次元空間で  $xy$  座標がともに整数となる点の集合
  - 表が出るまでコインを投げ続ける試行の標本空間

## 一般の確率測度

### 可測集合

**可測集合 (measurable set)** 確率測度  $P$  で確率の値を測ることができる集合  
(標本点の集合の中で事象として考えてよいもの)

**可測 (measurable)** “集合  $A$  が可測” とは集合  $A$  を確率測度  $P$  で測ることができること

### 集合族

- 確率測度  $P$  で確率の値を測ることができる対象全体 (関数  $P$  の **定義域**) を  $\mathcal{F}$  と書く
- 定義域  $\mathcal{F}$  は可測な事象 (標本空間の部分集合)  $A \subset \Omega$  の集まり
- このような “集合の集合” を **集合族 (family of sets)** という

### $\sigma$ -加法族

- 定義

以下の  $(\sigma.1)$ -( $\sigma.3$ ) の 3 つの条件を満たす集合族を  **$\sigma$ -加法族 ( $\sigma$ -algebra)** と呼ぶ.

$$(\sigma.1) \quad \Omega \in \mathcal{F}$$

$$(\sigma.2) \quad A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$$

$$(\sigma.3) \quad A_n \in \mathcal{F}, (n = 1, 2, \dots) \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

- $(\sigma.1)$ -( $\sigma.3$ ) は定義域  $\mathcal{F}$  の満たすべき条件でもある

### 条件の意味

( $\sigma.1$ ) 標本空間 (全事象) は可測である ( $P$  で測ることができる)

( $\sigma.2$ ) ある事象が可測なら, その余事象も可測である

( $\sigma.3$ ) 可測集合の可算 (自然数で番号付けできる) 無限和も可測である

## 確率測度

- 定義

集合関数  $P$  は条件 (P.1), (P.2) を満たすとき **測度 (measure)** と呼ばれ, さらに (P.3) まで満たすとき **確率測度 (probability measure)** と呼ばれる. また  $P(A)$  を  $A$  の **測度** という.

$$(P.1) \quad P(A) \geq 0, A \in \mathcal{F}$$

$$(P.2) \quad P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n), A_n \in \mathcal{F}$$

$$(P.3) \quad P(\Omega) = 1$$

- (P.2) を  $\sigma$ -加法性 ( $\sigma$ -additivity) という

## 確率空間

- 定義

標本空間  $\Omega$  と確率測度  $P$ , および  $P$  の定義域である  $\sigma$ -加法族  $\mathcal{F}$  の組  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を **確率空間 (probability space)** という.

## Lebesgue 測度

### ルーレット回しの確率測度

- 区間  $(0, 1]$  からの無作為抽出

試行  $T$  を “区間  $(0, 1]$  から無作為に一点抜き出すこと” とする. このとき標本空間は

$$\Omega = (0, 1]$$

であり無限試行となる. 確率測度は事象  $A$  が区間  $[a, b], (a, b), [a, b)$  または  $(a, b]$  といった簡単な集合であれば

$$P(A) = |A| = b - a, (|A| \text{ は区間の長さを表す})$$

とすればよい.

### 確率測度の定義域

- 確率測度  $P$  の定義域  $\mathcal{F}$  は集合演算で作られる
- **可算個** の区間を組み合わせで作られる集合

$$\mathcal{F} = \{\text{可算個の任意の区間の和, 差, 交, 余集合から作られる集合}\}$$

- 集合の測度 (確率) は (P.2) の性質より排反な区間の長さの和から計算できる

## Lebesgue 測度

- 定義

“区間  $(0, 1]$  から無作為に一点抜き出す” 試行  $T$  によって考えられる確率測度  $P$  を  $(0, 1]$  上の **Lebesgue 測度 (Lebesgue measure)** という. また Lebesgue 測度の定義域となる  $\sigma$ -加法族を  $\mathbb{R}$  の **Borel 集合族 (Borel field)** という.

- Lebesgue 測度は  $\mu$  で表されることが多い
- 厳密な定義については Lebesgue 積分の本を参照

## Lebesgue 測度の計算

- 一点が抜き出される確率

Lebesgue 測度において,  $P\{a\}$  (一点  $a$  が抜き出される確率) は 0 となる.

例えば  $\{1, 1/2, 1/3, \dots\}$  という可算集合を考えると,

$$P\left\{\frac{1}{n}\right\} \geq \varepsilon > 0 \Rightarrow P\left(\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{\frac{1}{n}\right\} \rightarrow \infty$$

となり矛盾が生じる.

- 抜き出した点が有理数である確率

$$\mathbb{R}_{(0,1]} = \{\text{区間 } (0, 1] \text{ 上の実数全体}\} (= \Omega)$$

$$\mathbb{Q}_{(0,1]} = \{\text{区間 } (0, 1] \text{ 上の有理数全体}\}$$

と書くことにする. 有理数は **可算** であるからその要素に番号が付けられ,

$$\mathbb{Q}_{(0,1]} = \{q_1, q_2, q_3, \dots, q_n, \dots\}$$

と書けるので, (P.2) の性質により計算できる.

$$\begin{aligned} P(\mathbb{Q}_{(0,1]}) &= P(\{q_1, q_2, q_3, \dots, q_n, \dots\}) \\ &= P\{q_1\} + P\{q_2\} + P\{q_3\} + \dots + P\{q_n\} + \dots \\ &= 0 + 0 + 0 + \dots + 0 + \dots = 0 \end{aligned}$$

- 抜き出した点が無理数である確率

$$(\text{区間 } (0, 1] \text{ 上の無理数全体}) = \mathbb{R}_{(0,1]} - \mathbb{Q}_{(0,1]}$$

を用いて求められる.

$$P(\mathbb{R}_{(0,1]} - \mathbb{Q}_{(0,1]}) = P(\mathbb{R}_{(0,1]}) - P(\mathbb{Q}_{(0,1]}) = 1 - 0 = 1$$

無理数全体は **可算でない** ため有理数のように成分毎の可算無限和では書けず, したがって (P.2) の性質を使って計算することはできない.

- 異なる区間の場合

“区間  $(0, 5]$  から無作為に一点抜き出す” 試行を考えたとき, その標本空間は  $\Omega = (0, 5]$  となる. この試行の確率測度は Lebesgue 測度  $\mu$  を定数倍 (正規化) し,

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{\mu(A)}{5}, A \in \mathcal{F}$$

とすることによって構成できる.

## 零集合

- 定義

空集合でない集合  $A$  でその事象が起こる確率が  $P(A) = 0$  となるものがある. こうした集合を **零集合 (null set)** と呼ぶ.

- 以下は等しくないことに注意 (有理数と無理数の例)

- 事象  $A$  の確率が 0 である
- 事象  $A$  に含まれる標本点が全く起こらない

## “ほとんど確実”

- 確率での特殊な言い回し

事象  $A = \{\omega | \alpha(\omega)\}$  の確率が 1 であるとき，“ほとんど確実に (almost surely)” あるいは “条件  $\alpha(\omega)$  が確率 1 で成り立つ” といい、以下のように書く。

$$\alpha(\omega) \text{ a.s.}$$

- 別の表現
  - 事象  $A$  の余事象  $A^c$  は零集合
  - 条件  $\alpha$  は成り立たないこともあるが、その確率は 0

## 演習

### 練習問題

- Buffon の針 (Buffon's needle) の問題を考えよ




図 2: Buffon の針

2次元平面上に等間隔  $d$  で平行線が引いてある。長さ  $l$  の針をこの平面上にランダムに落としたとき、平行線と交わる確率を求めよ。ただし  $l < d$  とする。

## 今回のまとめ

- 一般の確率空間
  - 有限集合と無限集合
  - 集合の濃度 (無限集合は更に分類される)
    - \* 可算集合: 自然数, 整数, 有理数

- \* 連続集合：無理数，実数
- 一般の確率測度と  $\sigma$ -加法性の関係
- Lebesgue 測度と Borel 集合族 (応用上重要な概念)
- “ほとんど確実に成り立つ”