

回帰分析

モデルの評価

村田 昇

講義概要

- 第1回：回帰モデルの考え方と推定
- 第2回：モデルの評価
- 第3回：モデルによる予測と発展的なモデル

回帰分析の復習

線形回帰モデル

- 目的変数を説明変数で説明する関係式を構成
 - 説明変数： x_1, \dots, x_p (p次元)
 - 目的変数： y (1次元)
- 回帰係数 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ を用いた一次式

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p$$

- 誤差項を含む確率モデルで観測データを表現

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

簡潔な表現のための行列

- デザイン行列 (説明変数)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix}$$

簡潔な表現のためのベクトル

- ベクトル (目的変数・誤差・回帰係数)

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$$

問題の記述

- 確率モデル

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \text{確率分布}$$

- 回帰式の推定: **残差平方和** の最小化

$$S(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$$

解の表現

- 解の条件: **正規方程式**

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

- 解の一意性: **Gram 行列** $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ が正則

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

最小二乗推定量の性質

- **あてはめ値** $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ は \mathbf{X} の列ベクトルの線形結合
- **残差** $\hat{\boldsymbol{\epsilon}} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ はあてはめ値 $\hat{\mathbf{y}}$ と直交

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}^\top \hat{\mathbf{y}} = 0$$

- 回帰式は説明変数と目的変数の **標本平均** を通過

$$\bar{\mathbf{y}} = (1, \bar{\mathbf{x}}^\top) \hat{\boldsymbol{\beta}}, \quad \bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i,$$

寄与率

- **決定係数** (R-squared)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- **自由度調整済み決定係数** (adjusted R-squared)

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n-p-1} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- 不偏分散で補正

日付	気温	降雨	日射	降雪	風向	風速	気圧	湿度	雲量
2023-09-01	29.2	0.0	24.01	0	SSE	4.3	1012.1	71	2.0
2023-09-02	29.6	0.0	22.07	0	SSE	3.1	1010.3	72	8.0
2023-09-03	29.1	3.5	18.64	0	ENE	2.8	1010.6	74	9.3
2023-09-04	26.1	34.0	7.48	0	N	2.6	1007.5	96	10.0
2023-09-05	29.3	0.0	22.58	0	S	3.5	1005.2	77	3.5
2023-09-06	27.5	0.5	13.17	0	SSW	2.6	1003.6	79	10.0
2023-09-07	27.0	0.5	11.01	0	ENE	2.5	1007.9	72	10.0
2023-09-08	21.9	107.5	2.10	0	NW	3.4	1007.8	98	10.0
2023-09-09	24.8	1.0	8.81	0	S	2.2	1006.8	93	7.5
2023-09-10	27.8	0.0	17.57	0	S	3.1	1009.1	83	6.3
2023-09-11	28.1	0.0	17.19	0	SSE	3.1	1010.1	79	9.0
2023-09-12	27.7	0.0	20.02	0	SSE	2.8	1010.0	76	4.8
2023-09-13	28.0	0.0	22.00	0	SE	2.4	1010.9	74	4.5
2023-09-14	28.2	0.0	14.54	0	SSE	2.8	1009.9	80	7.0
2023-09-15	27.4	10.5	9.21	0	NE	2.0	1010.9	88	8.5
2023-09-16	27.9	0.0	11.78	0	SSE	2.0	1011.5	86	10.0
2023-09-17	28.7	0.0	14.84	0	S	3.2	1011.5	80	4.0
2023-09-18	28.9	0.0	19.59	0	S	4.2	1011.6	74	1.8
2023-09-19	29.0	0.0	19.93	0	S	3.3	1010.1	72	2.3
2023-09-20	27.2	6.0	10.65	0	N	1.9	1009.3	82	8.3
2023-09-21	26.7	2.0	6.65	0	S	4.1	1006.7	87	9.5
2023-09-22	24.8	59.5	6.83	0	ENE	2.5	1008.1	93	10.0
2023-09-23	22.1	4.0	4.48	0	NE	2.6	1012.5	89	10.0
2023-09-24	22.2	0.0	15.81	0	N	3.0	1017.2	67	7.0
2023-09-25	22.4	0.0	15.49	0	N	2.5	1017.1	69	6.5
2023-09-26	24.6	0.0	16.08	0	NNW	2.0	1012.7	71	6.0
2023-09-27	25.3	0.0	11.59	0	SSE	1.9	1008.1	81	9.0
2023-09-28	27.4	0.0	14.03	0	ESE	1.9	1004.7	79	5.8
2023-09-29	26.3	0.0	10.11	0	SSE	3.0	1009.0	75	8.5
2023-09-30	25.6	0.0	7.98	0	S	2.5	1007.5	77	7.0

解析の事例

実データによる例

- 気象庁より取得した東京の気候データ (再掲)
 - 気象庁 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>
 - データ <https://noboru-murata.github.io/statistical-data-analysis2/data/data03.zip>

気温に影響を与える要因の分析

- データの概要
- 気温を説明する 5 種類の線形回帰モデルを検討
 - モデル 1: 気温 = F(気圧)
 - モデル 2: 気温 = F(日射)
 - モデル 3: 気温 = F(気圧, 日射)
 - モデル 4: 気温 = F(気圧, 日射, 湿度)

– モデル 5 : 気温 = F(気圧, 日射, 雲量)

分析の視覚化

- 関連するデータの散布図




Figure 1: 散布図

- モデル 1 の推定結果
- モデル 2 の推定結果
- モデル 3 の推定結果
- 観測値とあてはめ値の比較

モデルの比較

- 決定係数 (R^2 , Adjusted R^2)

あてはめ値の性質

あてはめ値

- さまざまな表現




Figure 2: モデル 1




Figure 3: モデル 2




Figure 4: モデル 3




Figure 5: モデルの比較

Characteristic	モデル 1		モデル 2		モデル 3		モデル 4		モデル 5	
	Beta	SE	Beta	SE	Beta	SE	Beta	SE	Beta	SE
気圧	-0.21	0.135			-0.36	0.090	-0.32	0.098	-0.36	0.092
日射			0.25	0.057	0.30	0.048	0.35	0.069	0.32	0.069
湿度							0.05	0.052		
雲量									0.05	0.151
R ²	0.082		0.414		0.632		0.644		0.633	
Adjusted R ²	0.049		0.393		0.604		0.603		0.591	

Abbreviations: CI = Confidence Interval, SE = Standard Error

$$\begin{aligned}
 \hat{y} &= X\hat{\beta} \\
 (\hat{\beta} &= (X^T X)^{-1} X^T y \text{ を代入}) \\
 &= X(X^T X)^{-1} X^T y \\
 (y &= X\beta + \epsilon \text{ を代入}) \\
 &= X(X^T X)^{-1} X^T X\beta + X(X^T X)^{-1} X^T \epsilon \\
 &= X\beta + X(X^T X)^{-1} X^T \epsilon
 \end{aligned}
 \tag{A}$$

- (A) あてはめ値は **観測値の重み付けの和** で表される
- (B) あてはめ値と観測値は **誤差項** の寄与のみ異なる

あてはめ値と誤差

- 残差と誤差の関係

$$\begin{aligned}
 \hat{\epsilon} &= y - \hat{y} \\
 &= \epsilon - X(X^T X)^{-1} X^T \epsilon \\
 &= (I - X(X^T X)^{-1} X^T) \epsilon
 \end{aligned}
 \tag{C}$$

- (C) 残差は **誤差の重み付けの和** で表される

ハット行列

- 定義

$$H = X(X^T X)^{-1} X^T$$

- ハット行列 H による表現

$$\begin{aligned}
 \hat{y} &= Hy \\
 \hat{\epsilon} &= (I - H)\epsilon
 \end{aligned}$$

- あてはめ値や残差は H を用いて簡潔に表現される

ハット行列の性質

- 観測データ (デザイン行列) のみで計算される
- 観測データと説明変数の関係を表す
- 対角成分 (**テコ比**; leverage) は観測データが自身の予測に及ぼす影響の度合を表す

$$\hat{y}_j = (H)_{jj}y_j + (\text{それ以外のデータの寄与})$$

- $(A)_{ij}$ は行列 A の (i, j) 成分
- テコ比が小さい: 他のデータでも予測が可能
- テコ比が大きい: 他のデータでは予測が困難

推定量の統計的性質

最小二乗推定量の性質

- 推定量と誤差の関係

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= (X^T X)^{-1} X^T y \\ &= (X^T X)^{-1} X^T (X\beta + \epsilon) \\ &= (X^T X)^{-1} X^T X\beta + (X^T X)^{-1} X^T \epsilon \\ &= \beta + (X^T X)^{-1} X^T \epsilon\end{aligned}$$

- 正規分布の重要な性質 (**再生性**)
正規分布に従う独立な確率変数の和は正規分布に従う

推定量の分布

- **誤差の仮定**: 独立, 平均 0 分散 σ^2 の正規分布
- 推定量は以下の多変量正規分布に従う

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{\beta}] &= \mathbb{E}[\beta + (X^T X)^{-1} X^T \epsilon] = \beta \\ \text{Cov}(\hat{\beta}) &= \mathbb{E}[(\hat{\beta} - \beta)(\hat{\beta} - \beta)^T] = \sigma^2 (X^T X)^{-1} \\ \hat{\beta} &\sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})\end{aligned}$$

- 通常 σ^2 は未知, 必要な場合には不偏分散で代用

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S}{n-p-1} = \frac{1}{n-p-1} \hat{\epsilon}^T \hat{\epsilon} = \frac{1}{n-p-1} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2$$

- これらの性質を利用してモデルの評価を行う

実習

誤差の評価

寄与率 (再掲)

- 決定係数 (R-squared)
 - 回帰式で説明できるばらつきの比率

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- 自由度調整済み決定係数 (adjusted R-squared)
 - 決定係数を不偏分散で補正

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n-p-1} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

各係数の推定量の分布

- 推定された回帰係数の精度を評価
 - 誤差 ϵ の分布は平均 0 分散 σ^2 の正規分布
 - $\hat{\beta}$ の分布 : $p+1$ 変量正規分布

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$$

- $\hat{\beta}_j$ の分布 : 1 変量正規分布

$$\hat{\beta}_j \sim \mathcal{N}(\beta_j, \sigma^2 ((X^T X)^{-1})_{jj}) = \mathcal{N}(\beta_j, \sigma^2 \zeta_j^2)$$

* $(A)_{jj}$ は行列 A の (j, j) (対角) 成分

標準誤差

- 標準誤差 (standard error)
 - $\hat{\beta}_j$ の標準偏差の推定量

$$\text{s.e.}(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma} \zeta_j = \sqrt{\frac{1}{n-p-1} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2} \cdot \sqrt{((X^T X)^{-1})_{jj}}$$

- 未知母数 σ^2 は不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ で推定
- $\hat{\beta}_j$ の精度の評価指標

実習

係数の評価

t 統計量

- 回帰係数の分布に関する定理

t 統計量 (t -statistic)

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\text{s.e.}(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma}\zeta_j}$$

は自由度 $n-p-1$ の t 分布に従う

- 証明には以下の性質を用いる
 - * $\hat{\sigma}^2$ と $\hat{\beta}$ は独立となる
 - * $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/(\sigma\zeta_j)$ は標準正規分布に従う
 - * $(n-p-1)\hat{\sigma}^2/\sigma^2 = S(\hat{\beta})/\sigma^2$ は自由度 $n-p-1$ の χ^2 分布に従う

t 統計量による検定

- 回帰係数 β_j が回帰式に寄与するか否かを検定
 - 帰無仮説 $H_0: \beta_j = 0$ (t 統計量が計算できる)
 - 対立仮説 $H_1: \beta_j \neq 0$
- p 値: 確率変数の絶対値が $|t|$ を超える確率
 - $f(x)$ は自由度 $n-p-1$ の t 分布の確率密度関数

$$(p \text{ 値}) = 2 \int_{|t|}^{\infty} f(x) dx \quad (\text{両側検定})$$

帰無仮説 H_0 が正しければ p 値は小さくならない

実習

モデルの評価

F 統計量

- ばらつきの比に関する定理

$\beta_1 = \dots = \beta_p = 0$ ならば F 統計量 (F -statistic)

$$F = \frac{\frac{1}{p} S_r}{\frac{1}{n-p-1} S} = \frac{n-p-1}{p} \frac{R^2}{1-R^2}$$

は自由度 $p, n-p-1$ の F 分布に従う

- 証明には以下の性質を用いる
 - * S_r と S は独立となる
 - * S_r/σ^2 は自由度 p の χ^2 分布に従う
 - * S/σ^2 は自由度 $n-p-1$ の χ^2 分布に従う

F 統計量を用いた検定

- 説明変数のうち 1 つでも役に立つか否かを検定
 - 帰無仮説 $H_0: \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$ (S_r が χ^2 分布になる)
 - 対立仮説 $H_1: \exists j \beta_j \neq 0$
- p 値: 確率変数の値が F を超える確率
 - $f(x)$ は自由度 $p, n-p-1$ の F 分布の確率密度関数

$$(p \text{ 値}) = \int_F^{\infty} f(x) dx \quad (\text{片側検定})$$

帰無仮説 H_0 が正しければ p 値は小さくならない

実習

補足

R: 診断プロット

- 回帰モデルのあてはまりを視覚的に評価
 - **Residuals vs Fitted:** あてはめ値 (予測値) と残差の関係
 - **Normal Q-Q:** 残差の正規性の確認
 - **Scale-Location:** あてはめ値と正規化した残差の関係
 - **Residuals vs Leverage:** 正規化した残差とレコ比の関係

などが用意されている

```
#' 関数 stats::lm() による推定結果の診断プロット
tw_lm6 <- lm(気温 ~ 気圧 + 日射 + 降雨, data = tw_subset)
#' 関数 ggfortify::autoplot() を利用する
#' 必要であれば 'install.packages("ggfortify")' を実行
library(ggfortify)
autoplot(tw_lm6)
#' 診断プロットは 1 から 6 まで用意されており 1, 2, 3, 5 がまとめて表示される
#' 個別に表示する場合は 'autoplot(tw_lm6, which = 1)' のように指定する
#' 詳細は '?ggfortify::autoplot.lm' を参照
```

次回の予定

- 第 1 回: 回帰モデルの考え方と推定
- 第 2 回: モデルの評価
- 第 3 回: モデルによる予測と発展的なモデル