



(a) 表4: 基底と成分数
(型1の98拍)



(b) 表8: 下降の扱いの改良案
(型3・3,378名)



(a) の記号=基底の族: ●=歪みガウス $\alpha \in [0, 8]$ (凍結版), ■=ガウス(歪みなし), △=歪みガウス $\alpha \in [-8, 8]$ (Basso 式), ◆=ガンマ(凍結の探索範囲), ▽=ガンマ(広い探索範囲). 数字=成分数(括弧内は予測の向きを持った層の数/層の数). 同じ族は成分数の順に細線で結ぶ. 記号が重なる ◆3 と ▽3, ◆4 と ▽4, ●2 と △2 は, 成分数と層の数が同じなので注釈を1つにまとめた.

(b) の記号: ○=下降を説明する項を足す, ●=下降を当てはめの対象から外す・残差の中で小さくする, ■(灰)=基準. 番号: (0) 凍結版, (2) 下限 0.01 s, (4) 貯留槽の項, (4c) 貯留槽 $\tau \geq 0.15$ s, (3) 指数減衰, (7) 出力側の畳み込み, (8) 2段階(逆畳み込み), (6b) 0.65T で打ち切る, (6c) 0.55T, (6d) 0.75T, (6e) 0.45 s で打ち切る, (9) 1次微分の領域. 番号の右の数字=予測の向きを持った層の数/層の数.

朱の点線=特徴点法(同梱)のC段の値. 灰の破線=基準 0.30.

(a) と (b) は対象が異なる: (a) は 120 名から取った型1(切痕あり)の98拍・4層(表4), (b) は型3(変曲点のみ)の3,378名・6層(表8). 縦軸はいずれも年齢層内 Spearman $|\rho|$ の中央値(C段). A段=その手法が採用した被験者だけ, B段=比べる全手法が採用した共通例, C段=採否を無視した全員探索・事後の解析であり, 判定には用いない. 改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る.