



(a) 表3: 基底と成分数
(型1の98拍)



(b) 表6: 下降の扱いの改良案
(型3・3,378 名)



(a) の記号=基底の族: ●=歪みガウス $\alpha \in [0, 8]$ (凍結版)、■=ガウス (歪みなし)、△=歪みガウス $\alpha \in [-8, 8]$ (Basso 式)、◆=ガンマ (凍結の探索範囲)、▽=ガンマ (広い探索範囲)。数字=成分数 (括弧内は予測の向きを持った層の数/層の数)。同じ族は成分数の順に細線で結ぶ。

(b) の記号: ○=下降を説明する項を足す、●=下降を当てはめ対象から外す・残差の中で小さくする、■ (灰)=基準。番号: (0) 凍結版、(2) 下限 0.01 s、(4) 貯留槽の項、(4c) 貯留槽 $\tau \geq 0.15$ s、(3) 指数減衰、(7) 出力側の畳み込み、(8) 2 段階 (逆畳み込み)、(6b) 0.65T で打ち切る、(6c) 0.55T、(6d) 0.75T、(6e) 0.45 s で打ち切る、(9) 1 次微分の領域。番号の右の数字=予測の向きを持った層の数/層の数。

朱の点線=特徴点法 (同梱) の C 段の値。灰の破線=規準 0.30。

(a) と (b) は対象が異なる: (a) は 120 名から取った型1 (切痕あり) の 98 拍・4 層 (表3)、(b) は型3 (変曲点のみ) の 3,378 名・6 層 (表6)。縦軸はいずれも年齢層内 Spearman $|\rho|$ の中央値 (C 段)。A 段=その手法が採用した被験者だけ、B 段=比べる全手法が採用した共通例、C 段=採否を無視した全員探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。