

À retenir : qu'est-ce qu'un acide, ici

Un **acide** (au sens de la nomenclature) est un composé dont la formule *commence par H*. On distingue :

- les **hydracides**, binaires et sans oxygène : H_nX (ex. HCl , H_2S) ;
- les **oxacides**, contenant de l'oxygène : H_nXO_m (ex. H_2SO_4 , HNO_3).

Un acide qui perd ses H^+ donne l'**anion** correspondant.

Méthode — hydracide : « [racine]-ure d'hydrogène »


On nomme H_nX « **[racine du non-métal]-ure d'hydrogène** » ; le nombre de H égale la valence de l'anion X. L'anion associé porte le suffixe **-ure** : $HCl \rightarrow$ chlorure Cl^- , $H_2S \rightarrow$ sulfure S^{2-} .

Méthode — oxacide : l'échelle hypo-/eux/-ique/per- et la règle des suffixes

Pour un même non-métal, on classe les oxacides par n.o. croissant de celui-ci. À chaque acide correspond un anion selon la **règle des suffixes** :

acide en **-eux** $\Rightarrow$ anion en **-ite** ; acide en **-ique** $\Rightarrow$ anion en **-ate**

les préfixes **hypo-** et **per-** se conservent (hypochloreux $\rightarrow$ hypochlorite ; perchlorique $\rightarrow$ perchlorate).



Exemple : les couples acide $\leftrightarrow$ anion à connaître

HNO_2 nitreux $\rightarrow$ nitrite NO_2^- ; HNO_3 nitrique $\rightarrow$ nitrate NO_3^- ; H_2SO_3 sulfureux $\rightarrow$ sulfite SO_3^{2-} ; H_2SO_4 sulfurique $\rightarrow$ sulfate SO_4^{2-} ; H_2CO_3 carbonique $\rightarrow$ carbonate CO_3^{2-} .

Piège : là où l'on perd des points

- **-eux donne -ite**, pas « -ate » : sulfureux $\rightarrow$ sulfite (et non sulfate).
- ne pas confondre NO_2^- (nitrite) et NO_3^- (nitrate) ; SO_3^{2-} (sulfite) et SO_4^{2-} (sulfate).
- les préfixes se gardent : hypochloreux $\rightarrow$ hypochlorite, perchlorique $\rightarrow$ perchlorate.

Remarque : le moyen mnémotechnique

« **-IQUE** donne **-ATE** ; **-EUX** donne **-ITE**. » L'acide sulfurique H_2SO_4 donne le sulfate SO_4^{2-} ; l'acide sulfureux H_2SO_3 donne le sulfite SO_3^{2-} .