

Beaucoup de solutés sont des **électrolytes** : dissous dans l'eau, ils se *dissocient* en ions. La concentration des *ions* produits n'est pas toujours celle du soluté : tout dépend de la **stœchiométrie** de la dissociation.

À retenir : électrolyte fort

Un **électrolyte fort** se dissocie **totale**ment en ions dans l'eau (sels solubles, acides forts HCl/HClO₄, bases fortes NaOH/Ba(OH)₂). Ce sont ces ions mobiles qui rendent la solution **conductrice** : plus elle est riche en ions, mieux elle conduit (l'eau pure, très peu dissociée, conduit très mal ; le glucose, non ionique, ne conduit pas).

À retenir : concentration des ions

Pour une dissociation $A_xB_y \longrightarrow xA + yB$ d'un électrolyte de concentration C :

$$\boxed{[A] = xC \quad [B] = yC}.$$

La concentration d'un ion est celle du sel **multipliée par son coefficient stœchiométrique**.



Méthode — mélange : plusieurs sources d'un même ion

Quand un ion provient de *plusieurs* sels (ou qu'on mélange plusieurs solutions) :

1. on calcule la *quantité de matière* de l'ion apportée par chaque source ($n = \text{coeff} \times C \times V$) ;
2. on **additionne** ces quantités ;
3. on **divise par le volume total** de la solution finale.

Piège : trois réflexes

- Ne pas oublier le **coefficient** : 1 mol de CaCl₂ libère 2 mol de Cl⁻.
- Distinguer une *quantité* (mol, à diviser par V) d'une *concentration* (mol L⁻¹, déjà ramenée au litre).
- Dans un mélange, diviser par le volume **total**, pas par un volume initial.