


Pour trouver l'image $A'B'$ d'un objet AB (petite flèche verticale, A sur l'axe) sans aucun calcul, on trace des **rayons particuliers**. Deux suffisent ; le troisième sert de vérification.

À retenir : les trois rayons particuliers d'une lentille mince

- (i) un rayon passant par le **centre optique** O n'est **pas dévié** ;
- (ii) un rayon **parallèle à l'axe** émerge en passant par le **foyer image** F' ;
- (iii) un rayon passant par le **foyer objet** F émerge **parallèle à l'axe**.

Le point où se croisent les rayons émergents est l'image B' du sommet ; A' est sa projection sur l'axe.




Méthode — construire et caractériser une image en 4 gestes

1. Tracer l'axe, la lentille, placer O , F , F' (et $2F$, $2F'$) et l'objet AB .
2. Choisir **deux** rayons particuliers issus du sommet B .
3. Leur intersection donne B' ; projeter sur l'axe pour A' .
4. **Caractériser** : réelle/virtuelle, droite/renversée, agrandie/réduite.

À retenir : lire la nature de l'image sur le dessin

- **Réelle** : les rayons émergents se croisent *vraiment*, de l'autre côté de la lentille (recueillable sur un écran). **Virtuelle** : seuls leurs *prolongements* (pointillés) se croisent, du même côté que l'objet.
- **Renversée** (pointe en bas) ou **droite** (même sens que l'objet).
- **Agrandie**, **réduite** ou de **même taille** selon la hauteur de $A'B'$.

Règle utile : une image *réelle* est toujours renversée ; une image *virtuelle* est toujours droite.



Piège : les réflexes qui trompent

- Le rayon (iii) part *de* F vers la lentille puis ressort parallèle : ne l'inverse pas.
- Une image **virtuelle** ne se pose *jamaïs* sur un écran : on la voit à l'œil, à travers la lentille.
- Une lentille **divergente** (objet réel) donne *toujours* une image virtuelle, droite et plus petite : inutile de chercher une image réelle.