
좀벌레 퇴치 가정용 매뉴얼

아이가 있는 집을 위한 퍼메트린 살충제 사용법

1 한눈에 보기

1. **한 달 간격으로 3번 뿌립니다.**
2. **손이 닿지 않는 틈새에만 뿌립니다.**
3. **아이와 반려동물이 없을 때 뿌립니다.**
4. **약이 다 마른 뒤에 들어옵니다.**



한 달 간격 3번 | **틈새에만** | **아이·동물은 밖으로** | **다 마른 뒤 입장**

2 퍼메트린, 실제로 얼마나 위험한가

퍼메트린은 사람에게 독성이 낮은 살충 성분입니다.

- 퍼메트린은 몸에 쌓이지 않습니다.
- 몸에 들어온 퍼메트린은 며칠 안에 소변으로 나갑니다.
- 피부로는 거의 흡수되지 않습니다.
- 퍼메트린 5% 크림은 생후 2개월 아기의 옴 치료에도 씁니다.
- 가정용 살충제의 농도는 이 크림보다 훨씬 낮습니다.
- 가장 흔한 부작용은 피부 따끔거림입니다.
- 분무 입자를 들이마시면 기침이 날 수 있습니다.
- 확인된 장기적 위험은 없습니다.

다만 아이는 어른보다 노출에 약합니다.

- 아이는 바닥을 기어 다닙니다.
- 아이는 손을 자주 입에 넣습니다.
- 영유아는 약을 분해하는 능력이 약합니다.

고양이와 물고기에게는 매우 위험합니다.

위험은 성분보다 뿌리는 방법에서 생깁니다.

3 이것만 조심하세요

- 아이와 반려동물을 내보낸 뒤 뿌립니다.
- 창문을 열고 뿌립니다.
- 마스크와 장갑을 씁니다.
- 공중에 안개처럼 뿌리지 않습니다.
- 이불, 베개, 옷, 장난감에는 뿌리지 않습니다.
- 2~4시간 환기한 뒤 방에 들어옵니다.
- 손이 닿는 바닥에 튄 약은 물걸레로 닦습니다.
- 약과 분무기는 아이 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.
- 고양이가 있는 집에서는 쓰지 않습니다.
- 어항이 있는 방에서는 뿌리지 않습니다.



공중 분사 | 이불·베개 | 고양이 있는 집 | 어항 있는 방

4 아이와 임산부는 이렇게

돌 전 아기

- 아기 침대에는 뿌리지 않습니다.
- 아기 매트리스에는 뿌리지 않습니다.
- 아기 매트리스는 세워서 말립니다.
- 아기는 다음 날 방에 들입니다.

1~3세 아이

- 아이 매트리스는 아랫면에만 뿌립니다.
- 아이가 노는 바닥에는 뿌리지 않습니다.
- 약이 다 마른 뒤 방에 들입니다.

천식·아토피가 있는 아이

- 끈끈이 트랩이나 붕산을 먼저 씁니다.
- 뿌린 날은 다른 방에서 재웁니다.

임산부

- 직접 뿌리지 않습니다.
- 다른 가족이 뿌립니다.
- 뿌리는 동안 집 밖에 있습니다.

5 준비물




압축분무기
스마토 SM-CS5L (5L)




퍼메트린 살충제
파비 (사진은 650ml 스프레이 제품)

제품 사진 출처: 다나와 상품 정보


- 바로 쓰는 완제품은 희석하지 않습니다.
- 원액 제품은 라벨의 희석 비율을 따릅니다.
- 분무기 노즐은 굵은 물줄기로 맞춥니다.




6 뿌리는 곳



① 걸레받이를 떼고 벽과 장판 사이 틈



② 옷장·가구 아래 틈




③ 냉장고 아래 앞쪽 틈



④ 매트리스 아랫면에 가볍게

- 걸레받이를 떼고 벽과 장판 사이 틈에 뿌립니다.
- 옷장 아래와 뒤에 뿌립니다.
- 가구 틈 전부에 뿌립니다.
- 침대 아래에 뿌립니다.
- 냉장고 아래와 옆 틈에 뿌립니다.
- 어른 매트리스는 솔기와 옆면에 가볍게 뿌립니다.
- 아이 매트리스는 아랫면에만 가볍게 뿌립니다.
- 매트리스는 하루 말린 뒤 씁니다.

7 일정



- 좀벌레 알은 2~8주 뒤에 깨어납니다.
- 그래서 한 달 간격으로 3번 뿌립니다.
- 끈끈이 트랩에 2주 동안 안 잡히면 끝입니다.
- 습도를 50% 이하로 유지해야 다시 생기지 않습니다.

8 사고가 나면

- 피부에 묻으면 비누로 씻습니다.
- 눈에 들어가면 흐르는 물로 15분 헹굽니다.
- 아이가 마셨으면 억지로 토하게 하지 않습니다.
- 제품 병을 들고 바로 병원에 갑니다.
- 숨이 차면 119에 연락합니다.

이 매뉴얼은 의사의 진료를 대신하지 않습니다.