좀벌레 퇴치 가정용 매뉴얼

아이가 있는 집을 위한 퍼메트린 살충제 사용법

1 한눈에 보기

1. 퍼메트린 살충제를 한 달 간격으로 3번 뿌립니다.

2. 사람 손이 닿지 않는 틈새에만 뿌립니다.

3. 아이와 반려동물이 없을 때 뿌립니다.

4. 약이 다 마른 뒤에 방에 들어옵니다.

5. 실내 습도를 낮춰야 다시 생기지 않습니다.



한 달 간격 3번 | 틈새에만 | 아이·동물은 밖으로 | 다 마른 뒤 입장 | 습도 50% 이하

2 퍼메트린은 사람에게 어떤가

퍼메트린은 사람 몸에 쌓이지 않습니다.

퍼메트린은 포유류에 대한 독성이 낮은 살충 성분입니다.

위험은 성분보다 뿌리는 방법에서 생깁니다.

항목	내용
체내 축적	• 간과 혈액의 효소가 퍼메트린을 빠르게 분해합니다. • 분해된 물질은 대부분 며칠 안에 소변으로 나갑니다. • DDT처럼 지방에 오래 남는 성분이 아닙니다.
피부 흡수	• 퍼메트린은 피부로 거의 흡수되지 않습니다.
의약품 사용	• 퍼메트린 5% 크림은 옴 치료제입니다. • 이 크림은 생후 2개월 이상 아기의 피부에도 바릅니다. • 가정용 살충제의 퍼메트린 농도는 이보다 훨씬 낮습니다.

급성 증상	• 피부가 따끔거리거나 가려울 수 있습니다. • 눈, 코, 목이 따가울 수 있습니다. • 천식이 있는 아이는 기침을 할 수 있습니다. • 이런 증상은 주로 분무 입자를 직접 들이마셨을 때 생깁니다.
장기 영향	• 확정된 장기 영향은 없습니다. • 아이의 행동 문제와의 관련을 살핀 연구가 있습니다. • 그 연구들의 결과는 서로 엇갈립니다. • 미국 환경보호청은 퍼메트린을 “먹었을 때 발암 가능성 있음”으로 분류했습니다. • 이 분류는 고용량을 먹인 동물실험에 근거합니다. • 국제암연구소는 퍼메트린을 “발암성 분류 불가”로 봅니다.
아이가 더 민감한 이유	• 아이는 체중에 비해 노출량이 큽니다. • 아이는 바닥을 기어 다닙니다. • 아이는 손을 자주 입에 넣습니다. • 영유아는 약을 분해하는 효소가 덜 발달했습니다.
고양이	• 퍼메트린은 고양이에게 매우 위험합니다. • 고양이는 소량에도 경련을 일으킬 수 있습니다.

수치와 분류는 일반적인 의학·규제 자료를 정리한 것입니다.

이 매뉴얼은 의사의 진료를 대신하지 않습니다.

3 나이별·가족별 기준

가정용 살충제에는 법적인 나이 제한이 없습니다.

아래 표는 이 매뉴얼의 안전 기준입니다.

제품 라벨의 주의 문구가 더 엄격하면 라벨을 따릅니다.

대상	뿌리는 곳	들어오는 시점	추가 수칙
돌 전 아기 (0~12개월)	• 틈새만 • 아기 침대 제외 • 아기 매트리스 제외	가능하면 다음 날	• 아기 매트리스는 세워서 말립니다. • 아기 매트리스는 햇볕에 말립니다.
기고 걷는 아이 (1~3세)	• 틈새 • 가구 아래 • 아이 매트리스 아랫면	약이 다 마른 뒤 (최소 2~4시간)	• 손 닿는 바닥에 묻은 약은 물걸레로 닦습니다. • 장난감에 묻은 약은 물로 씻습니다.
3세 이상	이 매뉴얼의 뿌리는 곳 전부	약이 다 마른 뒤	• 뿌린 틈새에 손을 넣지 않도록 알려줍니다.
천식·아토피가 있는 아이	• 틈새만 • 최소량	다음 날 권장	• 붕산, 규조토, 끈끈이 트랩을 먼저 씁니다. • 살충제는 보조로만 씁니다.
임산부	직접 뿌리지 않습니다.	약이 다 마른 뒤	• 다른 가족이 뿌립니다. • 뿌리는 동안 집 밖에 있습니다.
고양이	**퍼메트린 사용 금지**	—	• 퍼메트린이 없는 방법을 씁니다.
강아지	틈새만	다 마른 뒤	• 뿌린 곳을 핥지 않게 합니다.
어항 물고기	같은 방에서는 뿌리지 않습니다.	—	• 불가피하면 어항을 덮습니다. • 뿌리는 동안 기포기를 끕니다.

4 준비물



압축분무기
예: 스마토 SM-CS5L



퍼메트린 살충제 1L
예: 파비 1L 리필용

그림은 이해를 돕기 위한 예시입니다.


실제 제품의 모양과 색은 다를 수 있습니다.



KF94 마스크 **니트릴 장갑** **끈끈이 트랩** **제습기**

항목	내용
살충제	• 퍼메트린 성분의 가정용 살충제를 씁니다. • 환경부 승인을 받은 살생물제품인지 확인합니다. • 예: 파비 1L 리필용
라벨 확인	• 유효성분이 퍼메트린인지 확인합니다. • 대상 해충에 좀벌레가 있는지 확인합니다. • 사용 장소와 주의 문구를 읽습니다.
희석	• 바로 쓰는 완제품은 희석하지 않습니다. • 원액 제품은 라벨의 희석 비율을 따릅니다.
분무기	• 압축분무기를 씁니다. • 예: 스마토 압축분무기 SM-CS5L
보호구	• KF94 마스크 • 니트릴 장갑
재발 방지용	• 제습기 • 습도계 • 끈끈이 트랩

분무기 설정




- 노즐은 굵은 물줄기로 맞춥니다.
- 미세한 안개는 공기 중에 퍼집니다.
- 공기 중에 퍼진 약은 숨으로 들어옵니다.
- 분무기 통에 “살충제 전용”이라고 크게 적습니다.
- 이 분무기는 화분 물주기나 청소에 쓰지 않습니다.
- 그날 쓸 양만 통에 넣습니다.
- 집 한 채의 틈새에는 보통 0.5~1L면 충분합니다.

5 뿌리는 곳과 방법


좀벌레는 어둡고 습한 틈에 숨어 삽니다.

틈새가 충분히 젖을 만큼 뿌립니다.


바닥에 약이 고일 만큼 뿌리지는 않습니다.




① 걸레받이를 떼고 벽과 장판 사이 틈



② 옷장·가구 아래 틈



③ 냉장고 아래 앞쪽 틈



④ 매트리스 아랫면에 가볍게

장소	방법	주의
걸레받이 안쪽 (장판과 벽 사이)	• 걸레받이 아래쪽을 엽니다. • 장판과 벽 사이 틈을 따라 충분히 뿌립니다.	• 가장 효과가 큰 곳입니다. • 약이 다 마른 뒤 걸레받이를 닫습니다.
옷장 아래·뒤	• 바닥과 옷장 사이 틈에 뿌립니다.	• 옷이 걸린 옷장 안쪽에는 뿌리지 않습니다.
가구 틈	• 가구 아래에 뿌립니다. • 가구와 벽 사이에 뿌립니다.	• 아이 손이 닿는 가구 표면은 피합니다.
침대 아래	• 침대 프레임에 뿌립니다. • 침대 아래 바닥에 뿌립니다.	• 이불과 베개에 튀지 않게 합니다.

냉장고 아래·옆	• 바닥 쪽 틈만 노려 뿌립니다.	• 뒷면 컴프레서에는 뿌리지 않습니다. • 전기 부품에는 뿌리지 않습니다.
어른 매트리스	• 솔기에 가볍게 뿌립니다. • 테두리와 옆면에 가볍게 뿌립니다.	• 매트리스를 적시지 않습니다. • 하루 동안 말립니다. • 방수 커버를 씌운 뒤 씁니다.
아이 매트리스 **(1세 이상)**	• 아랫면에만 가볍게 뿌립니다.	• 하루 동안 말립니다. • 나중에 뒤집어 쓰지 않습니다. • 뿌린 면에 테이프로 표시합니다.
아기 매트리스 **(돌 전)**	• 뿌리지 않습니다.	• 세워서 말립니다. • 햇볕에 말립니다. • 바닥에 바로 깔지 않습니다.

매트리스에서 나오는 1~2mm의 작은 벌레는 먼지다듬이일 수 있습니다.

먼지다듬이는 습기 때문에 생깁니다.

먼지다듬이가 나오면 매트리스를 세워서 말리는 것이 특히 중요합니다.


6 일정: 한 달 간격 3회

한 번 뿌리면 어른 벌레는 죽습니다.

하지만 알은 살아남습니다.

좀벌레 알은 2~8주 뒤에 깨어납니다.

그래서 한 달 간격으로 3번 뿌립니다.



시기	할 일
1회차	• 뿌리는 곳 전부에 뿌립니다. • 같은 날 끈끈이 트랩을 놓습니다. • 같은 날 제습을 시작합니다.
2회차 (한 달 뒤)	• 같은 곳에 다시 뿌립니다. • 트랩에 잡힌 수를 적어 둡니다.
3회차 (두 달 뒤)	• 같은 곳에 마지막으로 뿌립니다.
확인 (석 달 뒤)	• 2주 동안 트랩에 한 마리도 없으면 퇴치 완료입니다. • 계속 잡히면 습도부터 다시 점검합니다. • 습도를 낮춘 뒤 한 번 더 뿌립니다.

뿌린 직후에는 벌레가 더 자주 보일 수 있습니다.

약에 닿은 벌레가 틈에서 기어 나오기 때문입니다.

퍼메트린은 벌레를 서서히 죽입니다.

며칠 동안 지켜봅니다.

7 안전 수칙



뿌리기 전

- [ ] 아이를 외출시키거나 다른 방으로 보냅니다.
- [ ] 임산부도 다른 곳으로 갑니다.
- [ ] 반려동물을 다른 곳으로 옮깁니다.
- [ ] 장난감을 치웁니다.
- [ ] 젖병과 식기를 치웁니다.
- [ ] 음식을 치웁니다.
- [ ] 어항이 있으면 덮습니다.
- [ ] 마스크를 씁니다.
- [ ] 장갑을 낍니다.

뿌리는 중

- [ ] 창문을 엽니다.
- [ ] 틈새 가까이에서 뿌립니다.
- [ ] 공중에는 뿌리지 않습니다.
- [ ] 피부에 묻으면 바로 비누로 씻습니다.

뿌린 뒤

- [ ] 최소 2~4시간 동안 환기합니다.
- [ ] 매트리스는 하루 동안 말립니다.
- [ ] 뿌린 틈새는 닦지 않습니다.
- [ ] 틈새에 남은 약이 효과를 이어 갑니다.
- [ ] 손 닿는 바닥에 튄 약은 물걸레로 닦습니다.
- [ ] 손과 얼굴을 비누로 씻습니다.
- [ ] 입었던 옷은 따로 빨래합니다.
- [ ] 분무기를 물로 헹굽니다.
- [ ] 헹군 물은 처리한 틈새에 뿌립니다.
- [ ] 헹군 물은 하수구에 버리지 않습니다.

퍼메트린은 물고기에게 독성이 강합니다.

보관

- 살충제 병은 잠금 수납장에 둡니다.
- 잠금 수납장이 없으면 아이 손이 닿지 않는 높은 곳에 둡니다.
- 분무기는 물통처럼 보입니다.
- 아이가 분무기를 장난감으로 착각할 수 있습니다.
- 약이 든 채로 분무기를 두지 않습니다.
- 약을 다른 병에 옮겨 담지 않습니다.
- 음료수 병에는 절대 옮겨 담지 않습니다.

8 재발 방지

실내 습도를 50% 이하로 유지하는 것이 가장 중요합니다.

습도가 높으면 3번을 다 뿌려도 다시 생깁니다.

항목	방법
습도	• 제습기를 돌립니다. • 습도계로 습도를 확인합니다. • 욕실을 자주 환기합니다. • 싱크대 아래를 자주 환기합니다.
매트리스	• 바닥에 바로 깔지 않습니다. • 매트리스 밑에 받침을 둡니다. • 한 달에 한 번은 세워서 말립니다.
먹이 제거	• 좀벌레는 종이, 풀, 먼지를 먹습니다. • 오래된 종이 상자를 버립니다. • 쌓아 둔 신문과 책을 정리합니다.
감시	• 끈끈이 트랩을 걸레받이 옆에 계속 둡니다. • 끈끈이 트랩을 가구 아래에 계속 둡니다. • 다시 잡히기 시작하면 한 번 더 뿌립니다.
보조 수단	• 붕산이나 규조토를 걸레받이 안쪽에 얇게 뿌립니다. • 붕산과 규조토는 효과가 오래갑니다. • 붕산과 규조토도 아이 손이 닿지 않는 곳에만 둡니다.

9 하지 말 것과 응급 대처

하지 말 것


고양이 있는 집


공중 분사



이불·베개


아기 침대


어항 있는 방

- 고양이가 있는 집에서는 퍼메트린을 쓰지 않습니다.
- 공중에 안개처럼 뿌리지 않습니다.
- 방 전체에 뿌리지 않습니다.
- 이불과 베개에 뿌리지 않습니다.
- 옷에 뿌리지 않습니다.
- 장난감에 뿌리지 않습니다.
- 식탁에 뿌리지 않습니다.
- 돌 전 아기의 침대에 뿌리지 않습니다.
- 돌 전 아기의 매트리스에 뿌리지 않습니다.
- 아이가 자는 방에서 뿌리지 않습니다.
- 여러 살충제를 섞어 쓰지 않습니다.

응급 대처


피부는 비누로


바깥 공기로


제품 병 챙기기



숨차면 119

상황	바로 할 일
피부에 묻음	• 비누와 물로 씻습니다. • 따끔거림은 보통 하루 안에 사라집니다.
눈에 들어감	• 흐르는 물로 15분 이상 헹굽니다. • 통증이 남으면 안과에 갑니다.
들이마셔서 기침·쌕쌕거림	• 바로 바깥 공기가 있는 곳으로 나갑니다. • 숨이 차면 119에 연락합니다.
아이가 마시거나 핥음	• 억지로 토하게 하지 않습니다. • 제품 병을 챙깁니다. • 바로 병원에 가거나 119에 연락합니다.
고양이가 노출됨	• 떨림이 보이면 바로 동물병원에 갑니다. • 침을 흘려도 바로 동물병원에 갑니다.

병원에 갈 때는 제품 병을 꼭 챙깁니다.

라벨의 성분과 함량이 치료에 필요합니다.