

## Teorema de la función implícita

Antes de enunciar el teorema usamos la siguiente convención: usamos letras negritas  $\mathbf{x}, \mathbf{z}$  para denotar vectores y letras normales,  $x, z$  para denotar escalares.

**Teorema 1.** Sea  $U$  un abierto de  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  que contenga al punto  $(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0)$  y sea  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función de clase  $C^1$  en  $U$ . Nota: a los puntos de primer  $\mathbb{R}^n$  los vamos a denotar  $\mathbf{x}$  y a los puntos del segundo  $\mathbb{R}^m$  los vamos a denotar  $\mathbf{z}$ .

Supongamos que  $F(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) = 0$  y que la función lineal dada por

$$L(\mathbf{z}) = D_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0)} F(0, \mathbf{z}), \mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$$

es una función inyectiva, de  $\mathbb{R}^m$  a  $\mathbb{R}^m$ .

Entonces existe una vecindad de  $\mathbf{x}_0$  en  $\mathbb{R}^n$ , denotada  $W$  y una función de clase  $C^1$ ,  $G : W \rightarrow \mathbb{R}^m$  tal que  $G(\mathbf{x}_0) = \mathbf{z}_0$  y, para toda  $\mathbf{x} \in W$ ,  $F(\mathbf{x}, G(\mathbf{x})) = 0$ .

### Notas

1. Este enunciado generaliza el Teorema del Marsden. En el caso del Marsden  $m = 1$  en para este caso la función  $L$  es simplemente multiplicar por  $\partial_z F(\mathbf{x}_0, z_0)$ , la cual es inyectiva si  $\partial_z F(\mathbf{x}_0, z_0) \neq 0$ .
2. La condición de que la transformación lineal  $L(\mathbf{z}) = D_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0)} F(0, \mathbf{z})$  sea inyectiva se puede reescribir usando un determinante, pero se necesita algo de notación.

Para  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  escribimos  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  y a los puntos  $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$  los escribimos  $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_m)$ . A las funciones coordenadas de  $F$  las escribimos  $F = (f_1, \dots, f_m)$ , así que cada función  $f_i$  se evalúa en  $f_i(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m)$ .

La condición de que  $L$  sea inyectiva es equivalente a pedir que el determinante de la siguiente matriz sea distinto de cero

$$\begin{bmatrix} \partial_{z_1} f_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) & \cdots & \partial_{z_m} f_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{z_1} f_m(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) & \cdots & \partial_{z_m} f_m(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) \end{bmatrix}$$

3. El teorema de la función implícita se puede leer de la siguiente forma. Sean  $f_1, \dots, f_m$  funciones de clase  $C^1$ , definidas en un abierto de  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  y supongamos que tenemos escalares  $x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, z_1^{(0)}, \dots, z_m^{(0)}$  que satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} f_1(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, z_1^{(0)}, \dots, z_m^{(0)}) &= 0 \\ f_2(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, z_1^{(0)}, \dots, z_m^{(0)}) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, z_1^{(0)}, \dots, z_m^{(0)}) &= 0 \end{aligned}$$

Denotemos  $\mathbf{x}_0 = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$  y  $\mathbf{z}_0 = (z_1^{(0)}, \dots, z_m^{(0)})$ . Entonces, si

$$\det \begin{bmatrix} \partial_{z_1} f_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) & \cdots & \partial_{z_m} f_1(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{z_1} f_m(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) & \cdots & \partial_{z_m} f_m(\mathbf{x}_0, \mathbf{z}_0) \end{bmatrix} \neq 0$$

entonces podemos resolver el siguiente sistema, de manera única, para las  $z'$ s en términos de las  $x'$ s:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \\ f_2(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \end{aligned}$$

para cuando las  $(x_1, \dots, x_n)$  están cerca de  $\mathbf{x}_0$ .