

# Mobile Robotics - Übungsblatt 3

16. Mai 2012

Stefan Wrobel, Viktor Kurz  
{wrobels,kurzv}@informatik.uni-freiburg.de

## Aufgabe 1:

(a)(b)

siehe m-files

## Aufgabe 2:

Gegeben:

$$p(app\_blue|blue) = 0.75$$

$$p(app\_green|blue) = 0.25$$

$$p(app\_blue|green) = 0.25$$

$$p(app\_green|green) = 0.75$$

Daraus ergibt sich:

$$p(blue|app\_blue) = \frac{p(app\_blue|blue) \cdot p(blue)}{p(app\_blue|blue) \cdot p(blue) + p(app\_blue|green) \cdot p(green)}$$

bzw.

$$p(green|app\_blue) = \frac{p(app\_blue|green) \cdot p(green)}{p(app\_blue|blue) \cdot p(blue) + p(app\_blue|green) \cdot p(green)}$$

(a)

Nein, es ist nicht möglich zu bestimmen, welche Farbe das Auto wahrscheinlich hat. Hierzu ist die Information notwendig, wie viele blaue bzw. grüne Autos es insgesamt gibt, also  $P(\text{green})$  und  $P(\text{blue})$ .

(b)

$$p(\text{blue}) = 0.1, p(\text{green}) = 0.9$$

Eingesetzt:

$$p(\text{blue}|\text{app\_blue}) = \frac{0.75 \cdot 0.1}{0.75 \cdot 0.1 + 0.25 \cdot 0.9} = \frac{0.075}{0.075 + 0.225} = 0.25$$

bzw.

$$p(\text{green}|\text{app\_blue}) = \frac{0.25 \cdot 0.9}{0.75 \cdot 0.1 + 0.25 \cdot 0.9} = 0.75$$

Das heißt, das Auto ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% blau bzw. 75% grün.

(c)

$$p(\text{blue}) = 0.3, p(\text{green}) = 0.7$$

Eingesetzt:

$$p(\text{blue}|\text{app\_blue}) = \frac{0.75 \cdot 0.3}{0.25 \cdot 0.7 + 0.75 \cdot 0.3} = \frac{0.225}{0.175 + 0.225} = 0.56$$

bzw.

$$p(\text{green}|\text{app\_blue}) = \frac{0.25 \cdot 0.7}{0.25 \cdot 0.7 + 0.75 \cdot 0.3} = \frac{0.175}{0.175 + 0.225} = 0.44$$

Das heißt, das Auto ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 44% blau bzw. 56% grün.

### Aufgabe 3:

(a)(b)

Gesucht:

$$p(x_t = \text{dirty} | z_t = \text{clean}, u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean})$$

Das Ziel soll sein, dass der Raum durch den Roboter tatsächlich gereinigt wird.

Daher wird pessimistisch die Annahme getroffen, dass der Raum zum Zeitpunkt  $t - 1$  schmutzig war.

D.h.:  $\text{Bel}(x_{t-1} = \text{dirty}) = 1$  bzw.  $\text{Bel}(x_{t-1} = \text{clean}) = 0$ .

Umso höher die Wahrscheinlichkeit angenommen wird, dass der Raum bereits zum Zeitpunkt  $t - 1$  bereits gereinigt war, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Zeitpunkt  $t$  der Raum noch schmutzig ist. Insbesondere wird bei  $\text{Bel}(x_{t-1} = \text{dirty}) = 0$  bzw.  $\text{Bel}(x_{t-1} = \text{clean}) = 1$  die Wahrscheinlichkeit  $p(x_t = \text{dirty} | z_t = \text{clean}, u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}) = 0$ .

Rechnung mit  $\text{Bel}(x_{t-1} = \text{dirty}) = 1$  ergibt:

$$\begin{aligned} p(x_t = \text{dirty} | z_t = \text{clean}, u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}) \\ = \text{Bel}(x_t = \text{dirty}) \end{aligned}$$

$$= \eta \cdot p(z_t = \text{clean} | x_t = \text{dirty}) \cdot (p(x_t = \text{dirty} | u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}, x_{t-1} = \text{dirty})$$

$$\cdot \text{Bel}(x_t = \text{dirty}) + p(x_t = \text{dirty} | u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}, x_{t-1} = \text{clean}) \cdot \text{Bel}(x_t = \text{clean}))$$

$$= \eta \cdot 0.3 \cdot [0.3 \cdot 1 + 0 \cdot 0] = \eta \cdot 0.09$$

Analog:

$$\begin{aligned} p(x_t = \text{clean} | z_t = \text{clean}, u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}) \\ = \text{Bel}(x_t = \text{clean}) \end{aligned}$$

$$= \eta \cdot p(z_t = \text{clean} | x_t = \text{clean}) \cdot p(x_t = \text{clean} | u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}, x_{t-1} = \text{dirty})$$

$$\cdot \text{Bel}(x_t = \text{dirty}) + p(x_t = \text{clean} | u_{t-1} = \text{vac} - \text{clean}, x_{t-1} = \text{clean}) \cdot \text{Bel}(x_t = \text{clean})$$

$$= \eta \cdot 0.9 \cdot [0.7 \cdot 1 + 1 \cdot 0] = \eta \cdot 0.63$$

Daraus ergibt sich für  $\eta$ :

$$\eta = \frac{1}{0.09 + 0.63} = 1.39$$

Somit ist  $\text{Bel}(x_t = \text{dirty}) = 0.125$  und  $\text{Bel}(x_t = \text{clean}) = 0.875$