



Ёш болалардаги метеоризм, қорин дам бўлиши, қабзиятни олдини олишда



Ошқозондаги оғирлик, ичаклардаги тез-тез бўлувчи санчиқлар ва спазмларни олдини олишда



Асабни тинчлантиради ва уйқуни яхшилайди, безовталикни йўқотади



Иштахани оширишда ва хазм жараёнини яхшилашда



Сийдик ҳайдовчи, балғам кўчирувчи ва спазмолитик таъсирларга эга



Чақолоқ ва ёш болаларни ичи келишида



Болаларда иммунитетни оширишда



Қорин бўшлиғи аъзолари силлиқ мушаклар спазмларида



Буйраклар, жигар ва ўт қопи фаолиятини нормаллаштиришда



Терида аллергик тошмаларда яхши самарадор



## Қўллаш усули ва дозалари



Янги туғилган чақалоқларга 1-1,5 мл 3 махал



1 ёшгача 2,5 мл.дан 2-3 маҳал овқатланишлар орасида



ёшдан 6 ёшгача 5 мл<u>.д</u>ан 2-3 маҳал овқатдан олдин



6 ёшдан катта болаларга 10 мл дан 2-3 махал

## Қарши кўрсатмалар

- Махсулот таркибига индивидуал сезгирлик
- Эпилептик синдромда





При профилактике метеоризма детей раннего возраста, избыточное скопление газов в желудочнокишечном тракте, запоров



При профилактике тяжести в желудке, частых коликов и спазмов кишечника



Успокаивает нервную систему и улучшает сон, снимает повышенное возбуждение и эмоциональность



Повышение аппетита и улучшение пищеварения



Обладает мочегонным, отхаркивающим и спазмолитическим действием



При стуле у младенцев и детей раннего возраста



Повышение иммунитета у детей



При спазмах органов брюшной полости и гладкой мускулатуры



Нормализация деятельности почек, печени и желчного пузыря



Эффективен при аллергических высыпаниях на коже



## Применение и дозирование



1-1,5 мл 3 раза в день для новорожденных



До 1-го года по 2,5 мл 2-3 раза в день между кормлениями



Детям от 1 года до 6-лет - по 5 мл 2-3 раза в день до еды



10 мл 2-3 раза в день детям старше 6 лет

## Противопоказание

- Индивидуальная реакция на компонентов препарата
- При эпилептическом синдроме