





Қўллаш учун кўрсатмалар:

Чақалоқ ва ёш болалардаги метеоризм, қорин дам бўлиши, қабзиятни олдини олишда;

Чақалоқ ва ёш болалардаги ошқозондаги оғирлик, ичаклардаги

тез-тез бўлувчи санчиклар ва спазмларни олдини олишда;

Нерв системасини тинчлантиради ва уйкуни яхшилайди, безовталикни йўкотади;

Бола иштахасини рағбатлантиришда, оширишда ва хазм жараёнини яхшилашда;

Чақолоқ ва ёш болалардаги ичини яшил келишида;

Сийдик хайдовчи, балғам кўчирувчи ва спазмолитик таъсирларга эга;

Буйраклар, жигар ва ўт қопини

фаолиятини

нормаллаштиришда;

Терида аллергик тошмаларда

яхши самарадор;

Болалардаги иммунитетни

оширишда;

Қорин бўшлиғи аъзолари силлиқ мушаклар

силлиқ мушаклар спазмларида.

Қарши кўрсатмалар:

Махсулот таркибига индивидуал сезгирлик; Эпилептик синдромда.

Қўллаш усули ва дозалари:

Янги туғилган чақалоқларга 15 томчидан 3 маҳал; 1 ёшгача 2,5 мл.дан 2-3 маҳал овқатланишлар орасида; 1 ёшдан 6 ёшгача 5 мл.дан 2-3 маҳал овқатдан олдин; 6 ёшдан катта болаларга

10 мл дан 2-3 махал. **Хажми:** 50мл

ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй.

73 240 00 30 99 401 30 00 alximik.uz info@alximik.uz







Можно детям от



Инструкции по использованию:

При профилактике метеоризма у младенцев и детей раннего возраста, избыточное скопление газов в желудочно-кишечном тракте, запоров;

При профилактике тяжести в желудке, частых коликов и спазмов кишечника

у новорожденных и детей раннего возраста;

Успокаивает нервную систему и улучшает сон, снимает

повышенное возбуждение и эмоциональность;

Стимулирование и повышение аппетита ребенка и для улучшения пищеварения;

Зеленый стул у младенцев и детей раннего возраста;

Обладает мочегонным,

отхаркивающим

и спазмолитическим действием; Нормализация деятельности почек,

печени и желчного пузыря; Эффективен при аллергических

эффективен при аллергических высыпаниях на коже;

Повышение иммунитета у детей; При спазмах органов брюшной полости и гладкой мускулатуры.

Противопоказание:

Индивидуальная реакция на компонентов препарата; При эпилептическом синдроме.

Применение и дозирование:

15 капель 3 раза в день для новорожденных; До 1-го года по 2,5 мл 2-3 раза в день между кормлениями; Детям от 1 года до 6-лет - по 5 мл 2-3 раза в день до еды; 10 мл 2-3 раза в день детям старше 6 лет.

Объём: 50мл

000 "ALKIMYOGAR FARM"

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43. 73 240 00 30 alximik.uz 99 401 30 00 info@alximik.uz

