

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Matija Kocbek

**REDKEJŠI GRAFI Z VELIKIM  
KROMATIČNIM ŠTEVILOM**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: prof. dr. Riste Škrekovski

Ljubljana, 2025



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Grafi brez trikotnikov s poljubno velikim kromatičnim številom</b>	<b>8</b>
2.1	Tuttova konstrukcija . . . . .	8
2.2	Konstrukcija Mycielskega . . . . .	9
2.3	Zamični grafi . . . . .	11
2.4	Ramseyjevi grafi . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Grafi s poljubno veliko ožino in poljubno velikim kromatičnim številom</b>	<b>12</b>



# Redkejši grafi z velikim kromatičnim številom

POVZETEK

...

# Sparse graphs with high chromatic number

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...



# 1 Uvod

Grafi ponazarjajo relacije med različnimi objekti. Kromatično število nam pove, kako težko je razbiti graf na množice vozlišč, ki med seboj nimajo nobene povezave. Z drugimi besedami, pove nam, kakšno je minimalno število neodvisnih množic, ki jih potrebujemo, da lahko graf razbijemo na neodvisne množice.

**Definicija 1.1.** Naj bo  $G = (V, E)$  (neusmerjen) graf. Naj bo  $K$  poljubna neprazna množica moči  $k$ . Tedaj preslikavi  $c : V \rightarrow K$  pravimo  $k$ -barvanje vozlišč grafa  $G$ . Če sta poljubni sosednji vozlišči v  $G$  pobarvani z različnimi barvami, tj. če za sosednji  $u$  in  $v$  velja, da je  $c(u) \neq c(v)$ , potem pravimo, da je takšno  $k$ -barvanje dobro. Kromatično število  $G$  je najmanjše število  $k$ , za katerega obstaja dobro  $k$ -barvanje grafa  $G$ . Označimo ga z  $\chi(G)$ .

**Definicija 1.2.** Naj bo  $G = (V, E)$  in  $H \subseteq V$ . Če nobeni dve vozlišči iz  $H$  nista med seboj povezani, pravimo, da je  $H$  neodvisna množica. Velikost neodvisne množice z največjo močjo imenujemo neodvisnostno število grafa  $G$  in ga označimo z  $\alpha(G)$ .

Kromatično in neodvisnostno število povezuje naslednja osnovna neenakost:

**Trditev 1.3.** Za vsak graf  $G$  na  $n$  vozliščih velja  $\alpha(G)\chi(G) \geq n$ .

*Dokaz.* Označimo z  $V_i$  množico vozlišč, ki jih neko optimalno dobro barvanje pobarva z  $i$ -to barvo. Iz definicije dobrega barvanja direktno sledi, da nobeni dve vozlišči iz  $V_i$  ne moreta biti povezani, saj sta enako pobarvani. Torej je  $V_i$  neodvisna množica. To pa pomeni, da je  $|V_i| \leq \alpha(G)$ . Torej je  $n = \sum_{i=1}^{\chi(G)} |V_i| \leq \sum_{i=1}^{\chi(G)} \alpha(G) = \chi(G)\alpha(G)$  in je s tem trditev dokazana.  $\square$

Ta trditev je pomembna, saj je to ena od redkih znanih spodnjih mej za kromatično število. Velja tudi naslednja najenostavnejša zgornja meja za kromatično število:

**Trditev 1.4.** Označimo z  $\Delta(G)$  maksimalno stopnjo vseh vozlišč v grafu  $G$ . Tedaj je  $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

*Dokaz.* PREPIŠI, KAKO JE KONVALINKA V KNJIGI ZAPISAL TA DOKAZ S POŽREŠNIM BARVANJEM.  $\square$

Za grafe brez trikotnikov velja naslednja karakterizacija:

**Trditev 1.5.** Graf  $G$  nima trikotnikov natanko tedaj, ko je za vsako vozlišče  $v$ , njegova množica sosedov  $N(v)$  neodvisna množica.

*Dokaz.* Naj bo  $G$  brez trikotnikov. Naj bo  $v$  poljubno vozlišče. Denimo, da sta vozlišči  $u$  in  $w$  iz  $N(v)$  povezani. Tedaj  $v, u$  in  $w$  tvorijo trikotnik, kar je protislovje.

Naj bo za vsako vozlišče  $v$  množica  $N(v)$  neodvisna. Denimo, da imamo trikotnik sestavljen iz vozlišč  $u, v$  in  $w$ . Tedaj sta  $v, w \in N(u)$ , hkrati pa sta  $v$  in  $w$  povezani, kar je v protislovju z neodvisnostjo  $N(u)$ .

S tem smo dokazali obe smeri karakterizacije.  $\square$

Tema tega diplomskega dela so grafi, ki imajo veliko ožino tj. velikost najmanjšega cikla.

**Definicija 1.6.** Dolžini največjega cikla v grafu  $G$  pravimo ožina in jo označimo z  $\text{girth}(G)$ .

Takšni grafi so lokalno izredno enostavni. Če je ožina grafa  $g$ , bo podgraf porojen s poljubnih  $g - 1$  vozlišč dejansko gozd, ker ne more imeti ciklov. Pokazali pa bomo, da so lahko takšni grafi globalno zelo kompleksni, če za mero kompleksnosti vzamemo kromatično število. Videli bomo, da ima lahko graf s poljubno veliko ožino prav tako poljubno veliko kromatično število. Razvoj razumevanja takšnih grafov bomo predstavili skozi primere.

## 2 Grafi brez trikotnikov s poljubno velikim kromatičnim številom

Najmanjši možen cikel v grafu je cikel dolžine tri in takšnim ciklom pravimo trikotniki. Če nas zanima, ali lahko graf s poljubno veliko ožino ima poljubno veliko kromatično število, moramo začeti na prvem koraku in se vprašati, ali lahko ima sploh graf brez trikotnikov poljubno veliko ožino. Pokazali bomo, da lahko, s tem da bomo predstavili nekaj konstrukcij takšnih grafov.

TU ALI PA NA KONCU RAZDELKA DODAJ TRDITEV IN DOKAZ, DA SO SKORAJ VSI GRAFI BREZ TRIKOTNIKOV DEJANSKO DVODELNI GRAFI (V mapi imaš članek "Almost all triangle-free graphs are bipartite") IN IMAJO KOT TAKŠNI KROMATIČNO ŠTEVILO 2 IN DA ZATO REZULTATI IZ TEGA RAZDELKA RES NISO OČITNI!!!!!! DODAJ PRAV TAKO KARAKTERIZACIJO DVODELNIH GRAFOV KOT GRAFOV BREZ LIHIH CIKLOV!!!!

### 2.1 Tuttova konstrukcija

Prvi, ki je pokazal, da obstajajo grafi brez trikotnikov, ki imajo poljubno veliko kromatično število, je bil William Thomas Tutte, ki je pisal pod psevdonimom Blanche Descartes. Podal je sledečo induktivno konstrukcijo.

Indukcijo delamo na kromatičnem številu  $k$ . Začnemo z grafom  $G_1$ , ki vsebuje samo eno vozlišče. Denimo sedaj, da poznamo graf  $G_k$ , ki ima  $n$  vozlišč. Graf  $G_{k+1}$  zgradimo tako, da vzamemo množico  $Y$  z  $k(n - 1) + 1$  vozlišči in brez kakršnihkoli povezav med njimi. Za vsak  $X \subseteq Y$ , ki vsebuje  $n$  vozlišč vzamemo kopijo grafa  $G_k$ , ki jo označimo z  $G_X$  in povežemo to kopijo z  $X$  tako, da je vsako vozlišče iz  $X$  povezano z natanko enim vozliščem iz  $G_X$ . Različnih kopij grafa  $G_k$  med seboj ne povezujemo, tj. med nobenima vozliščema iz  $G_X$  in  $G_{X'}$  ne obstaja povezava, če je  $X \neq X'$ . S tem smo zgradili  $G_{k+1}$ .

Pokažimo, da je  $\chi(G_k) = k$  in da  $G_k$  ne vsebuje trikotnikov.

**Trditev 2.1.** Graf  $G_k$  iz Tuttove konstrukcije ne vsebuje nobenega trikotnika in velja  $\chi(G_k) = k$ .

*Dokaz.* Dokazujemo z indukcijo. Graf z enim vozliščem ima kromatično število 1 in je brez trikotnikov, torej je baza indukcije izpolnjena. Denimo, da trditev za  $G_k$  in pokažimo, da velja za  $G_{k+1}$ .



Najprej s protislovjem pokažimo, da je  $\chi(G_{k+1}) \geq k + 1$ . Denimo nasprotno, da je  $\chi(G_{k+1}) \leq k$ . Tedaj obstaja  $c$ , ki je pravilno  $k$ -barvanje grafa  $G_{k+1}$ . Recimo, da  $G_k$  ima  $n$  vozlišč. Tedaj po konstrukciji velja, da ima množica  $Y$  iz konstrukcije  $k(n - 1) + 1$  vozlišč, ki so pobarvana pravilno z večjemu  $k$  različnimi barvami. Zato mora obstajati vsaj ena barva  $b$ , s katero je pobarvanih vsaj  $n$  vozlišč iz  $Y$ . Vzemimo poljubnih  $n$  vozlišč iz  $Y$  pobarvanih s  $b$  in označimo to množico z  $X$ . Ker je po indukcijski predpostavki  $\chi(G_k) \geq k$ , bo  $c$  pobarval  $G_X$ , ki je kopija  $G_k$  z natanko  $k$  barvami, saj je  $c$  pravilno barvanje. Ker je vsako vozlišče v  $X$  povezano z natanko enim v  $G_X$  in ker je  $c$  pravilno barvanje, je  $b$  različna barva od vseh  $k$  barv, s katerimi smo pobarvali  $G_X$ . Torej je  $c$  pobarval  $G_{k+1}$  z vsaj  $k + 1$  barvami, kar pa je protislovje.

Prav tako je  $\chi(G_{k+1}) \leq k + 1$ . Po indukcijski predpostavki lahko namreč vsako kopijo  $G_k$  pobarvamo s  $k$  barvami, saj različne kopije niso med seboj povezane. Tedaj lahko vzamemo poljubno novo barvo, ki je nismo uporabili za kopije  $G_k$  in z njo pobarvamo  $Y$ , saj elementi  $Y$  nimajo med seboj povezav. S tem smo dokazali zeleno, saj smo dobili pravilno  $(k + 1)$ -barvanje grafa, in je res  $\chi(G_{k+1}) = k + 1$ .

Denimo, da v  $G_{k+1}$  obstaja trikotnik. V trikotniku so vsa vozlišča paroma povezana, zato lahko v njem leži kvečjemu eno vozlišče iz  $Y$ , saj med vozlišči v  $Y$  ni povezav. Prav tako preostali dve vozlišči morata ležati v isti kopiji  $G_k$ , saj nimamo povezav med različnimi kopijami. To pa pomeni, da imamo vozlišče v  $Y$ , ki je povezano z dvema različnima vozliščema iz iste kopije  $G_k$ , kar pa je v protislovju s konstrukcijo. Torej  $G_{k+1}$  res ne vsebuje trikotnikov. □

**Opomba 2.2.** Če definiramo  $G_k$  le za  $k \geq 3$  in za  $G_3$  vzamemo cikel dolžine sedem, ob zgornji trditvi velja celo, da je  $\text{girth}(G_k) \geq 6$  za vsak  $k \geq 3$ . DOKAŽI TO!!!!!!!

Tuttova konstrukcija torej res dokazuje, da lahko imajo grafi brez trikotnikov poljubno veliko kromatično število. Vendar so grafi v Tuttejevi konstrukciji izredno veliki (če ima  $G_k$  recimo  $n$  vozlišč, ima  $G_{k+1}$  potem  $\binom{k(n-1)+1}{n}n + k(n-1) + 1$  vozlišč) in je v resnici kromatično število zelo majhno v razmerju s številom vozlišč. Iz tega aspekta je bolj zanimiva konstrukcija Mycielskega. Glavna prednost Tuttejeve konstrukcije je ta, da dokazuje, da lahko imajo tudi grafi brez ciklov dolžine manjše ali enake 4 ali 5 poljubno velika kromatična števila.

## 2.2 Konstrukcija Mycielskega

Jan Mycielski je leta 1955 podal konstrukcijo, ki iz začetnega grafa z  $n$  vozlišči zgradi graf z  $2n + 1$  vozlišči, ki ima večje kromatično število kot začetni graf, hkrati pa nima trikotnikov, če jih začetni graf nima. Konstrukcija je podana na naslednji način.

Denimo, da imamo graf  $G$  na  $n$  vozliščih  $v_1, \dots, v_n$ . Potem definiramo  $M(G)$  kot graf z  $2n + 1$  vozlišči  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c$ . Za vse  $i, j$ , za katere obstaja povezava  $v_i v_j$  v  $G$ , tvorimo povezave  $a_i a_j, a_i b_j$  in  $a_j b_i$  v  $M(G)$ . Ob tem za vsak  $i$  med 1 in  $n$  tvorimo povezavo  $b_i c$  v  $M(G)$ . Takšnemu grafu  $M(G)$  pravimo graf Mycielskega grafa  $G$ .

**Trditev 2.3.** Če graf  $G$  nima trikotnikov, potem nima trikotnikov niti njegov graf Mycielskega  $M(G)$ .

*Dokaz.* Naj bo  $G$  brez trikotnikov. Dokazujemo s protislovjem. Denimo, da ima  $M(G)$  nek trikotnik. Vsa vozlišča znotraj trikotnika so med seboj povezana. Ker v  $M(G)$  ni povezav med  $b_i$  in  $b_j$  za nobena  $i$  in  $j$ , je lahko v ciklu kvečjemu eno vozlišče oblike  $b_i$ . To pomeni, da mora biti vsaj eno vozlišče oblike  $a_i$  v trikotniku. Ker  $c$  ni povezan z nobenim vozliščem te oblike,  $c$  ne more biti v trikotniku. Torej imamo v trikotniku  $a_j$  in  $a_k$  za neka različna  $j$  in  $k$ . Če bi imeli v trikotniku še vozlišče  $a_i$  za nek  $i$  različen od  $j$  in  $k$ , bi to pomenilo, da imamo trikotnik v  $G$ , saj je podgraf  $M(G)$  porojen z vozlišči  $a_1, \dots, a_n$  izomorfen  $G$  po konstrukciji, kar je protislovje. Torej je v trikotniku še vozlišče  $b_i$  za nek  $i$ . To pa po konstrukciji  $M(G)$  pomeni, da imamo v  $G$  povezave  $v_i v_k$ ,  $v_i v_j$  in  $v_j v_k$ , kar je trikotnik. Ker  $G$  po predpostavki nima trikotnikov, smo prišli do protislovja.  $\square$

**Trditev 2.4.** Velja  $\chi(M(G)) = \chi(G) + 1$ .

*Dokaz.* Pokažimo najprej, da je  $\chi(M(G)) \geq \chi(G) + 1$ . Dokazujemo s protislovjem. Denimo, da je  $\chi(M(G)) \leq \chi(G) = k$ . Tedaj obstaja pravilno  $k$ -barvanje  $M(G)$ , recimo mu  $f$ . Brez škode za splošnost je  $f(c) = k$ . Zaradi pravilnosti  $f$ , ni nobeno vozlišče oblike  $b_i$  pobarvano s  $k$ . Barvanje  $f$  porodi pravilno  $k$ -barvanje grafa  $G$ , recimo mu  $g$ , podano z  $g(v_i) = f(a_i)$ . Če je kakšno vozlišče  $v_i$  v  $G$  pobarvano s  $k$ , lahko spremenimo barvo v  $f(b_i)$  in je barvanje grafa  $G$  še vedno pravilno. Namreč, če imamo povezavo  $v_i v_j$  v  $G$ , imamo tudi povezavo  $b_i a_j$  v  $M(G)$ , kar pomeni, da je  $f(b_i) \neq f(a_j) = g(a_j)$  zaradi pravilnosti barvanja  $f$ . Torej tudi v spremenjenem barvanju nimamo nobenih sosedov z enako barvo, torej je to pravilno barvanje  $G$ . Vsa vozlišča v  $G$ , ki so bila pobarvana s  $k$ , smo na novo pobarvali z neko barvo iz  $\{1, \dots, k-1\}$ , ker je  $f(b_i) \neq k$  za vse  $i$ . To pa pomeni, da smo našli pravilno  $(k-1)$ -barvanje  $G$ , kar je v protislovju z  $\chi(G) = k$ . Dokažimo še  $\chi(M(G)) \leq \chi(G) + 1$ . Naj bo  $k = \chi(G)$  in naj bo  $g$  pravilno  $k$ -barvanje grafa  $G$ . Definiramo potem  $f$  kot  $(k+1)$ -barvanje grafa  $M(G)$ . Naj bo  $f(a_i) = f(b_i) = g(v_i)$  za vse  $i$ . Naj bo  $f(c) = k+1$ . Pokažimo, da je  $f$  pravilno barvanje. Ker je  $f(b_i) \neq k+1$  za vse  $i$ ,  $c$  nima enake barve z nobenim sosedom. Če pa imamo v  $M(G)$  povezavo oblike  $a_i a_j$  ali pa  $a_i b_j$  za neka različna  $i$  in  $j$ , vemo, da imamo v  $G$  povezavo  $v_i v_j$ . Ker je  $f(a_i) = g(v_i) \neq g(v_j) = f(a_j) = f(b_j)$ , pri čemer smo upoštevali pravilnost  $g$ , vemo, da niti sosedi oblike  $a_i$  in  $a_j$  ali  $a_i$  in  $b_j$  ne bodo imeli enake barve. Torej je  $f$  res pravilno  $(k+1)$ -barvanje  $M(G)$  in je res  $\chi(M(G)) = \chi(G) + 1$ .  $\square$

**Posledica 2.5.** Naj bo  $G_3$  cikel dolžine 5. Naj bo  $G_{k+1} = M(G_k)$  za vsak  $k \geq 3$ . Tedaj je  $G_k$  brez trikotnikov in  $\chi(G_k) = k$  za vsak  $k \geq 3$ .

*Dokaz.* Dokažemo z indukcijo.  $G_3$  je cikel lihe dolžine, torej ima kromatično število 3, in nima trikotnikov, saj cikel dolžine 3. Baza indukcije je s tem izpolnjena. Indukcijski korak dokažemo enostavno s prejšnjima trditvama.  $\square$

Konstrukcija Mycielskega nam torej porodi še eno družino grafov brez trikotnikov, katerih kromatično število neomejeno narašča. Grafi iz te družine so dosti manjši kot grafi iz Tuttejeve konstrukcije, in sicer bi z indukcijo lahko enostavno dokazali, da je število vozlišč v  $G_k$  enako  $3 \cdot 2^{k-2} - 1$  za  $k \geq 3$ . Torej kromatično število narašča logaritemsko glede na število vozlišč. To je še vedno dosti majhno, vendar veliko boljše kot v Tuttovi konstrukciji.

## 2.3 Zamični grafi

## 2.4 Ramseyjevi grafi

Vsi grafi iz prejšnjih podrazdelkov so dejansko imeli precej majhna kromatična števila glede na velikosti grafov. V tem podrazdelku pa bomo obravnavali grafe z dosti večjim kromatičnim številom, torej globalno dosti bolj kompleksne grafe. Poglejmo naslednjo družino grafov.

Graf  $P_k$  zgradimo tako, da pogledamo končno projektivno ravnino reda  $k$ , torej projektivno ravnino s  $k^2 + k + 1$  točkami. Za vozlišča vzamemo vse urejene pare točk in premic  $(p, L)$ , za katere velja, da  $p$  leži na  $L$ . Točke v ravnini opremimo s poljubno linearno urejenostjo  $<$ . Vozlišči  $(p, L)$  in  $(p', L')$  povežemo, če velja, da je  $p < p'$ , da sta  $p$  in  $p'$  različni ter  $L$  in  $L'$  različni in da  $p$  leži na  $L'$ . Tedaj veljajo naslednje trditve:

**Trditev 2.6.**  $P_k$  ne vsebuje trikotnikov.

*Dokaz.* Dokazujemo s protislovjem. Denimo, da imamo trikotnik  $(p, L), (p', L')$  in  $(p'', L'')$ . Tedaj so vse točke in premice paroma različne. Naj bo brez škode za splošnost  $p < p' < p''$ . Tedaj po konstrukciji velja, da  $p$  leži na  $L, L'$  in  $L''$ ,  $p'$  pa leži na  $L'$  in  $L''$ . Ker je v projektivni ravnini premica natanko določena z dvema točkama, ki ležita na njej, in ker tako  $p$  kot  $p'$  ležita na  $L'$  in  $L''$ , je  $L' = L''$ , kar pa je protislovje. Torej  $P_k$  res ne vsebuje trikotnikov.  $\square$

**Trditev 2.7.** Velja  $\alpha(P_k) \leq 2 \cdot (k^2 + k + 1)$ .

*Dokaz.* Naj bo  $H \subseteq V(P_k)$  poljubna neodvisna množica vozlišč. Tedaj lahko  $H$  zapišemo kot disjunktno unijo dveh množic.

Prva množica vozlišč vsebuje urejene pare točk in premic iz  $H$ , za katere velja, da se točka pojavi v vsaj dveh urejenih parih iz  $H$ . Vzemimo dva takšna urejena para, v katerih se točka ponovi, recimo  $(p, L)$  in  $(p, L')$ . Ker je množica  $H$  neodvisna, mora za vsako vozlišče  $(q, L') \in H, q \neq p$  veljati  $q < p$ , saj bi sicer imeli povezavo med  $(p, L)$  in  $(q, L')$ , kar bi bilo v protislovju z neodvisnostjo  $H$ . Podobno mora za vsako vozlišče  $(q, L) \in H, q \neq p$  veljati  $q < p$ , saj bi sicer imeli povezavo med  $(p, L')$  in  $(q, L)$ . To pa že pomeni, da je izmed vseh točk, ki se pojavijo v paru z  $L$  v množici  $H$ , točka  $p$  maksimalna. Ker je maksimum v linearni urejenosti enolično določen, se bo z vsake premice, ki se pojavi v nekem paru v  $H$ , kvečjemu ena točka pojavila v več kot enem paru. To pomeni, da bo v prvi množici vozlišč vsaka premica iz projektivne ravnine nastopila v kvečjemu enem paru. Ker je vseh premic v ravnini  $k^2 + k + 1$ , bo torej vozlišč v prvi množici kvečjemu  $k^2 + k + 1$ .

Druga množica vozlišč vsebuje urejene pare točk in premic iz  $H$ , za katere velja, da se točka pojavi v natanko enem urejenem paru iz  $H$ . Vozlišč v drugi množici bo torej kvečjemu toliko, kolikor je točk v ravnini, teh pa je  $k^2 + k + 1$ .

Množica  $H$ , ki je unija prve in druge množice, vsebuje torej kvečjemu  $2 \cdot (k^2 + k + 1)$  vozlišč. Ker je bila  $H$  poljubna neodvisna množica, smo dokazali  $\alpha(G) \leq 2 \cdot (k^2 + k + 1)$ .  $\square$

**Trditev 2.8.** Velja  $\chi(P_k) \geq \frac{k+1}{2}$ .

*Dokaz.* V končni projektivni ravnini reda  $k$  imamo  $k^2 + k + 1$  točk in vsaka točka leži na  $k + 1$  premic. Torej ima graf  $P_k$   $(k^2 + k + 1)(k + 1)$  vozlišč. Če upoštevamo prejšnjo trditev in neenakost 1.3, dobimo, da je res  $\chi(P_k) \geq \frac{k+1}{2}$ .  $\square$

Ker ima  $P_k$   $(k^2 + k + 1)(k + 1)$  vozlišč, nam prejšnje trditve povejo, da je  $\chi(P_k) = \Omega(n^{\frac{1}{3}})$ , kjer je  $n = |V(P_k)|$  kar je občutno večje kromatično število kot v prejšnjih konstrukcijah in kaže, da je lahko graf globalno res precej kompleksen kljub odsotnosti trikotnikov.

To je dejansko zelo blizu največjemu kromatičnemu številu in najmanjšemu neodvisnostnemu številu, ki ga lahko dosežemo v grafu brez trikotnikov. Za vse grafe brez trikotnikov  $G$  velja namreč veljata naslednji meji.

**Trditev 2.9.** V grafu  $G$  brez trikotnikov na  $n$  vozliščih, je  $\alpha(G) \geq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ .

*Dokaz.* Naj bo  $G$  graf brez trikotnikov. Standardno označimo maksimalno stopnjo nekega vozlišča v grafu z  $\Delta(G)$ . Naj ima  $v$  stopnjo  $\Delta(G)$ . Če je  $\Delta(G) \geq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ , je po 1.5 množica  $N(v)$  neodvisna množica z močjo vsaj  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ , torej je  $\alpha(G) \geq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ . Če je  $\Delta(G) \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1$ , pa po 1.4 obstaja dobro barvanje grafa z  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$  barvami. Pri takšnem barvanju moramo vsaj eno barvo uporabiti na  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$  vozliščih in ta vozlišča tvorijo neodvisno množico. Torej je spet  $\alpha(G) \geq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ .  $\square$

**Trditev 2.10.** V grafu  $G$  brez trikotnikov na  $n$  vozliščih je  $\chi(G) \leq 2\sqrt{n} + 1$

*Dokaz.* Dokazujemo z indukcijo na številu vozlišč. Če je  $\Delta(G) \leq \sqrt{n}$ , po 1.4 velja  $\chi(G) \leq \sqrt{n} + 1 \leq 2\sqrt{n} + 1$ . Če je  $\Delta(G) \geq \sqrt{n}$  in je maksimalna stopnja dosežena v  $v$ , je  $H = N(v)$  neodvisna in jo lahko pobarvamo z isto barvo, velja pa da ima  $H$  vsaj  $\sqrt{n}$  vozlišč. Torej je  $G \setminus H$  graf brez trikotnikov na kvečjemu  $n - \sqrt{n}$  vozlišč. Po indukcijski predpostavki ga lahko tedaj pobarvamo s kvečjemu  $2\sqrt{n - \sqrt{n} + 1}$  barvami. Ker je  $\sqrt{n - \sqrt{n}} \leq \sqrt{n} - \frac{1}{2}$ , lahko dejansko  $G \setminus H$  pobarvamo s kvečjemu  $2\sqrt{n}$  barvami. Kot smo že ugotovili, lahko  $H$  pobarvamo z isto barvo, torej lahko  $G$  pobarvamo s kvečjemu  $2\sqrt{n} + 1$  barvami. S tem smo pokazali, da je res  $\chi(G) \leq 2\sqrt{n} + 1$ .  $\square$

Dejansko velja za takšne grafe še strožja meja  $\chi(G) \leq (2 + o(1))\sqrt{\frac{n}{\log n}}$  (težji dokaz v članku "The  $\chi$ -Ramsey problem for triangle-free graphs").

TU JE TREBA ŠE RAZLOŽITI, ZAKAJ JIH IMENUJEMO "RAMSEYJEVI GRAFI"!!!!!!!!!!!!!!

### 3 Grafi s poljubno veliko ožino in poljubno velikim kromatičnim številom

V prejšnjem razdelku smo pokazali, da odsotnost trikotnikov ne omejuje kromatičnega števila grafa. Prav tako smo poskušali ugotoviti, kako globalno kompleksen je lahko graf, ki nima trikotnikov, torej graf, ki je lokalno na poljubnih treh vozliščih izredno enostaven. V tem razdelku bomo najprej pokazali, da ožina sama po sebi ne more omejiti kromatičnega števila, tj. da za poljubno veliko fiksno ožino vedno obstaja graf s poljubno velikim kromatičnim številom. Nato pa bomo poskusili analizirati, kako skupaj velikost grafa in njegova ožina omejujeta kromatično število.

Pogledali bomo, koliko kompleksen je lahko nek graf globalno v odvisnosti od tega, koliko enostaven je lokalno.

Najprej definiramo pojem naključnega grafa:

**Definicija 3.1.** Verjetnostni prostor slučajnih grafov  $G(n, p)$  je podan z množico vseh grafov na  $n$  vozliščih kot množico elementarnih izidov, dogodek je poljubna množica grafov na  $n$  vozliščih, verjetnost vsakega grafa  $G$  z  $m$  povezavami pa je enaka  $P(G) = p^m(1 - p)^{\binom{n}{2} - m}$ .

**Opomba 3.2.** Verjetnost posameznega grafa v prostoru slučajnih grafov lahko interpretiramo tako, da za vsako posamezno povezavo neodvisno izbiramo, ali je vsebovana v grafu, in  $p$  je verjetnost, da je posamezna povezava vsebovana v grafu.

Naslednja lema je pomembna za dokaz glavnega izreka:

**Lema 3.3.** Naj bo slučajna spremenljivka  $X : G(n, p) \rightarrow \mathbb{R}$  število  $k$ -ciklov v  $G = (V, E) \in G(n, p)$ . Potem je:

$$E(X) = \frac{n^k}{2k} p^k,$$

kjer je  $n^k = n(n-1) \dots (n-k+1)$ .

*Dokaz.* Preštejmo število ciklov dolžine  $k$  v polnem grafu na  $n = |V|$  vozliščih. Pomagamo si z zaporedji vozlišč  $C = v_1, v_2, \dots, v_k$ . Število zaporedij z različnimi elementi dolžine  $k$  na  $n$ -elementni množici je  $n^k$ , vsak cikel pa ustreza  $2k$  takšnim zaporedjem, saj cikel porodi  $k$  možnih začetnih točk zaporedji in imamo dve možni smeri premikanja po ciklu. Število možnih ciklov je torej  $\frac{n^k}{2k}$ . Za vsak cikel  $C_i$ ,  $1 \leq i \leq \frac{n^k}{2k}$ , definiramo indikatorsko slučajno spremenljivko  $X_i$ :

$$X_i = \begin{cases} 1, & C_i \subseteq G \\ 0, & \text{sicer} \end{cases}.$$

Velja  $E[X_i] = P(X_i = 1) = p^k$ , saj je po zgornji opombi to verjetnost, da je vseh  $k$  povezav iz  $C_i$  vsebovanih v  $G$ . Prav tako velja, da je  $X = \sum_{i=1}^{\frac{n^k}{2k}} X_i$ , saj oba izraza preštejeta vse cikle dolžine  $k$  v grafu  $G$ . Torej po linearnosti pričakovane vrednosti velja:

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^{\frac{n^k}{2k}} X_i\right] = \sum_{i=1}^{\frac{n^k}{2k}} E[X_i] = \sum_{i=1}^{\frac{n^k}{2k}} p^k = \frac{n^k}{2k} p^k.$$

□

## Slovar strokovnih izrazov