

Quiz Test : Glasgow Coma Scale (GCS)

คำชี้แจง : อ่านสถานการณ์ในแต่ละข้อ แล้วเลือกคำตอบ A , B , C หรือ D ที่บันทึกคะแนน Glasgow Coma Scale ทั้ง 3 ด้านได้ถูกต้องที่สุด ได้แก่ E (Eye Opening), V (Verbal Response) และ M (Motor Response) พร้อมคะแนนรวมและระดับความรุนแรง

เกณฑ์ระดับความรุนแรงที่ใช้ในชุดนี้ : Mild = GCS 13–15 | Moderate = GCS 9–12 | Severe = GCS 3–8 มาเริ่มกันเลย...

ข้อที่ 1 ผู้ป่วยชายอายุ 24 ปี ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผู้ป่วยลืมตาได้เอง สามารถบอกชื่อ สถานที่ และวันเวลาได้ถูกต้อง เมื่อพยาบาลสั่งให้ยกแขนขวา ผู้ป่วยสามารถทำตามคำสั่งได้

A. E4V5M6 = 15, Mild	ถูก: E4 เพราะลืมตาได้เอง, V5 เพราะรู้บุคคล สถานที่ และเวลา, M6 เพราะทำตามคำสั่งได้ จึงรวม 15 คะแนน = Mild
B. E3V5M6 = 14, Mild	B ผิด: E3 ต้องลืมตาเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่แพทย์ระบุว่าลืมตาได้เอง จึงต้องเป็น E4
C. E4V4M6 = 14, Mild	C ผิด: V4 ใช้เมื่อสนทนาได้แต่สับสน แต่ผู้ป่วยตอบชื่อ สถานที่ และวันเวลาได้ถูกต้อง จึงเป็น V5
D. E4V5M5 = 14, Mild	D ผิด: M5 คือการ Localising ต่อสิ่งกระตุ้น ส่วนผู้ป่วยรายนี้ทำตามคำสั่งได้ จึงเป็น M6

ข้อที่ 2 ผู้ป่วยหญิงหลังหกล้ม นอนหลับตาอยู่ เมื่อพยาบาลเรียกชื่อจึงลืมตา ผู้ป่วยพูดคุยเป็นประโยค แต่ตอบว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ทั้งที่เป็นวันศุกร์ และเข้าใจผิดว่าตนเองอยู่ที่บ้าน เมื่อสั่งให้กำมือ ผู้ป่วยสามารถทำตามได้

A. E3V5M6 = 14, Mild	A ผิด: V5 ต้อง orientated ถูกต้อง แต่รายนี้สับสนเรื่องวันและสถานที่
B. E4V4M6 = 14, Mild	B ผิด: E4 ต้องลืมตาได้เอง แต่รายนี้ลืมตาลังเรียกชื่อ
C. E3V4M6 = 13, Mild	C ถูก: E3 ลืมตาต่อเสียง, V4 สนทนาเป็นประโยคได้แต่สับสนเรื่องเวลา/สถานที่, M6 ทำตามคำสั่ง รวม 13 = Mild
D. E3V3M6 = 12, Moderate	D ผิด: V3 คือพูดเป็นคำ ๆ แต่ไม่สามารถสนทนาเป็นประโยคได้ ขณะที่รายนี้สนทนาเป็นประโยคได้ จึงเป็น V4

ข้อที่ 3 ผู้ป่วย TBI ไม่ลืมตาเมื่อเรียก แต่ลืมตาเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยแรงกด ผู้ป่วยพูดว่า “บ้าน...รถ...ไป...” เป็นคำที่ฟังเข้าใจได้ แต่ไม่สามารถสนทนาเป็นประโยค เมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด ผู้ป่วยใช้มือขึ้นมาหาตำแหน่งที่กระตุ้นและพยายามเอามือผู้ตรวจออก

A. E2V2M5 = 9, Moderate	A ผิด: V2 เป็นเพียงเสียงที่ไม่เป็นคำ แต่โจทย์มีคำพูดที่ฟังเข้าใจได้ จึงเป็น V3
B. E2V3M5 = 10, Moderate	B ถูก: E2 ลืมตาต่อแรงกด, V3 พูดเป็นคำที่เข้าใจได้, M5 Localising เพราะยกมือมาหาตำแหน่งกระตุ้น รวม 10 = Moderate
C. E3V3M5 = 11, Moderate	C ผิด: E3 ต้องลืมตาต่อเสียง แต่ผู้ป่วยไม่ลืมตาเมื่อเรียก
D. E2V3M4 = 9, Moderate	D ผิด: M4 เป็นการดึงหนีจากสิ่งกระตุ้นเท่านั้น แต่รายนี้หาตำแหน่งและพยายามเอามือกระตุ้นออก จึงเป็น M5

ข้อที่ 4 ผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุศีรษะไม่ลืมตาเมื่อเรียก แต่ลืมตาเมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด ผู้ป่วยส่งเสียงคราง “อ้อ...อา...” แต่ไม่สามารถพูดเป็นคำได้ เมื่อกระตุ้น ผู้ป่วยดึงแขนออกจากสิ่งกระตุ้น โดยไม่ได้ยกมือมาหาตำแหน่งที่กระตุ้น

A. E2V2M4 = 8, Severe	A ถูก: E2 ลืมตาต่อแรงกด, V2 มีเสียงแต่ไม่เป็นคำ, M4 ดึงหนี/ Normal flexion รวม 8 = Severe
B. E2V3M4 = 9, Moderate	B ผิด: V3 ต้องมีคำพูดที่ฟังเข้าใจได้ แต่รายนี้มีเพียงเสียงคราง
C. E2V2M5 = 9, Moderate	C ผิด: M5 ต้อง Localise โดยเคลื่อนมือเข้าหาตำแหน่งกระตุ้น เพื่อเอา stimulus ออก แต่รายนี้เพียงดึงหนี
D. E3V2M4 = 9, Moderate	D ผิด: E3 ต้องลืมตาต่อเสียง แต่รายนี้ไม่ลืมตาเมื่อเรียก

ข้อที่ 5 ผู้ป่วยชายหลังได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ไม่ลืมตาทั้งเมื่อเรียกและเมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด ผู้ป่วยส่งเสียงครางแต่ไม่สามารถพูดเป็นคำได้ เมื่อกระตุ้น พบว่าแขนทั้งสองข้างงอเข้าหาลำตัวอย่างผิดปกติ

A. E1V3M3 = 7, Severe	A ผิด: V3 ต้องพูดเป็นคำที่เข้าใจได้ แต่รายนี้มีเพียงเสียงคราง จึงเป็น V2
B. E1V2M4 = 7, Severe	B ผิด: M4 คือการดึงหนีแบบ Normal flexion แต่โจทย์เป็นการงอผิดปกติ จึงเป็น M3
C. E2V2M3 = 7, Severe	C ผิด: E2 ต้องลืมตาต่อแรงกด แต่รายนี้ไม่ลืมตาแม้ได้รับการกระตุ้น
D. E1V2M3 = 6, Severe	D ถูก: E1 ไม่ลืมตา, V2 มีเสียงแต่ไม่เป็นคำ, M3 Abnormal flexion รวม 6 = Severe

ข้อที่ 6 ผู้ป่วย TBI ไม่ลืมตาต่อเสียงหรือแรงกด ไม่มีเสียงพูดหรือเสียงคราง เมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด พบว่าแขนทั้งสองข้างเหยียดออกผิดปกติ

A. E1V1M2 = 4, Severe	A ถูก: E1 ไม่ลืมตา, V1 ไม่มี Verbal response, M2 Extension response รวม 4 = Severe
B. E1V1M3 = 5, Severe	B ผิด: M3 คือ Abnormal flexion แต่โจทย์เป็นการเหยียดผิดปกติ จึงเป็น M2
C. E1V2M2 = 5, Severe	C ผิด: V2 ต้องมีเสียงตอบสนอง แต่โจทย์ระบุว่าไม่มีเสียงพูดหรือเสียงคราง
D. E2V1M2 = 5, Severe	D ผิด: E2 ต้องลืมตาต่อแรงกด แต่ผู้ป่วยรายนี้ไม่ลืมตา

ข้อที่ 7 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ลืมตาได้เอง พูดคุยเป็นประโยค แต่ตอบว่าอยู่ที่บ้านทั้งที่อยู่โรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่ทำตามคำสั่งให้ยกแขน เมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด ผู้ป่วยเอามือมาปิดสิ่งกระตุ้นทันที

A. E4V5M4 = 13, Mild	A ผิด: V5 ต้องตอบ orientation ได้ถูกต้อง แต่ผู้ป่วยเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ จึงเป็น V4
B. E4V4M5 = 13, Mild	B ถูก: E4 ลืมตาเอง, V4 สนทนาได้แต่สับสน, M5 Localising ต่อ stimulus รวม 13 = Mild
C. E4V4M4 = 12, Moderate	C ผิด: ผู้ป่วยเอามือมาปิดสิ่งกระตุ้น แสดงถึงการ Localising pain = M5 ไม่ใช่ M4 ซึ่ง M4 เป็นเพียงการดึงแขนหนีจากสิ่งกระตุ้น
D. E3V4M4 = 11, Moderate	D ผิด: E3 คือการลืมตาต่อเสียง แต่รายนี้ลืมตาได้เอง จึงเป็น E4

ข้อที่ 8 ผู้ป่วย TBI ลืมตาเมื่อเรียกชื่อ พูดเป็นคำที่ฟังเข้าใจได้เป็นบางคำแต่ไม่สามารถสนทนาเป็นประโยค เมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด แขนขวายกขึ้นมาพยายามปิดมือผู้ตรวจออกจากตำแหน่งกระตุ้น ส่วนแขนซ้ายเพียงดึงหนี

A. E3V4M5 = 12, Moderate	A ผิด: V4 ต้องสามารถสนทนาเป็นประโยคได้แต่สับสน แต่รายนี้พูดได้เพียงเป็นคำ จึงเป็น V3
B. E3V3M4 = 10, Moderate	B ผิด: เลือก M4 จากแขนซ้าย ทั้งที่การให้คะแนน GCS ใช้ best motor response ซึ่งแขนขวาเป็น M5
C. E3V3M5 = 11, Moderate	C ถูก: E3 ลืมตาต่อเสียง, V3 พูดเป็นคำ, Motor ใช้ best motor response จึงเป็น M5 จากแขนขวาที่ Localising รวม 11 = Moderate
D. E2V3M5 = 10, Moderate	D ผิด: E2 ต้องลืมตาต่อแรงกด แต่ผู้ป่วยลืมตาเมื่อเรียกชื่อ จึงเป็น E3

ข้อที่ 9 ผู้ป่วย intracranial hemorrhage ไม่ลืมตาเมื่อเรียก แต่ลืมตาเมื่อกระตุ้นด้วยแรงกด ผู้ป่วยพูดคุยเป็นประโยคแต่สับสนเรื่องวันและสถานที่ ไม่สามารถทำตามคำสั่ง เมื่อกระตุ้น ผู้ป่วยยกมือขึ้นมาหาตำแหน่งกระตุ้นและพยายามผลักมือผู้ตรวจออก

A. E2V4M4 = 10, Moderate	A ผิด: M4 คือตึงหนี แต่รายนี้หาตำแหน่ง stimulus และพยายามเอาออก จึงเป็น M5
B. E2V3M5 = 10, Moderate	B ผิด: V3 ใช้เมื่อพูดเป็นคำแต่ไม่สนทนาเป็นประโยค ขณะที่รายนี้พูดเป็นประโยคได้ จึงเป็น V4
C. E3V4M5 = 12, Moderate	C ผิด: E3 ต้องลืมตาต่อเสียง แต่รายนี้ไม่ลืมตาเมื่อเรียก
D. E2V4M5 = 11, Moderate	D ถูก: E2 ลืมตาต่อแรงกด, V4 สนทนาเป็นประโยคแต่สับสน, M5 Localising รวม 11 = Moderate

ข้อที่ 10 ผู้ป่วยชาย 30 ปี Severe TBI ไม่ลืมตาต่อเสียงหรือแรงกด ไม่มีการพูดหรือส่งเสียง เมื่อกระตุ้นด้วยแรงกดอย่างเหมาะสม ไม่พบการเคลื่อนไหวของแขนหรือขา และไม่มี motor response ต่อ stimulus

A. E1V1M1 = 3, Severe	A ถูก: ไม่มี Eye response = E1, ไม่มี Verbal response = V1, ไม่มี Motor response = M1 รวม 3 = Severe
B. E1V1M2 = 4, Severe	B ผิด: M2 ต้องมี Extension response แต่รายนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวตอบสนอง
C. E1V2M1 = 4, Severe	C ผิด: V2 ต้องมีเสียงตอบสนอง แต่แพทย์ระบุว่าไม่มีเสียง
D. E2V1M1 = 4, Severe	D ผิด: E2 ต้องลืมตาต่อแรงกด แต่รายนี้ไม่ลืมตา