

종합 비타민

우루큐백

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



<성분 함량>

감마오리자놀 5 mg, 니코틴산아미드 50 mg, 리보플라빈 50 mg, 무수인산수소칼슘 100 mg, 벤포티아민 50 mg, 비오틴 0.2 mg, 산화마그네슘 100 mg, 시아노코발라민 0.1% 50 mg 외 뒷면
<효능 효과> 육체피로, 체력저하, 구각염, 구순염, 눈의 피로, 근육통, 신경통, 습진, 피부염 <용법 용량> 만 12세 이상 어린이 및 성인 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T x 2

코큐헬씨타민

종근당



<성분 함량>

니코틴산아미드 10mg, 레티놀팔미테이트 2.941mg, 리보플라빈 10mg, 산화마그네슘 65.81mg, 산화아연 31.12mg, 산화제이구리 2.5mg, 셀레늄 함유 건조 효모 38.462mg 외 뒷면 확인
<효능 효과> 육체피로, 체력저하, 아연보급, 임신수유기, 눈의 건조감, 빈혈의 예방 및 치료
<용법 용량> 성인 1일 1회, 1캡슐 식후복용
<포장 단위> 60C x 2

센파워민

(주)마더스제약



<성분 함량>

L류신, L메티오닌, L발린, L이소류신, L트레오닌, L데닐알라닌, L트립토판, L리산염산염, L아르기닌염산, 티아민질산염 외 뒷면
<효능 효과> 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후, 위장장애
<용법 용량> 15세 이상 및 성인 1회 2정, 1일 1~2회 복용 7세~14세 1회 1정, 1일 1~2회 복용 <포장 단위> 120T X 2

센타민 프로

GC녹십자MS



<성분 함량>

레티놀아세테이트과립(비타민A 1000IU) 2mg, 비스벤티아민 5mg, 푸르셀티아민 5mg, 벤포티아민 15mg, 리보플라빈 12mg, 니코틴산아미드 10mg, 비오틴 0.045mg
<효능 효과> 육체 피로, 임신, 수유기, 병중·병후, 발육기~노년기에 빠, 이의 발육불량, 구루병 예방, 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염 완화, 아연 보급
<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 100C

헬씨민큐

(주)동구바이오제약
DongKoo Bio & Pharma Co. Ltd.



<성분 함량>

니코틴산아미드 20mg, 레티놀팔미테이트 5000IU, 리보플라빈 3mg, 아스코르브산 60mg, 토코페롤아세테이트 10mg, 티아민염산염 2mg, 피리독신염산염 3mg
<효능 효과> 육체 피로, 임신, 수유기, 병중·병후의 체력 저하시 노년기의 영양보급(눈의 건조감 완화, 야맹증)
<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 600C

나노민

Hansol



<성분 함량>

시아노코발라민 6μg, 농축콜레칼시페롤유 100μg, 리보플라빈 4mg, 레티놀팔미테이트 0.588mg, 티아민질산염 10mg, 아스코르브산 20mg
<효능 효과> 육체 피로, 임신, 수유기, 발육기, 노년기, 병중·병후의 체력 저하시, 눈의 건조감 완화, 야맹증
<용법 용량> 만 8세 이상 어린이 및 성인 1일 3회, 1회 1캡슐
<포장 단위> 500C

비타민D 2000IU 플러스



중근당홀딩스



<성분 함량>

비타민D3(콜레칼시페롤), 대두유

<효능 효과> 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생위험감소에 도움을 줌, 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 90C x 2

비타민D3 5000IU 골드플러스



<성분 함량>

비타민D3 (콜레칼시페롤), 대두유

<효능 효과> 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 90C x 2

스페셜 비타민D 5000IU



중근당홀딩스



<성분 함량>

알파칼시돌 0.5 μ g

<효능 효과> 만성 신부전, 부갑상선 기능 저하증 비타민 D 저항성 구루병, 골 연화증

<용법 용량> 1 만성 신부전-골다공증: 알파칼시돌로서 1일 1회 0.5~1 μ g 부갑상선 기능 저하증, 기타 비타민 D 대사 이상에 따른 질환: 1일 1회 1~4 μ g 골다공증: 알파칼시돌로서 1일 1회 체중 kg당 0.01~0.03 μ g 외 내지참조 <포장 단위> 90C x 2

비타민D 5000IU프리미엄



<성분 함량>

비타민D3혼합제제(팜유, 비타민D3, 비타민E), 대두유

<효능 효과> 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌, 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1캡슐 <포장 단위> 90C x 2

리포솜 비타민C 프리미엄



<성분 함량>

리포솜비타민C혼합제제, 비타민D3, 결정셀룰로스, 아셀렌산나트륨, 염화크롬, 글루콘산아연, 산화마그네슘, 비타민K2

<효능 효과> 결합조직 형성과 기능유지, 철의 흡수, 항산화 작용으로 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 칼슘과 인이 흡수, 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지, 골다공증 발생 감소에 도움

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 60T x 2

슈퍼 코큐텐 비타킹



<성분 함량>

코엔자임Q10, 비타민B1질산염, 비타민B2, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 피리독신염산염, 엽산, 비타민B12, 비오틴, 비타민C외 뒷면

<효능 효과> 항산화 높은 혈압감소에 도움을 줄수있음비타민C 결합조직 형성과 기능유지필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60C X 2

케라시딜

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.



<성분 함량>

약용호모 100mg, 케라틴 20mg, 티아민질산염 60mg, 판토텐산 칼슘 60mg, L-시스틴 20mg, p-아미노벤조산 20mg

<효능 효과> 1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

<용법 용량> 1일 3회, 1캡슐 <포장 단위> 150C x 2

슈퍼비오맥스 플러스



<성분 함량>

비오틴, 맥주호모, 결정셀룰로스, 생선콜라겐(대구), 탄산칼슘, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 말토덱스트린, 스테아린산마그네슘, L-시스틴, 엘라스틴가수분해물(대구), 정제의제피, 비타민 B12, 판토텐산칼슘 그외 뒷면 참조

<효능 효과> 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T X 2

다나비오골드



<성분 함량>

비오틴, 맥주호모, 결정셀룰로스, 생선콜라겐(대구)탄산칼슘, 스테아린산마그네슘, L-시스틴, 엘라스틴가수분해물(대구),

비타민B12, 판토텐산칼슘, 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽화크롬등

<효능 효과> 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지생성에 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T X 2

메가바이오킨



<성분 함량>

판토텐산칼슘, 니코틴산아미드, 비오틴, 비타민B1염산염, 비타민 B12, 비타민B6염산염, 비타민B2, 엽산, 호모8종, 호소3종리파아제, 프로테아제, 락타아제 외 뒷면

<효능 효과> 체내에너지생성에 필요, 세포와혈액생성에필요정상적인 엽산대사에 필요

<용법 용량> 1일 2회, 1회 1캡슐 <포장 단위> 120C x 2

울트라 소팔메토 파워킹



<성분 함량>

소팔메토 열매추출물, 글루콘산아연, 비타민B2, d-α-토코페롤, 대두유, L-아르지닌, 마카추출분말, 남가새열매추출물, 호박씨유, 토마토추출분말, 옥타코사놀(미강)

<효능 효과> 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음비타민B2 체내 에너지 생성에 필요의 완하

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취

<포장 단위> 60C x 2

슈퍼 소팔메토 옥타 포맨



<성분 함량>

소팔메토열매추출물, 옥타코사놀(미강), 글루콘산아연, 아셀렌산나트륨, 베타카로틴, L-아르지닌, 대두유, 호박씨유, 마카추출분말, 다미아나잎추출물, 남가새열매추출물, 비수리잎추출물, 백하수오추출분말

<효능 효과> 전립선건강유지, 아노 및 소변속도개선 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1캡슐 물과 함께 섭취

<포장 단위> 60C x 2

자양강장, 면역

바이탈비토닉



<성분 함량>

오렌지 주스 8.242mg, 화분 추출물 3,500mg, 꿀 2000mg, 밀배아 추출물 850mg, 로알젤리 400mg, 안식향산나트륨(합성보존료) 8mg

<효능 효과> 빠른 전신 회복, 집중력, 기억력, 지구력을 원하는 수험생, 고시생, 직장인, 각종 수술 후 빠른회복을 원하시는 분

<용법 용량> 1일 1회, 1앰플 <포장 단위> 15ml, 30V x 2

명품대반침향환



<성분 함량>

JH식물혼합분말[침향(인도네시아산), 감굴껍질(국산)참당귀, 천궁, 삼주(백출), 감초, 작약뿌리, 지황, 산수유,복령, 오미자, 계피, 구기자, 대추, 홍삼] 외 뒷면

<효능 효과> 원기회복, 활력증진, 체력증진혈액순환, 피로회복, 노화방지, 면역력개선에 도움

<용법 용량> 성인 1일 1회, 1환을 충분히 씹어서 드세요.

<포장 단위> 30환

면역파워킹



<성분 함량>

프로폴리스추출물, 산화아연, 상항버섯추출분말, 로알젤리, 화분추출분말, 보스웰리아추출분말, 물약, 자일리톨, 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘

<효능 효과> 항산화에 도움을 줄 수 있음정상적인 면역 기능에 필요정상적인 세포 분열에 필요

<용법 용량> 1일 1회 1캡슐

<포장 단위> 60C x 2

프리미엄 알부민 맥스파워



<성분 함량>

KD알부민혼합액{난백알부민가수분해물(건조난백분말:덴마크산,프로테아제),기타과당,사과농축액(사과:국산)},양태반추출액(양태반분말:호주산),오렌지농축액:스페인산),향료1,식물혼합농축액 외

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1병(30g)을 섭취하십시오.

<포장 단위> 30g x 30병 (총 900g /790 kcal)

슈퍼알파킹



<성분 함량>

비타민B1 질산염, 비타민B2, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 비타민B12, 비타민C, DL-알파-토코페릴초산염, 난백분말, 유청단백분말, L-로이신, L-발린, L-글루타민, L-아르지닌 외 뒷면

<효능 효과> 탄수화물과 에너지 대사에 필요. 체내에너지 생성 필요단백질 및 아미노산이용필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 2회, 1회1정 <포장 단위> 120T X 2

로알붐골드



<성분 함량>

비타민B1염산염, 비타민B2, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 비타민C, 비타민B12, 엽산, 난백분말, 제이인산칼슘, 결정셀룰로스, 로알젤리분말, L-글루타민, 정제의제피(히드록시프로필메틸셀룰로스), L-아르지닌, L-로이신, L-발린 외 뒷면

<효능 효과> 탄수화물과 에너지 대사에 필요. 체내에너지 생성 필요단백질 및 아미노산이용필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 2회, 1회 1정 <포장 단위> 120T X 2

아보스틴 케이



<성분 함량>

프로폴리스추출물, 산호칼슘(비소성), 비타민C, 아보카도추출분말, 옥수수수염추출분말, 식물스테롤, 난백분말, 락티카제이바실러스 파라카제이 LPc-G110, 사탕수수추출물, 망고스틴추출물 외 뒷면

<효능 효과> 항산화에 도움을 줄 수 있음, 뼈와 치아형성에 필요.

신경과 근육기능유지에 필요, 골다공증발생위험에 도움외 뒷면

<용법 용량> 성인 1일 1회 1정 <포장 단위> 60T x 2

이모스탄



<성분 함량>

프로폴리스추출물 200mg, 제이인산칼슘 560mg, 옥수수수염추출물 280mg, 리소짐 150mg, 식물스테롤 150mg, 아보카도추출물 100mg, 망고스틴 추출물 10mg 외 뒷면

<효능 효과> 뼈와 치아형성에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 신경과 근육기능 유지에 필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 30T x 2

슈퍼 인사튼 골드



<성분 함량>

프로폴리스 추출물, 제이인산칼슘, 옥수수추출물, 리소짐, 식물스테롤, 아보카도추출물, 망고스틴추출물 외 뒷면

<효능 효과> 뼈와 치아 형성에 필요. 신경과 근육기능 유지에 필요. 정상적인 혈액응고에 필요. 골다공증발생 위험감소 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T x 2

알베로프리미엄골드



<성분 함량>

프로폴리스 추출물, 탄산칼슘, 비타민C, 옥수수수염분말, 식물스테롤, 난백분말, 아보카도추출분말, 엠에스엠, 망고스틴추출물 외 뒷면

<효능 효과> 뼈와 치아형성에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요. 항산화에 도움을 줄 수 있음 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T x 2

이모스틴



<성분 함량>

프로폴리스추출물 200mg, 산호칼슘(비소성), 비타민C100mg, 옥수수수염분말, 난백분말, 아보카도추출분말, 망고스틴추출분말, 식물스테롤외 뒷면 참조

<효능 효과> 뼈와 치아형성에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 신경과 근육기능 유지에 필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 60T x 2

프로이톤 플러스



<성분 함량>

프로폴리스추출물 170mg, 제이인산칼슘725mg, 옥수수수염추출물 200mg, 식물스롤 130mg, 리소짐 120mg, MSM 20mg, 콜라겐(연어), 아보카도추출물 외 뒷면

<효능 효과> 뼈와 치아형성에 필요, 골다공증발생위험감소에 도움을 줌, 항산화작용에 도움, 신경과 근육기능유지에 필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T x 2

이모나 10C

미래제약
WWW.MIRAEPHARMKOREA.CO.KR



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 아스코르브산 150mg, 토코페롤아세테이트 20배산 10mg, 카르바조크롬 2mg

<효능 효과> 치주치료 후 치은염, 경 중증도 치주염의 보조치료

<용법 용량> 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용

<포장 단위> 10C

이모나 240C

종근당홀딩스
KyongboPharm



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 아스코르브산 150mg, 토코페롤아세테이트 20배산 10mg, 카르바조크롬 2mg

<효능 효과> 치주치료 후 치은염(잇몸), 경 중증도 치주염의 보조치료

<용법 용량> 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용

<포장 단위> 240C ((10Cx12ptp)x2)

이탄탄 플러스 20C

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 카르바조크롬 2mg, 토코페롤아세테이트 10mg, 아스코르브산 150mg

<효능 효과> 치주(치아주위조직) 치료후 치은염(잇몸염) 외 잇면

<용법 용량> 성인 1일 3회, 1회 1캡슐

<포장 단위> 20C

이탄탄 플러스 240C

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 카르바조크롬 2mg, 토코페롤아세테이트 10mg, 아스코르브산 150mg

<효능 효과> 치주(치아주위조직) 치료후 치은염(잇몸염) 외 잇면 (잇몸의 발적, 부기)

<용법 용량> 성인 1일 3회, 1회 1캡슐

<포장 단위> 120C x 2

이덴큐 캡슐 10C

대웅생명과학



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 제피아스코르브산 156.3mg, 토코페롤아세테이트 2배산 10mg, 카르바조크롬 2mg

<효능 효과> 치주(치아주위조직)치료후 치은염(잇몸염),경 중증도 치주(치아 주위조직)염의 보조치료

<용법 용량> 성인 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용

<포장 단위> 10C

이덴큐 캡슐 240C

대웅생명과학



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 제피아스코르브산 156.3mg, 토코페롤아세테이트 2배산 10mg, 카르바조크롬 2mg

<효능 효과> 치주(치아주위조직)치료후 치은염(잇몸염),경 중증도 치주(치아 주위조직)염의 보조치료

<용법 용량> 성인 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용

<포장 단위> 120C x 2

루테인 파워플러스



<성분 함량>

루테인복합물[마리골드꽃추출물(루테인), 홍화씨유]레티닐팔미트산염, 베타카로틴, D-알파-토코페롤, 산화아연, 대두유, 밀납, 정제어유(연어), 결명자추출물, 해바라기레시틴 외 뒷면

<효능 효과> 노화로 인해 감소될 수 있는 황반 색소 밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 외 뒷면

<용법 용량> 성인 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

파워 루테인킹



<성분 함량>

마리골드꽃추출복합물(마리골드꽃추출물, 대두유), 레티닐팔미트산염, d-알파-토코페롤, 산화아연, 베타카로틴, 대두유, 밀납, 정제어유(멸치), 대두레시틴, 헤마토코쿠스 추출물 외 뒷면

<효능 효과> 노화로 인해 감소될수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줌. 어두운 곳 시각적응 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

리얼골드 루테인



<성분 함량>

루테인복합물(마리골드꽃추출물,홍화씨유), 베타카로틴, D-A-토코페롤, 산화아연, 대두유, 밀납, 정제어유(연어), 결명자추출분말, 해바라기레시틴, 헤마토코쿠스추출분말 외 뒷면

<효능 효과> 노화로 인해 감소될수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줌. 눈의피로도 개선에 도움을 줌 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회,1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

슈퍼비전루테인



<성분 함량>

루테인(마리골드 꽃 추출물), 베타카로틴, 레티닐 팔미트산염, D-알파-토코페롤, 산화아연, 황산동, 대두유, 밀납(백납) 정제어유(멸치), 대두레시틴, 빌베리 추출물 외 뒷면

<효능 효과> 노화로 인해 감소될 수 있는 황반 색소 밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌

<용법 용량> 1 일 1회, 1 캡슐 <포장 단위> 90C x 3

슈퍼루테인 코드리버



<성분 함량>

루테인 20mg, 비타민A, 비타민E 외 뒷면

<효능 효과> 노화로 인해 감소 될 수 있는 황반색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 항산화 작용르 하여 세포 보호 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회,1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

자이젠헤파골드

Kwangdong



<성분 함량>

밀크시슬열매건조엑스 350mg

<효능 효과> 독성간질환, 만성간염, 간경변의 보조치료

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

리버킹

대웅생명과학



<성분 함량>

밀크시슬엑스 350mg

<효능 효과>

다음 질환의 보조치료- 독성 간 질환- 만성 간염- 간경변

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

가네맥스

GC 녹십자MS



<성분 함량>

밀크시슬엑스(생규) 350mg (실리마린으로서 196mg)

<효능 효과> 독성간질환, 만성간염, 간경변의 보조치료

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

리버타인액

VIVOZON PHARMACEUTICAL



<성분 함량>

L-아르기닌 7.31g, 베타인 5.0g, 베타인염산염 5.0g (베타인으로서 3.8135g), 시트르산수화물 2.94g, 첨가제: 벤조산나트륨 60mg 기타 첨가제: D-소르비톨액, 드링크향, 백당, 수크랄로스, 정제수, 카라멜

<효능 효과> 간질환의 보조 치료제

<용법 용량> 1일 10~30mL를 식간에(식사때와 식사때 사이에)분할 복용 이약 10mL를 약 반컵의 물에 희석(묽게)하여 복용한다.

<포장 단위> 20mL x 60V

리버파워킹



<성분 함량>

밀크씨슬추출물, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 니토킨산아미드, 비타민 B12, 비타민B1, 피리독신염산염아티초크추출물, 헛개나무추출물, 타우린, 쇠뜨기풀 외 뒷면

<효능 효과> 간 건강에 도움을 줄 수 있음, 체내에너지생성에 필요

<용법 용량> 1일 1회 1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

웅기보

대웅생명과학



<성분 함량>

밀크씨슬 추출물, 비타민 B6 염산염, 비타민 B1 염산염, 결정셀룰로오스 분말(가루, 과립), 건조 효모 분말(가루, 과립), 타우린 분말(가루, 과립), 헛개나무 추출물(추출액)분말(분말 추출물) 외 뒷면

<효능 효과> 간 건강에 도움을 줄 수 있음

<용법 용량> 1일 1회, 1회 2정 <포장 단위> 400포

콘티 600

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.



<성분 함량>

γ-오리자놀 5mg, 푸르셀티아민 60mg, 니코틴산아미드 60mg, 콜린타르타르산염 20mg, 판토텐산칼슘 15mg, 리보플라빈부티레이트 6mg, 이노시톨 20mg, 콘드로이틴설페이트나트륨 600mg, 피리독신염산염 25mg, 시아노코발라민 1000배산 20mg
<효능 효과> 육체피로, 임신, 수유기, 병중병후의 체력저하시
 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림등), 각기, 눈의 피로
<용법 용량> 만 12세이상 및 성인 : 1일 1회 1정 식후 복용
<포장 단위> 45T x 2

칼본맥스

GC 녹십자MS



<성분 함량>

산화마그네슘 20mg, 인산수소칼슘수화물 590mg, 글루콘산칼슘 수화물 170mg, 농축콜레칼시페롤 1mg 외 뒷면
<효능 효과> 임신, 수유기, 발육기, 노년기 비타민D보급, 뼈, 이의 발
 육불량, 구루병의 예방
<용법 용량> 12세~성인: 1일1회, 1회1캡슐
<포장 단위> 60C x 2

코랄칼디



<성분 함량>

리소짐염산염 30mg, 아스코르브산 150mg, 토코페롤아세테이트 2배산 10mg, 카르바조크롬 2mg, 옥수수전분 75mg 외 뒷면
<효능 효과> 치추치료 후 치은염(잇몸), 경·중등도 치주염의 보조치료
<용법 용량> 1일 3회, 1회 1캡슐 식후복용 **<포장 단위>** 120T x 2

슈퍼코랄칼마디



<성분 함량> 산화칼슘(비소성), 산화마그네슘, 비타민D3, 글루콘산아
 연, 유단백추출물, 비타민K2, 우유함유 그외 뒷면 참조
<효능 효과> 뼈와 치아 형성에 필요. 신경과 근육 기능에 유지
 골다공증발생위험 감소에 도움을 줌 그외 뒷면 참조
<용법 용량> 1일 1회, 1회 1정 **<포장 단위>** 90T X 2

슈퍼뮤코다당·단백 콘드로이친킹



<성분 함량>

뮤코다당·단백 (철갑상어), 황산망간, 결정셀룰로스, 유단백가수분해
 물, 난각추출물, 보스웰리아추출물, 글루코사민황산염, 초록입홍합
 분말, 전칠삼뿌리추출물, 우슬추출물, 히알루론산 그외 뒷면참조
<효능 효과> 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 외 뒷면
<용법 용량> 1일 1회, 1정 **<포장 단위>** 60T x 2

조인트킹 MSM



<성분 함량>

엠에스엠(MSM),비타민D3,철갑상어연골분말,보스웰리아추출물, 유단백추출분말,난각막추출분말,전칠삼뿌리분말,초록입홍합분말, 히알루론산,이산화규소,스테아린산마그네슘 외 뒷면 참조

<효능 효과> 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음. 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌.

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 90T x 2

슈퍼엠에스엠지 조인트



<성분 함량>

엠에스엠 1,500mg, 산화마그네슘 200mg, 황산망간 60mg, 비타민D3 20ug, 보스웰리아추출물 300mg, 글루코사민황산염 200mg 외 뒷면참조

<효능 효과> 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의형성과 유지에 필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 2회, 1회 1정 <포장 단위> 90T x 2

슈퍼블루 조인트MSM



<성분 함량>

엠에스엠(MSM), 비타민D3, 청상어연골분말, 유단백추출분말, 난각막추출분말, 초록입홍합분말, 글루코사민황산염, 텔크 외 뒷면

<효능 효과> 관절 및 연골건강에 도움을 줄수있음뼈의 형성과 유지에 필요칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 90T x 2

우슬닭발 환 250g



<성분 함량>

우슬(국산) 40%, 닭발추출물(닭발50%,국산,정제수)40%, 오가피(국산)4%,홍화씨4%,두충4%,당귀2%,천궁2%,백출2%,감초2%외

<효능 효과> 관절건강에 도움을 줄 수 있음

<용법 용량> 1일 2~3회, 1회 15~30알 복용 <포장 단위> 250 g

마이크로바이옴 피비탑 골드



<성분 함량>

락토바실러스 람노시스, 락토바실러스 애시도필러스, 락토바실러스 카제이, 락토바실러스 델브루에키아종불가리쿠스, 락토바실러스 가세리, 락토바실러스 헬베티커스 외 락토바실러스

<효능 효과> 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음
배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

마이크로바이옴 락토 에이 플러스



<성분 함량>

글루콘산아연, 락티플란티바실러스 플란타룸, 락토코커스 락티스, 락티카제이바실러스 카제이, 비피도박테리움애니멀스종, 유산균사균체3종분말 초유 외 락토

<효능 효과> 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음
배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

마이크로바이옴 듀오락토킹



<성분 함량>

락티플란티바실러스 플랜타룸, 락티카제이바실러스 람노시스, 락티카제이바실러스 카제이, 리모시락토바실러스 퍼만텀, 리모시락토바실러스 루테리 외 락토

<효능 효과> 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 정상적인면역기능, 정상적인세포분열에 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

리얼마이크로바이옴 이너굿락토



대웅생명과학



<성분 함량>

유산균혼합분말(enterococcus faecium, lacti caseibacillus paracasei, lactiplantibacillus plantarum) 외 락토

<효능 효과> 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음
배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 정상적인면역, 세포분열에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 30C x 2

락토데오스케이



<성분 함량>

프로바이오틱블랜드(락티카제이바실러스 람노시스, 락토바실러스 아시도필루스, 락티플란티바실러스 플란타룸, 리기락토바실러스 살리바리우스, 리모시락토바실러스 루테리 외 락토

<효능 효과> 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원할·장 건강에 도움을 줄 수 있음

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

당케어&락토피스5.0



<성분 함량>

락티플란티바실러스 플랜타룸, 락티카제이바실러스 람노시스, 락티카제이바실러스 카제이, 리모시락토바실러스 퍼만텀, 리모시락티바실러스 루테리, 락토바실러스 애시도필러스 외 락토

<효능 효과> 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음
배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C X 2

징코멕스정 120mg

 **GC녹십자MS**



<성분 함량>

은행엽엑스 120 mg

<효능 효과> 말초 동맥 순환 장애, 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명, 두통, 기억력 감퇴, 기질성 뇌 기능 장애

<용법 용량> 성인 1일 3회 또는 1일 2회 <포장 단위> 100T x 2

마그투 연질캡슐

 **대웅제약**



<성분 함량>

토코페롤아세테이트 500mg, 산화마그네슘 250mg, 피리독신염산염 50mg, 티아민질산염 50mg, 감마오리자놀 5mg 외 뒷면

<효능 효과> 육체피로, 임신, 수유기, 병중병후, 체력저하시말초혈행장애 및 갱년기시 어깨, 목결림, 수족저림 외 뒷면

<용법 용량> 만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 <포장 단위> 60C x 2

행코민정

 **Kwangdong**
광동제약



<성분 함량>

은행엽엑스 120mg

<효능 효과> 말초동맥 순환장애, 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감 등 외 뒷면

<용법 용량> 성인 1일 3회 또는 1일 2회

<포장 단위> 100T x 2

행맥정 120mg

 **대웅생명과학**



<성분 함량>

은행엽엑스(생규 120mg (총 키크로플라본배당체로서 28.8mg)

<효능 효과> 말초동맥순환장애간혈성파행증의 치료, 어지러움, 이명, 기질성 뇌 기능 장애의 치료

<용법 용량> 성인 1일 3회 또는 1일 2회

<포장 단위> 100T x 2

마그원매코정

 **Kwangdong**
광동제약



<성분 함량>

산화마그네슘, 리보플라빈, 메코발라민, 셀레늄함유건조효모, 피리독신염산염, 토코페롤아세테이트 2배산, 감마오리자놀

<효능 효과> 육체피로, 임신, 수유기, 병중병후, 노년기, 말초혈행장애 갱년기 외 뒷면

<용법 용량> 만15세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정

<포장 단위> 60T X 2

징코센텔리아



<성분 함량>

은행잎추출물, 산화아연, 병풍잎추출물, L-아르지닌, 서양산사자, 닛토추출물, 감마오리자놀, 마늘유 외 뒷면 참조

<효능 효과> 혈행개선에, 도움을 줄 수 있음, 기억력개선, 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T x 2

폴리다운콜



<성분 함량>

홍국, 은행잎추출물, 프랑스해안송껍질추출물, D-소비롤(감미료), 사탕수수추출물, 병풍잎추출물, 감마오리자놀, 서양산사자추출물, 코엔자임Q10, 마늘추출물 외 뒷면

<효능 효과> 기억력개선 혈행개선에 도움, 혈중콜레스테롤개선에 도움

<용법 용량> 1일 1회, 1정 <포장 단위> 60T x 2

마그징코시아



<성분 함량>

산화마그네슘, 은행잎추출물, 글루콘산아연, 비타민D3, 비타민B12, 병풍추출물, 프랑스해안나무껍질추출물, L-아르지닌, 사탕수수추출물, 텔크, MCT오일, 감마오리자놀, 서양산사자의 뒷면

<효능 효과> 기억력개선 혈행개선에 도움을 줄수 있음신경과 근육기능유지에 필요. 정상적인 면역기능에 필요 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 60T x 2

브레인 알파포스파티딜



<성분 함량>

포스파티딜세린, 은행잎추출물, d-a-토코페롤, 글루콘산아연, 대두유, 원지추출분말, 복령추출분말, 석창포추출분말 그외 뒷면

<효능 효과> 기억력개선, 혈행개선, 노화로 인해 저하된 인지력의

<용법 용량> 1일 2회, 1회 1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

레드비타킹



<성분 함량>

d-α-토코페롤, 소나무잎증류농축액, 헤마토코쿠스추출물, 글리세린, 변성전분, 카라기난, 덱스트린, D-소비롤액

<효능 효과>

항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호

<용법 용량> 1일 1회 1정 <포장 단위> 60C x 2

로얄적송 동충하



<성분 함량>

솔잎증류농축분말, 밀리타리스 동충하, 침향, 홍삼, 녹용, 영지버섯, 사양벌꿀, 글리세린, 작약, 유황, 황기, 감초, 참당귀, 진피 외 뒷면

<효능 효과> 면역세포 활성화에 도움, 피로회복, 간 건강, 콜레스테롤 관리에 도움

<용법 용량> 1일 1회 1환 <포장 단위> 30환

엔터릭 슈퍼 알티지 오메가 3킹



<성분 함량>

정제어유(멸치), 비타민D3, D-알파-토코페롤EPA+DHA1,100mg

<효능 효과> EPA 및 DHA 함유유지: 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음, 비타민D: 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

슈퍼레드 rTG오메가 3킹



<성분 함량>

정제어유(멸치), 비타민D3, 헤마토코쿠스추출물D-알파-토코페롤, EPA 700mg, DHA 400mg

<효능 효과> EPA 및 DHA 함유유지: 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 60C x 2

스페셜 알티지 오메가3



<성분 함량>

비타민E혼합제제(d-a-토코페롤,대두유), 비타민D3혼합제제, 비타민E, EPA 및 DHA 함유 외 뒷면

<효능 효과> 기억력개선, 혈행개선도움, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움, 항산화 작용으로 세포 보호

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1캡슐 <포장 단위> 90C x 2

스페셜 알티지 오메가3 플러스



<성분 함량>

Refined fish-Oil 1307.5mg, Vitamin E, Vitamin D3외 뒷면

<효능 효과> 혈중 중성지질 개선·혈행개선·기억력개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1캡슐 <포장 단위> 180C x 2

콜라겐, 여성

리쥬드비에 크림

Kwangdong
광동제약



<성분 함량>

PDRN 1,300ppm, 나이아신아마이드, 콜라겐 20,000ppm 외 뒷면

<용법 용량> 본품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바름

<포장 단위> 20g

원데이콜라겐

대웅생명과학



<성분 함량>

저분자 피쉬콜라겐(베트남산, 방글라데시산), 포도당, 레몬농축분말[덱스트린, 레몬농축액(이스라엘산)], 자일리톨, 치커리뿌리추출분말(벨기에산), 비타민C, 프락토올리고당, 이소말트 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취

<포장 단위> 60P x 2

제이헬스 나노 콜라겐 펩타이드

대웅생명과학



<성분 함량>

초저분자 나노 어린(魚鱗)콜라겐 액상(고형분 50%), 액상피쉬콜라겐펩타이드500(고형분65%), 정제수, 사양벌꿀(국산), 사과농축액(국산), DL-사과산, 석류농축액(이란산), 유자농축액, 세븐베리농축액 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1회, 1회 1병(20ml) <포장 단위> 20mL x 30병

시스틴 500

알앤피코리아



<성분 함량>

L-시스틴 500 mg

<효능 효과> 습진, 두드러기, 피부 발진, 여드름, 손톱, 발톱이나 머리카락이 쉽게 갈라지는 등의 각질부위 질환의 치료

<용법 용량> L-시스틴으로서 1일 1000~2000 mg을 1개월 중 10~20일간 복용 <포장 단위> 90C x 2

스벨트정

GAO Pharm
가오약품



<성분 함량>

방풍통성산건조엑스에프 237.5mg


<효능 효과> 배에 피하지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상: 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비

<용법 용량> 성인 1회 2정~4정씩, 1일 3회 식전 또는 식간 복용

<포장 단위> 360T x 2

유니센타

UNIMED
유니메드제약



<성분 함량>

자하거엑스(별규) 1.5ml, 티아민질산염 5mg, 리보플라빈포스페이트나트륨 6.85mg, 피리독신염산염 5mg, 니코틴산아미드 20.0mg, 카페인무수물 30.0mg

<효능 효과> 자양강장, 허약 체질, 육체 피로, 병후의 체력저하, 식욕부진, 영양 장애, 발열·소모성 질환

<용법 용량> 성인 1일 1회, 1병 복용

<포장 단위> 60병 (20mL/병 x30) x 2

● 콜라겐, 여성

여신콜라겐 20ml



<성분 함량>

정제수, 글리세린, 나이아신아마이드, 하이드롤라이즈드콜라겐 20,000ppm 외 뒷면 참조

<용법 용량> 세안 후 기초 스킨케어 마지막 단계에 적당량을 피부 겉에 따라 바름. 휴대하여 수시로 손, 목 등 바름

<포장 단위> 20ml x 10개

여신콜라겐 PDRN



<성분 함량>

정제수, 글리세린, 나이아신아마이드, 하이드롤라이즈드콜라겐 20,000ppm 외 뒷면 참조

<용법 용량> 세안 후 적당량을 얼굴에 펴 발라 흡수

<포장 단위> 100ml

여신시카 센텔라 마데카소사이드 Kwangdong



<성분 함량>

정제수, 글리세린, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 부틸렌글라이콜, 에탄올, 나이아신아마이드, 돌콩 추출물 외 뒷면

<용법 용량> 본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바름

<포장 단위> 20ml

여신 PDRN 더마솔루션 NO6.크림

Kwangdong



<성분 함량>

나이아신아마이드, PDRN, 아데노신, 세라마이드, 하이드롤라이즈드콜라겐, 레티놀, 프로판다이올 외 뒷면

<효능 효과> 피부의 미백 및 주름 개선에 도움

<용법 용량> 본품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바름

<포장 단위> 30ml

여신 비타B12 펩타이드 Kwangdong



<성분 함량>

정제수, 글리세린, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 부틸렌글라이콜, 에탄올, 나이아신아마이드, 돌콩 추출물 외 뒷면

<용법 용량> 본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바름

<포장 단위> 20ml

여신 비타민C 글루타치온 Kwangdong



<성분 함량>

나이아신아마이드, 판테놀, 히알루론산, 글루타치온, 비타민C 유도체 외 뒷면

<용법 용량> 세안 후 적당량을 얼굴에 펴 발라 흡수

<포장 단위> 20ml

철분제, 갱년기

헤모드림 60C

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



<성분 함량>

철단백추출물 155mg, 시아노코발라민 500mg, 폴산 800ug

<효능 효과> 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

<용법 용량> 성인 및 12세 이상 1일 1회, 1캡슐 식후 복용

<포장 단위> 30C x 2

헤모드림 120C

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



<성분 함량>

철단백추출물 155mg, 시아노코발라민 500mg, 폴산 800ug

<효능 효과> 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

<용법 용량> 성인 및 12세 이상 1일 1회, 1캡슐 식후 복용

<포장 단위> 60C x 2

웨어모아 60C

BORYUNG 보령제약



<성분 함량>

시아노코발라민 500 ug, 엽산 800 ug, 철 단백질 추출물 155 mg

<효능 효과> 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

<용법 용량> 성인 및 12세 이상 : 1일 1회, 1회 1캡슐

<포장 단위> 60C (30C x 2)

웨어모아 120C

BORYUNG 보령제약



<성분 함량>

시아노코발라민 500 ug, 엽산 800 ug, 철 단백질 추출물 155 mg

<효능 효과> 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

<용법 용량> 성인 및 12세 이상 : 1일 1회, 1회 1캡슐

<포장 단위> 120C (60C x 2)

멜린씨

Kwangdong 광동



<성분 함량>

L-시스테인 120mg, 아스코르브산 97%과립 516mg, 판토텐산칼슘 50mg

<효능 효과> 다음 경우의 비타민C의 보급 - 육체피로, 임신, 수유기, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복후)의 체력 저하시 외 뒷면

<용법 용량> 만 8세 이상 어린이 및 성인 1회 1정, 1일 1회 복용

<포장 단위> 60T x 2

심미안

HLB제약



<성분 함량>

세인트존스워트 80%, 메탄올건조엑스 84mg, 서양승마추출액 0.0364mL

<효능 효과> 갱년기 다음증상의 완화 홍조, 땀이 남, 정신적 긴장, 신경과민, 집중력부족, 불면, 불안 또는 우울증상, 생리전의 불쾌감

<용법 용량> 성인 1일 2회, 1회 1정, 필요 시 1회 2정, 1일 2회

<포장 단위> 120T x 2

소화기관용제, 위통, 속쓰림

베아로제정

일양약품



- <성분 함량>**
판크레아틴 175mg, 셀룰라제 50mg, 우담즙건조엑스 25mg, 디메티콘 25mg
- <효능 효과>** 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체합, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부 (상복부) 팽만감
- <용법 용량>** 만 15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식수에 복용
- <포장 단위>** 10T

스토포스정

메딕스제약



- <성분 함량>**
반하 835mg, 황금 500mg, 건강 415mg, 인삼 500mg, 감초 500mg, 대추 500mg, 황련 165mg, 이상건조엑스로서 500mg
- <효능 효과>** 급·만성 위장카타르, 발효설사, 소화불량, 위하수(위치집), 신경성위염, 위장허약, 속취, 트림, 속쓰림 외 뒷면
- <용법 용량>** 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용
- <포장 단위>** 20T

파메딘정 240T

유한메디카



- <성분 함량>**
파모티딘 10mg
- <효능 효과>** 위산과다, 속쓰림, 신트림
- <용법 용량>** 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용 가능 **<포장 단위>** 240T

파메딘정 20T

유한메디카



- <성분 함량>**
파모티딘 10mg
- <효능 효과>** 위산과다, 속쓰림, 신트림
- <용법 용량>** 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용 가능 **<포장 단위>** 20T

파베린정

Kwangdong



- <성분 함량>**
디시클로민염산염 5mg, 파파베린염산염 15mg
- <효능 효과>** 위통, 복통(배아픔), 산통, 위산과다, 속쓰림
- <용법 용량>** 성인(만 15세 이상) : 1회 2정, 1일 2~3회, 만 8세이상~만 15세미만 : 1회1정, 1일 2~3회, 식후 또는 식간에 복용 외 뒷면
- <포장 단위>** 10T

장엔폴 캡슐

일양약품



- <성분 함량>**
아크리놀수화물 10mg, 베르베린염화물수화물 25mg, 비스무트차질산염 100mg, 스코폴리아엑스 5mg
- <효능 효과>** 설사, 복통을 수반하는 설사, 체합, 묽은 변, 토사
- <용법 용량>** 만 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐을 1일 3회 식후에 복용, 복용간격은 4시간 이상
- <포장 단위>** 10C

벤즈날정

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.



<성분 함량>

트리메부틴말레산염 100mg

<효능 효과> 식도역류 및 열공(구멍, 틈새)헤르니아(탈장), 위십이지장염, 위십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토) 과민성대장증후군 및 경련성 결장 외 뒷면

<용법 용량> 성인 1일 3회, 1회 1~2정을 식전에 복용

<포장 단위> 10T

다이제스트정

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.



<성분 함량>

판크레아틴 175mg, 우담즙건조엑스 25mg, 디메티콘 25mg, 셀룰라제 50mg

<효능 효과> 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체합, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

<용법 용량> 만 15세 이상: 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용

<포장 단위> 10T

비카린엠 장용정

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.



<성분 함량>

도큐세이트나트륨 20mg, 센나엽가루 100mg, 비사코딜 7mg

<효능 효과> 변비에 따른 증상완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부 팽만, 장내이상발효, 치질

<용법 용량> 1회 1~2정을 1일 1회 취침시(공복시)에 복용
다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량 <포장 단위> 20T

삼메틴정

오스틴제약(주)



<성분 함량>

트리메부틴말레산염 150mg

<효능 효과> 식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토) 외 뒷면

<용법 용량> 성인 1회 1정 1일 3회 식전 경구 투여

<포장 단위> 10T

위엔스탈정

Kwangdong



<성분 함량>

침강탄산칼슘 100mg, 탄산수소나트륨 50mg, 트리메부틴말레산염 50mg, 메타규산알루미늄산마그네슘 40mg, 감초가루 25mg 외 뒷면

<효능 효과> 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴 외 뒷면

<용법 용량> 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

<포장 단위> 10T

메부라틴정

Kwangdong



<성분 함량>

트리메부틴말레산염 150mg

<효능 효과> 1)식도역류 및 열공 헤르니아, 위-십이지장염, 위십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
2)과민성대장증후군 및 경련성 결장 3)소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사)

<용법 용량> 성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg, 1일 3회 식전에 경구투여 <포장 단위> 10T

소화기관용제, 위통, 속쓰림

이너베린정

종근당홀딩스



<성분 함량>

디시클로민염산염 5mg, 파파베린염산염 15mg

<효능 효과> 위통, 복통(배아픔), 산통, 위산과다, 속쓰림

<용법 용량> 성인: 1회 2정, 1일 2~3회, 만8세이상~만15세미만: 1회 1정, 1일 2~3회 식후 또는 식간에 복용, 다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용 <포장 단위> 10T

로페라미드염산염캡슐

Global Leaders in human healthcare
GL 지엘파마



<성분 함량>

로페라미드염산염 2mg

<효능 효과> 급성설사, 만성설사

<용법 용량> 성인 급성설사: 초회량은 로페라미드염산염으로서 4mg 경구투여 후 묽은 변이 있을 때마다 2mg씩 투여, 1일 상용량은 6~8mg이며, 1일 최대 투여량은 16mg 외 뒷면

<포장 단위> 10C

락토딘 캡슐

Hansol



<성분 함량>

락토바실루스스포르게네스균 20mg(생균수로서 2×10^8), 우르소데옥시콜산 10mg

<효능 효과> 소화불량, 식욕감퇴, 과식, 체함

<용법 용량> 만 8세 이상: 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용

<포장 단위> 10C

베아로제에스정

Hansol



<성분 함량>

판크레아틴 175mg, 셀룰라제 50mg, 우르소데옥시콜산 10mg, 디메티콘 25mg

<효능 효과> 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부 (상복부) 팽만감

<용법 용량> 만 15세 이상 성인 1회 2정 1일 3회 식후에 복용

<포장 단위> 10T

속크린에스정

Hansol



<성분 함량>

진피 11mg, 회향 12mg, 정향 6mg, 겐티아나 7.5mg, 탄산수소나트륨 312.5mg, 합성규산알루미늄 136.7mg, 탄산마그네슘 13mg 외 뒷면


<효능 효과> 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역 외 뒷면

<용법 용량> 만 15세이상 1회 2정, 1일3회 식후 30분 복용

<포장 단위> 10T

시알딘정

Yn 유희메디칼



<성분 함량>


시메티딘 50mg, 규산알루미늄산마그네슘 100mg, 히드로탈시트 125mg, 탄산수소나트륨 100mg

<효능 효과> 위통, 속쓰림, 체함, 구역

<용법 용량> 성인(15세 이상 80세 미만): 1회 2정씩 복용, 필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩 1일 3회까지 복용 외 뒷면

<포장 단위> 240T

올바펜정



<성분 함량> 아세트아미노펜 500mg, 푸르셀티아민 20mg
<효능 효과> 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 관절통 외 뒷면
<용법 용량> 성인 : 1회1~2정, 1일 3회 공복(빈 속)시를 피하여 복용, 복용 간격은 4시간 이상
<포장 단위> 10T

육신정



<성분 함량> 아세트아미노펜 400mg, 카페인무수물 10mg, 푸르셀티아민 8mg
<효능 효과> 감기의 제증상(인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
<용법 용량> 성인 1회1정, 1일 3회 식후 30분에 복용
<포장 단위> 10T

노즈팡정



<성분 함량> 메퀴타진 133mg, 벨라돈나총알칼로이드 0.13mg, 글리시리진산이칼륨 20mg, 슈도에페드린염산염 45mg, 카페인무수물 30mg
<효능 효과> 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리무거움
<용법 용량> 만 15세 이상: 1일 3회, 1회 1정 매 식후에 복용
<포장 단위> 10T

콜다나정



<성분 함량> 아세트아미노펜제피세립(아세트아미노펜으로서 200mg) 215.5mg
<효능 효과> 감기의 제증상(여러증상)(인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
<용법 용량> 만 15세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용
<포장 단위> 10T

파이네신 캡슐



<성분 함량> 은교산건조엑스 490mg, 금은화 710mg, 연교 710mg, 박하, 길경, 감초, 담죽엽, 형개, 두시, 우방자, 영양각
<효능 효과> 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통
<용법 용량> 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용
<포장 단위> 10C

● 호흡기, 감기 - 아이월드

월드로신 캡슐

(주)아이월드제약



<성분 함량>

금은화 710mg, 박하 426mg, 감초 426mg, 형개 284mg, 우방자 356mg, 연교 710mg, 길경 426mg, 담죽엽 284mg, 두시 356mg, 영양각 22mg 이상 연조엑스로서 490mg(건조물로서 245mg)

<효능 효과> 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

<용법 용량> 성인 1일 3회 1회 2캡슐씩 식전 또는 식후에복용

<포장 단위> 10C

스토마신 캡슐

(주)아이월드제약



<성분 함량>

구풍해독탕건조엑스(별규)로서 685mg


<효능 효과> 인후가 부어서 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

<용법 용량> 보통 성인 : 1회 2캡슐,

1회 7~14세 성인 용량의 2/3, 4~6세 성인 용량의 1/2, 2~3세 성인 용량의 1/3, 1세 이하 성인 용량의 1/4을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 10C

마이에신정

Hansol



<성분 함량>

은교산연조엑스 980mg

<효능 효과> 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

<용법 용량> 성인 1정 2정 7세~14세 1회 1정

1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용

<포장 단위> 10T

기가파워 연질캡슐

Hansol



<성분 함량>

카르보시스테인 125mg, 브롬헥신염산염 2mg

<효능 효과> 가래, 기침을 유발하는 가래

<용법 용량> 성인 및 15세 이상의 소아: 1일 3회, 1회 2캡슐을

식후에 경구투여, 8~14세 소아: 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후에 경구 투여 <포장 단위> 10C

넥크린 과립

Hansol



<성분 함량>

연교 0.83g, 감초 0.83g, 천궁 0.33g, 아선약 0.67g, 박하 1.33g, 길경 0.83g, 사인 0.33g, 가자 0.33g, 대황 0.33g 외 뒷면

<효능 효과> 쉰 목소리, 인후(목구멍) 불쾌감

<용법 용량> 보통 성인 1회 용량을 1일 3회 식전 또는 식간에

복용 <포장 단위> 6P

프로신 프로폴리스 캡슐

Hansol



<성분 함량>

프로폴리스 추출분말(플라보노이드 6%이상 중국산)산화아연, 제이인산칼슘, 식물혼합추출분말(덱스트린도라지추출분말, 인동초추출분말, 민들레추출분말, 대추추출분말, 백작약추출분말 외 뒷면

<효능 효과>

항산화에 도움을 줄수있음, 아연 정상적 면역, 정상적인 세포분열

<용법 용량> 1일 2회, 1회 2캡슐 <포장 단위> 10C

비염,알레르기

세티스정

 일양약품



<성분 함량> 세티리진염산염10mg
<효능 효과> 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성, 두드러기, 피부소양증 외 뿔면
<용법 용량> 성인 및 6세 이상의 소아: 세티리진염산염으로서 1일 1회 10mg 취침 전에 경구 투여, 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁 분할 투여 외 뿔면 **<포장 단위>** 10T

러지피드정

 주식회사 하이플
Highfly Co.,Ltd.



<성분 함량>
 슈도에페드린염산염 60mg, 트리프롤리딘염산염수화물 2.5mg
<효능 효과> 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
<용법 용량> 성인 : 1회 1정, 소아(12~14세) : 1회 1/2정, 1일 3회 식후에 복용
<포장 단위> 10T

아르텍 연질캡슐

 알앤피코리아



<성분 함량> 세티리진염산염 10 mg
<효능 효과> 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성(원인 불명의) 두드러기, 피부 소양증(가려움증)
<용법 용량> 성인 및 6세 이상의 소아: 1일 1회, 1회 1캡슐(세티리진염산염으로서 10mg)취침 전에 복용, 기타 내지참조
<포장 단위> 10C

세로테정


 일양약품



<성분 함량> 세티리진염산염 10 mg
<효능 효과> 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부 소양증, 하이드로코티손외용제와 병용에 의한 습진, 피부염
<용법 용량> 성인 및 6 세 이상의 소아: 1일 1회, 1회 1정(세티리진염산염으로서 10mg) 취침전 복용, 기타 내지참조
<포장 단위> 10 T

트리페린정

 알파제약
ALPHA PHARM CO., LTD.



<성분 함량>
 염산트리프롤리딘 2.5mg, 염산슈에페드린 60mg
<효능 효과> 코감기, 알레르기성 및 혈관운동성에 코염에 의한 다음 증상 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
<용법 용량> 성인: 1회 1정, 소아(12세~14세)1회1/2정, 1일 3회 식후 복용 **<포장 단위>** 10T

로라딘 연질캡슐

 Hansol




<성분 함량> 로라타딘 10mg
<효능 효과> 알레르기성 비염 증상의 일시적인 완화, 만성 특발성 두드러기 증상 완화
<용법 용량> 성인 및 12세 이상의 소아: 1일 1회 1캡슐을 경구 투여, 6~12세 미만의 소아(체중 30kg 이상) : 1일 1회 1캡슐 투여
<포장 단위> 10C

아루진정




<성분 함량>
인진호탕건조엑스 53.3mg, dl-메틸에페드린염산염 12mg,
클로르페니라민말레산염 4mg
<효능 효과> 두드러기, 습진, 가려움증, 꽃
<용법 용량> 성인(15세이상): 1회 1정 1일 3회 식후에 복용
<포장 단위> 10T

파이에온정



<성분 함량>
인진호탕건조엑스 53.33mg, 클로르페니라민말레산염 4mg,
DL-메틸에페드린염산염 12mg
<효능 효과> 두드러기, 습진, 가려움증, 꽃
<용법 용량> 성인: 1회 1정 1일 3회 식후에 복용
<포장 단위> 10T

트립라인정



<성분 함량>
결정트립신 1mg, 브로멜라인 40 mg
<효능 효과> 수술 및 외상후, 유즙울체(젖고임), 일반염증
<용법 용량> 성인: 초기 1일 4회, 1회 2정, 이후 유지량으로 1일 4회, 1회 1정 복용
<포장 단위> 10T

인플라정

Kwangdong



<성분 함량>

브로멜라인 40mg, 결정트립신 1mg

<효능 효과> 수술 및 외상(상처)후 염증완화, 유즙울체(젖고임)

<용법 용량> 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용 <포장 단위> 10T

맥센 연질캡슐

일양약품



<성분 함량>

나프록센 250mg

<효능 효과> 루마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 건(힘줄)염, 급성통풍, 월경근란증 외 뒷면

<용법 용량> 1. 루마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염: 성인 나프록센으로서 1회 250~500mg 1일 2회(12시간마다) 경구투여
2. 급성통풍: 성인 나프록센으로서 초회량으로 750mg경구투여 후 발작이 사라질 때까지 8시간 간격으로 250mg 투여 외 뒷면

<포장 단위> 10C

이브터치 연질캡슐

일양바이오팜(주)



<성분 함량>

이부프로펜 400mg, 파마브롬 25mg

<효능 효과> 두통, 치통, 발치후 통증(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결림) 외 뒷면

<용법 용량> 만 15세 이상 성인 : 1일 1~3회, 1회 1캡슐, 공복시를 피하여 복용, 복용간격 4시간 이상 <포장 단위> 10C

리오루펜정

알파제약
ALPHA PHARM CO., LTD.



<성분 함량>

이부프로펜 400mg

<효능 효과> 류마티양 관절염, 연소성 류마티양 관절염, 골관절염, 감기로 인한 발열 및 통증, 요통, 월경근란증, 수술후 통증 외 뒷면

<용법 용량> 성인 이부프로펜으로서 1회 200~600mg 1일 3~4회 경구 투여 외 뒷면 <포장 단위> 10T X 100

배노신

(주)아이월드제약



<성분 함량>

길경 0.67g, 감초 0.5g, 대추 0.5g, 작약 0.5g, 건강 0.165g, 지실 0.5g

<효능 효과> 발적, 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농성 질환

<용법 용량> 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 10C

이부프로펜 연질캡슐

Hansol



<성분 함량>

이부프로펜 200mg

<효능 효과> 감기로 인한 발열 및 통증, 허리통증, 생리통, 관절염, 수술 후 통증 등

<용법 용량> 1. 관절염: 성인 이부프로펜으로서 1회 200~600mg 1일 3~4회 경구투여 2. 연소성 류마티양 관절염: 1일 체중 kg당 30~40mg을 3~4회 분할 경구투여 외 뒷면 <포장 단위> 10C

뉴클로정

Hansol



<성분 함량> 클로닉신리시네이트 125mg

<효능 효과> 근육통, 신경통, 외상 후 및 수술 후 통증, 두통, 치통, 귀통증

<용법 용량> 1회 125~250mg을 1일 3회 경구 투여

<포장 단위> 10T

에스빈 연질캡슐

Hansol



<성분 함량> 메시부프로펜 300mg

<효능 효과>

만성 다발성 관절염, 류마티스관절염, 관절증, 강직척추염, 외상 및 수술후 통증성 부종(부기) 또는 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

<용법 용량> 1회 1캡슐, 1일 2~4회 복용 1일 4캡슐을 초과하지않는다.

<포장 단위> 10C

● 근육이완, 경련

다미속 캡슐

Medix 메디스제약
MEDIX PHARM. CO., LTD.



<성분 함량>

작약 1g, 감초 1g, 이상 건조엑스로서 350mg

<효능 효과> 급격히 일어나는 근육의 경련을 수반하는 통증

<용법 용량> 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 10C

통케어정

일양바이오팜(주)



<성분 함량>

클로르족사존 150mg, 에텐자미드 150mg, 카페인수화물 25mg

<효능 효과> 신경통, 요통(허리통), 어깨결림

<용법 용량> 성인 1회 1~2정 1일 2회 동통(통증) 또는 발작시에 복용

<포장 단위> 10T

해농정

Hansol



<성분 함량> 감초 500mg, 길경 670mg, 대추500mg, 배농산급탕수침건조엑스 400mg, 작약 500mg, 지실500mg 외 뒷면

<효능 효과> 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농성질환

<용법 용량> 성인 1회 2정, 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 10T

푸르펜엠정

Kwangdong



<성분 함량>

아세트아미노펜 400mg, 푸르셀티아민 8mg, 산화마그네슘 80mg

<효능 효과> 두통, 치통, 발치후 동통(통증), 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결림) 외 뒷면

<용법 용량> 만15세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 3회까지로 하고 공복(빈속)시를 피하여 복용, 복용간격은 4시간 이상

<포장 단위> 10T

렉스펜에스정

Hansol



<성분 함량>

클로르족사존 150mg, 에텐자미드 150mg, 카페인수화물 25mg

<효능 효과> 신경통, 요통(허리통), 어깨결림

<용법 용량> 성인 1회 1~2정, 1일 2회 동통(통증) 또는 발작 시에 복용

<포장 단위> 10T

작감정

Hansol



<성분 함량>

작약 1000mg, 감초 1000mg, 작약감초탕연조엑스 500mg

<효능 효과> 급격히 일어나는 근육의 경련을 수반하는 통증

<용법 용량> 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 10T

수면유도제, 불면증

아졸정

알파제약(주)
ALPHA PHARM. CO., LTD.



<성분 함량>

독시라민석시네이트 25mg

<효능 효과> 불면증의 보조치료 및 진정

<용법 용량> 성인: 독시라민석시네이트로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여, 연령·증상에 따라 적절히 증감

<포장 단위> 10T

자모다정

YS생명과학



<성분 함량>

독시라민속신산염 25mg

<효능 효과> 불면증의 보조치료 및 진정

<용법 용량> 성인: 독시라민속신산염으로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여, 연령·증상에 따라 적절히 증감

<포장 단위> 10T

포린피아정

PHARVIS
KOREA



<성분 함량>

독시라민속신산염 25mg

<효능 효과> 불면증의 보조치료 및 진정

<용법 용량> 성인: 독시라민속신산염으로서 1일 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여, 연령·증상에 따라 적절히 증감

<포장 단위> 10T

제로민 연질캡슐

Hansol



<성분 함량>

디펜히드라민염산염 50mg

<효능 효과> 일시적 불면증의 완화

<용법 용량> 성인: 1일 1회 1캡슐을 취침 전 경구투여

<포장 단위> 10C

식물성 멜라토닌



남성 전립선, 좌제, 항문

요비신정

Kwangdong



<성분 함량>
 감초 125mg, 당귀 416.7mg, 대황 16.7mg, 마황 16.7mg, 목통 416.7mg, 생강 16.7mg, 연교 16.7mg, 용담 125 mg, 지황 416.7mg, 차전자 250mg 외 뒷면
<효능 효과> 방광카타르, 요도염, 신장병, 신증후군, 부종
<용법 용량> 보통 성인 1회 3~6정, 7~14세 1회 2~3정을 1일 2회 (아침, 저녁)복용 **<포장 단위>** 20T/360T

치클리스 연고

일양바이오팜(주)



<성분 함량>
 레티놀팔미테이트유(비타민A로서 1200I.U)1.2mg, 리도카인 30mg, 알란토인 10mg, 클로르헥시딘염산염 5mg, 토코페롤아세테이트 30mg, 페닐레프린염산염 2.5mg
<효능 효과> 치열, 치핵의 아픔 가려움, 부종(부기) 출혈의 일시적 완화 및 소독 **<용법 용량>** 만15세 이상 도포하는경우: 1일 3회 범위내 환부에 직접바름, 주입 하는경우: 1일 3회의 범위내에서 직장내에 삽입하여 주입, 직장내 적용할 경우 주입기를 튜브에 끼우고 직장내 삽입한다. **<포장 단위>** 30g

프라맥스 크림

HLB제약



<성분 함량>
 프라독신염산염 10mg
<효능 효과> 치질로 인한 다음 증상의 일시적 완화: 불쾌감, 작열감(화끈감),가려움
<용법 용량> 성인 : 1일 3회까지 환부(질환 부위)에 직접 바른다. 12세 이하의 소아: 의사와 상의 **<포장 단위>** 35g

프라맥스 에스좌제

HLB제약



<성분 함량>
 테트라히드로졸린염산염 1mg, 클로르헥시딘염산염 5mg
<효능 효과> 치열·치핵의 아픔·가려움·부종(부기)·출혈의 일시적 완화 및 소독
<용법 용량> 만 15세 이상 및 성인 1회 1개, 1일 3회의 범위 내에서 직장내 삽입
<포장 단위> 10좌제

네프신

Hansol



루비락스 과립

(주)아이월드제약



<성분 함량>
 차전자피가루 2168mg, 센나열매가루 496mg
<효능 효과> 변비, 식욕부진, 복부팽만, 장내이상발효, 치질
<용법 용량> 성인 1회 1~1.5포 1일 2회 아침, 저녁 공복시에 복용
<포장 단위> 30P

투아이블루 점안액

일양약품



<성분 함량>

아미노카프로산 10mg, 클로르페니라민말레산염 0.1mg, 나파졸린 염산염 0.02mg, 네오스티그민메틸황산염 0.02mg

<효능 효과> 눈의 피로, 결막충혈, 수영 후 눈의 불편감 또는 먼지 나 땀이 눈에 들어갔을 때, 자외선 및 기타광선에 의한 눈의 염증, 눈꺼풀의 짓무름, 하드콘택트렌즈를 착용 시 불편감 외 뺏면
<용법 용량> 1회 2~3방울, 1일 5~6회 점안 <포장 단위> 14mL/병

투아이케어 점안액

일양약품




<성분 함량>

아미노카프로산 20mg, 클로르페니라민말레산염 0.2mg, 글리시 리진산이칼륨 1mg, 설파메톡사졸 40mg

<효능 효과> 결막염(유행성결막염), 다래끼, 눈꺼풀의 짓무름, 눈 의 가려움 <용법 용량> 1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안 <포장 단위> 14mL/병

큐티스 점안액

한림제약주식회사



<성분 함량>

염화나트륨 5.5mg, 염화칼륨 1.5mg

<효능 효과> 눈의 피로, 눈물의 보조(눈의 건조), 하드 콘택트렌즈 및 소프트렌즈 착용시의 불편감, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)
<용법 용량> 1회 2~3방울 1일 5~6회 점안 <포장 단위> 15mL

맥스클리어 점안액

한림제약주식회사



<성분 함량>

1mL중 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 5mg

<효능 효과> 안구건조증이나 바람, 태양에 노출되어 생기는 화끈거 리는 증상, 자극감, 불편감을 일시적으로 완화, 안구 자극감 예방
<용법 용량> 필요시 증상이 있는 눈에 1~2방울씩 점안 하고 점안 후 남은 액과 용기는 버린다 <포장 단위> 0.5mL/관 X 30관

티어클린 점안액

한림제약주식회사



<성분 함량>

염화나트륨 5.5mg, 염화칼륨 1.5mg

<효능 효과> 소프트콘택트렌즈 또는 하드콘택트렌즈를 착용하고 있을 때의 불편감, 눈물 보충(눈의 건조), 눈의 피로, 눈의 흐림
<용법 용량> 침부문서 참조 1회 2~3방울, 1일 5~6회 점안 <포장 단위> 15mL

포티텐 점안액

한림제약주식회사



<성분 함량>

케토티펜푸마르산염 0.69mg

<효능 효과> 알러지성 결막염

<용법 용량> 성인: 1회 1적, 1일 2~4회, 또는 상태에 따라 적절히 점안, 유소아: 의사의 처방에 따름 <포장 단위> 15mL

하이눈 점안액



UNIMED
유니메드제약

<성분 함량>

글리시리진산이칼륨 1.0mg, 나파졸린염산염 0.03mg, 네오스티그민메틸황산염 0.02mg, 아미노카프로산 10mg, 콘드로이틴설페이트나트륨 1.0mg, 클로르페니라민말레산염 0.3mg 외 뒷면

<효능 효과> 눈의 피로, 결막 충혈, 수영 후 눈의 불편감 또는 먼지나 땀이 눈에 들어 갔을때 외 뒷면

<용법 용량> 1회 1~3방울 1일 3~6회 점안 <포장 단위> 15mL

네오탄 연고



<성분 함량>

히드로코르티손아세테이트 10mg, 네오마이신황산염 3.5mg, 센텔라정량추출물 10mg

<효능 효과> 네오마이신 감수성 세균에 의해 2차 감염된 코르티코이드 반응성 피부질환의 초기 치료: 피부염, 감염된 상처

<용법 용량> 1일 1~2회 적당량을 환부(질환 부위)에 바름

<포장 단위> 10g

지스톤 크림



<성분 함량>


베타메타손발레레이트 0.61mg, 겐타마이신황산염 1mg

<효능 효과> 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환: 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1~3회 환부(질환 부위)에 적당량 바름

<포장 단위> 30g

바른솔 크림



<성분 함량>


D-판테놀 50mg, 클로르헥시딘염산염 5mg

<효능 효과> 감염위험이 있는 다음과 같은 형태의 상처: 찰과상, 베인 상처, 찢긴 상처, 화상, 피부염 외 뒷면

<용법 용량> 상처 또는 감염된 피부부위를 청결히 한 후 필요에 따라 1일 1~수회 얇게 바름, 상처를 통상의 방법, 즉 바른 후 드레싱하거나 드레싱하지 않은 상태로 치료할 수 있음

<포장 단위> 20g

마스터치 크림



<성분 함량>

아시클로버 50mg, 히드로코르티손 10mg

<효능 효과> 재발성 구순포진(입술물집)의 초기 치료

<용법 용량> 성인: 환부(질환 부위)의 가장자리까지 충분히 적용할 수 있는 적당량으로 하여 1일 5회, 5일 동안 사용, 치료는 초기 증상 및 증후가 보이는 즉시 시작 <포장 단위> 5g

벌무덴 리니먼트



<성분 함량>

크로타미론 5g, l-멘톨 3.5g, dl-캄파 3.5g, 디펜히드라민 1g, 디부카인염산염 0.5g, 에녹솔론 0.1g

<효능 효과> 습진, 피부염, 땀띠, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레 물린데, 두드러기

<용법 용량> 1일 수회(여러 차례)환부(질환 부위)에 적당량 바름

<포장 단위> 40mL

카네손 크림



<성분 함량>

히드로코르티손 10mg, 클로트리마졸 10mg

<효능 효과> 염증, 가려움 및 습진 등의 임상증상을 수반하는 피부 진균(곰팡이)증: 1) 백선 2) 피부 칸디다증 3) 어루러기

<용법 용량> 1일 1~2회(아침 또는 아침, 저녁) 적당량을 환부(질환 부위)에 바름, 급성증상이 없어진 다음에는 코르티코스테로이드가 없는 약물을 사용 외 뒷면 <포장 단위> 20g

로알코티 크림



<성분 함량>

로알젤리 20mg

<효능 효과> 알레르기 피부염, 화장독, 땀띠, 가려움, 접촉 피부염(기저귀 발진), 면도 자극, 피부 거칠어짐 방지

<용법 용량> 1일 수회(여러 차례) 적당량을 환부(질환 부위)에 바르거나 가제 등에 묻혀서 붙임 <포장 단위> 30g

아로마솔 크림



<성분 함량>

로알젤리 20mg, 히드로코르티손 5mg

<효능 효과> 알레르기 피부염, 화장독, 땀띠, 가려움, 접촉 피부염(기저귀 발진), 면도 자극, 피부 거칠어짐 방지

<용법 용량> 1일 수회(여러 차례) 적당량을 환부(질환 부위)에 바르거나 가제 등에 묻혀서 붙임 <포장 단위> 30g

아시클로버 크림



<성분 함량>

아시클로버 50mg

<효능 효과> 단순포진(물집), 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순(입술)포진(물집) 포함)

<용법 용량> 1. 이 약은 4시간 간격으로 1일 5회 환부에 바름 2. 치료는 5일간 계속하며, 5일간 사용 후 치료되지 않을 경우 5일간 더 사용 할 수 있음 <포장 단위> 10g

제놀파워겔




<성분 함량>

피록시캅 5mg

<효능 효과> 다음 질환 및 증상의 진통·소염: 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건염(힘줄염), 건(힘줄)주위염 외 뒷면

<용법 용량> 성인 1회 1g(약 3cm), 1일 3~4회 환부(질환 부위)에 바르고 잘 스며들도록 문지름 <포장 단위> 60g

판테올 크림



<성분 함량>

D-판테놀 50mg

<효능 효과> 상처, 화상, 찢긴 상처(수유기 중의 유두균열(갈라짐) 등), 욕창, 급·만성 피부염, 습진, 피부 궤양, 기저기 발진 외 뒷면

<용법 용량> 1) 상처를 청결히 한 후 환부에 1일 1~수회 바름 2) 수유기 중의 유두균열에는 매 수유 직후 유두에 바름 3) 기저귀 발진에는 기저귀 교체 후 바름 <포장 단위> 30g

리렌스



<성분 함량>

구아아줄렌 0.33mg

<효능 효과> 습진, 열상(화상), 그 외의 질환에 따른 미란(긁무름) 및 궤양

<용법 용량> 1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 도포 <포장 단위> 30g

노바론 크림

 **일양약품**



<성분 함량>

테르비나핀염산염 10mg

<효능 효과> 피부사상균에 의한 피부 진균 감염증: 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선(증))), 체부백선 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1~2회 환부(질환 부위)에 바름 외 뒷면

<포장 단위> 30g

세레톤 크림

 **일양약품**



<성분 함량>

베타메타손발레레이트 0.61mg, 겐타마이신황산염 1.0mg

<효능 효과> 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환: 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염 외 뒷면

<용법 용량> 1일 1~3회 환부(질환 부위)에 적당량 바름

<포장 단위> 35g

아시클로버 크림

 **일양약품**



<성분 함량>

아시클로버 50mg

<효능 효과> 단순포진(물집), 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순(입술)포진(물집) 포함)

<용법 용량> 1. 이 약은 4시간 간격으로 1일 5회 환부에 바름 2. 치료는 5일간 계속하며, 5일간 사용 후 치료되지 않을 경우 5일간 더 사용 할 수 있음 <포장 단위> 5g

엘린플러스 크림

 **태극제약(주)**



<성분 함량>

히드로코르티손 10mg, 클로트리마졸 10mg

<효능 효과> 염증, 가려움 및 습진 등의 임상증상을 수반하는 피부 진균(곰팡이)증: 1) 백선 2) 피부 칸디다증 3) 어루러기

<용법 용량> 1일 1~2회(아침 또는 아침, 저녁) 적당량을 환부(질환 부위)에 바름, 급성증상이 없어진 다음에는 코르티코스테로이드가 없는 약물을 사용 외 뒷면 <포장 단위> 20g

구충제 및 기타

알벤다졸정

일양바이오팜(주)



<성분 함량>

알벤다졸 400mg

<효능 효과> 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

<용법 용량> 성인 및 24개월 이상 소아, 요충 : 1일 1회 400mg 복용 후 7일 뒤 한번 더 복용 / 회충, 십이지장충, 편충: 단회 복용 / 분선충의 다른 기생충과 혼합 감염 시 : 1일 1회 400mg씩 3일간 복용

<포장 단위> 2T

이바내정

정우신약(주)



<성분 함량>

리보플라빈부티레이트 10mg, 피리독신염산염97%과립 51.55mg, 아스코르브산97%과립 25.77mg, 니코틴산아미드 15mg 외 뒷면

<효능 효과> 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 외 뒷면

<용법 용량> 만 8세 이상 어린이 및 성인: 1회 2정 1일 1회 복용

<포장 단위> 20T

염산메클리진정

PHARVIS KOREA



<성분 함량>

메클리진염산염수화물 25mg

<효능 효과> 멀미에 의한 구역, 구토, 어지러움, 미로염, 메니에르증후군, 방사선 숙취에 따르는 구역, 구토, 어지러움

<용법 용량> 성인 : 메클리진염산염 수화물로서 1일 25~50mg을 승차 1시간 전 경구투여 외 뒷면

<포장 단위> 2T

근골환

Hansol



<성분 함량>

숙지황 150mg, 우슬 100mg, 작약 100mg, 황백 100mg, 두충 100mg, 보골지 100mg, 창출 100mg, 황기 100mg, 오미자 100mg, 토사자 100mg, 골쇄보 100mg 외 뒷면

<효능 효과> 신경통, 관절통, 근육통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 2회 식전 또는 식간 복용

<포장 단위> 120P

소체환

Hansol



<성분 함량>

견우자 40mg, 향부자 20mg, 오령지 20mg

<효능 효과> 식체(체함), 소화불량, 위부(상복부)팽만감, 위통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에

따뜻한 물 또는 생강차로 복용 **<포장 단위>** 120P

생위단

Hansol



<성분 함량>

황련 432mg, 내복자 432mg, 삼릉 288mg, 아출 288mg, 도인 288mg, 신곡 288mg, 익지 144mg, 개자 432mg 외 뒷면

<효능 효과> 식체(위체), 소화불량

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에

복용 **<포장 단위>** 240P

장편환

Hansol



<성분 함량> 당귀 50mg, 작약 50mg, 천궁 50mg, 창출 50mg, 인삼 50mg, 복령 62.5mg, 육계 50mg, 속미 50mg, 이 상수침건조엑스 62mg

<효능 효과> 급만성장염, 설사, 궤양성 대장염

<용법 용량> 보통 성인 1회 20환, 11세~14세 13환, 8~10세

10환을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 **<포장 단위>** 45P X 2

청상기가환

Hansol




<성분 함량> 숙지황 187.5mg, 산약 93.5mg, 산수유 93.5mg, 목단피 70mg, 복령 70mg, 오미자 70mg, 맥문동 70mg, 천문동 70mg, 반하 70mg, 택사 70mg, 감초 23.25mg 외 뒷면

<효능 효과> 기침, 천식

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포(2.4g)를 1일 3회 식후에 따뜻한 물과 함께 복용 **<포장 단위>** 45P X 2

감바로 과립

Hansol



<성분 함량>


갈근 746.7mg, 마황 373.3mg, 대추 373.3mg, 육계 280mg, 작약 280mg, 감초 186.7mg, 건강 93.3mg 외 뒷면

<효능 효과> 감기 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

<용법 용량> 15세 이상의 성인 1회 1포, 1일 3회 식후 30분에 복용, 만 2세 미만의 영·유아를 대상으로 하는 용법은 인정하지 아니한다. 꼭 필요한 경우 의사 진료를 받는다 **<포장 단위>** 240P

연통환

Hansol



<성분 함량>

창출 750mg, 석고 750mg, 생지황 750mg, 강활 500mg, 방풍 500mg, 당귀 500mg, 만형자 500mg, 천궁 500mg, 세신 500mg, 황기 500mg, 지각 500mg, 인삼 500mg 외 뒷면

<효능 효과> 중풍의 조리약

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 90P

갈근탕 엑스과립

Hansol



<성분 함량>

계지 1g, 마황 1.33g, 건강 0.33g, 대추 1.33g, 감초 0.67g, 작약 1g, 갈근 2.67g

<효능 효과> 감기, 코감기, 두통, 어깨결림, 근육통, 손과 어깨통증

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

기가천 과립

Hansol



<성분 함량>

마황 1g, 백작약 1000mg, 건강 1g, 감초 1g, 오미자 1g, 계지 1g, 세신 1g

<효능 효과> 기관지염, 기관지천식, 콧물, 묽은 가래를 수반하는 기침, 비염

<용법 용량> 보통 성인 1일 3회, 1회 1포를 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

넥스콜환

Hansol



<성분 함량>

은교산건조엑스 500mg

<효능 효과> 김기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포, 7~14세 1/2포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

맥기천 과립

Hansol



<성분 함량>

인삼 0.67g, 대추 1g, 감초 0.67g, 맥문동 3.33g, 갱미 3.33g, 반하 1.67g

<효능 효과> 가래가 끓어지지 않는 기침, 기관지염, 기관지천식

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

미네르바 과립

Hansol



<성분 함량>

차전자피 2168mg, 센나열매 496mg

<효능 효과> 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

<용법 용량> 성인 1회 1포 1일 2회 아침, 저녁 공복시에 복용, 다만 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증감

<포장 단위> 30P X 8

브루나 과립

Hansol



<성분 함량>

옥수수전분, 유당수화물

<효능 효과> 타박상으로 인한 부은 것 및 통증

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 60P X 4

상위정

Hansol



<성분 함량>

황련 110mg, 건강 277mg, 인삼 334mg, 대추 334mg, 감초 334mg, 반하 567mg, 황금 334mg

<효능 효과> 명치가 답답하고, 때때로 구역, 구토가 있고, 식욕부진(식욕감퇴)하며, 배에서 소리가 나고, 묽은 변 또는 설사 경향이 있는 사람의 다음 증상: 급만성 위장카타르, 발효설사 외 뒷면

<용법 용량> 보통 성인 1회 3정 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 60P X 4

속치환

Hansol



<성분 함량>

백출 125mg, 진피 125mg, 황련 125mg, 신곡 125mg, 지실 62.4mg, 대황 125mg, 황금 250mg

<효능 효과> 육체(肉滯)로 인한 위부불쾌감

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 60P X 4

위평원 과립

Hansol



<성분 함량>

황련 0.33g, 건강 0.83g, 대추 1g, 인삼 1g, 감초 1g, 반하 1.67g, 황금 1g

<효능 효과> 명치가 답답하고, 때때로 구역, 구토가 있고, 식욕부진(식욕감퇴)하며, 배에서 소리가 나고, 묽은 변 또는 설사 경향이 있는 사람의 다음 증상: 급만성 위장카타르, 발효설사 외 뒷면

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 60P X 4

은교산 엑스과립

Hansol



<성분 함량>

옥수수전분, 유당수화물

<효능 효과> 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포, 7~14세 1/2포, 5~6세 1/4포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 5P X 40

쾌비정

Hansol



<성분 함량>

지모 33.32mg, 창출 33.32mg, 시호 33.32mg, 승마 33.32mg, 비파엽 33.32mg, 치자 33.32mg, 건강 333.32mg, 석고 333.32mg, 대추 500mg, 감초 500mg, 맥문동 33.32mg 외 뒷면

<효능 효과> 부비동염, 비카타르, 코막힘, 취비증

<용법 용량> 보통 성인 1회 1.5~3정, 15~8세 1~1.5정을 1일 2회 아침, 저녁 공복에 복용 <포장 단위> 60P X 4

패감산

Hansol



<성분 함량>

천호 1.25g, 독활 1.25g, 지각 1.25g, 시호 1.25g, 천궁 1.25g, 인삼 1.25g, 감초 1.25g, 강활 1.25g, 길경 1.25g, 복령 1.25g

<효능 효과> 감기로 인한 몸살 발열, 두통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

해농정

Hansol



<성분 함량>

배농산급탕수침건조엑스 400mg, 건강165mg, 대추 500mg, 감초 500mg, 작약 500mg, 길경 670mg, 지실 500mg

<효능 효과> 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농성 질환

<용법 용량> 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

행기탕 과립

Hansol



<성분 함량>

작약 0.67g, 계지 0.67g, 천궁 1g, 마황 1g, 건강 0.33g, 대추 1g, 감초 0.67g, 신이 1g, 갈근 1.33g

<효능 효과> 코막힘, 부비동염, 만성비염

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

황간정

Hansol



<성분 함량>

황련 220mg, 치자 330mg, 황백 330mg, 황금 330mg

<효능 효과> 비교적 건강하거나 역상기(기혈이 머리쪽으로 치밀어 오름)가 있어 안색이 붉으며 불안한 사람의 다음 증상: 코피, 불면증, 신경과민, 위염, 숙취, 어지러움, 두근거림

<용법 용량> 보통 성인 1회 3정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

금왕심단

Hansol



<성분 함량>

생지황 500mg, 황련 250mg, 당귀 125mg, 오미자 125mg, 천문동 125mg, 백자인125mg, 산조인 125mg, 맥문동 125mg 외 뒷면

<효능 효과> 불면, 불안, 초조, 목마름, 두근거림, 숨참, 신경쇠약, 건망, 번열(가슴이 답답하고 열이 나는 증상 등)

<용법 용량> 보통 성인 1포를 1일 1회 식간에 복용

<포장 단위> 30P X 2

옥미인단

Hansol



<성분 함량>

향부자 660mg, 작약 336mg, 현호색 132mg, 시라자 66mg, 감초 132mg, 숙지황 336mg, 백출 264mg, 육계 132mg, 목단피 132mg, 천궁 336mg, 사인 198mg, 아교 66mg 외 뒷면

<효능 효과> 월경불순, 자궁허냉, 대하, 적탁, 백탁, 월경시 요통, 복통, 두통, 어지러움, 손발의 차가움, 소화불량, 혈액부족 외 뒷면

<용법 용량> 보통 성인 1회 50~60환을 1일 2회 식전 또는 식간에 물 또는 따뜻한 물로 복용 <포장 단위> 60P X 2

소체환

(주)아이월드제약



<성분 함량>

견우자 400mg, 향부자 200mg, 오령지 200mg

<효능 효과> 식체, 소화불량, 위부팽만감, 위통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용 <포장 단위> 120P

당귀수산 엑스과립

(주)아이월드제약



<성분 함량>

당귀 1.88g, 작약 1.25g, 오약 1.25g, 향부자 1.25g, 소목 1.25g, 홍화 1g 외 뒷면

<효능 효과> 타박상으로 인한 부은 것 및 통증

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 60P X 4

태평환

(주)아이월드제약



<성분 함량>

생지황 500mg, 인삼, 현삼, 단삼, 원지, 길경, 복령, 오미자, 당귀, 천문동, 맥문동, 백자인, 산조인, 황련

<효능 효과> 불면, 불안, 초조, 목마름, 두근거림, 숨참, 신경쇠약, 건망, 번열

<용법 용량> 보통 성인 1포를 1일 1회 식간에 복용

<포장 단위> 90P

용사환 (용담사간탕)

(주)아이월드제약



<성분 함량>

치자 0.5g, 택사 1.0g, 목통 1.67g, 감초 0.5g, 차전자 1.0g, 지황 1.67g, 황금 1.0g, 당귀 1.67g, 용담 0.5g

<효능 효과> 비교적 체력이 있고, 하복부 근육이 긴장하는 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 배뇨통, 잔뇨감, 혼탁뇨, 대하

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 90P

반하후박탕 엑스과립

(주)아이월드제약



<성분 함량>

반하 2.0g, 후박 1.0g, 복령 1.67g, 자소엽 0.67g, 생강 1.33g

<효능 효과> 기분이 우울하고, 인후(목구멍), 식도부에 이물감이 있고 때로는 숨참, 어지러움, 구역 등을 동반하는 다음 증상: 불안신경증, 신경성위염, 입덧, 기침, 쉼소리

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 120P

패독산 엑스과립

(주)아이월드제약



<성분 함량>

자소엽 2.0g, 길경 2.0g, 창출 2.0g, 지각 2.0g, 천궁 2.0g, 복령 1.0g, 시호 2.0g, 형개 1.0g, 전호 2.0g, 강활 2.0g 외 뒷면

<효능 효과> 감기로 인한 몸살, 발열, 두통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식후에 복용

<포장 단위> 120P

치위환

Hansol



<성분 함량> 당귀 1,250mg, 작약 1,250mg, 황련 1,250mg, 목단피 1,250mg, 박하 1,250mg, 감초 1,250mg, 천궁 1,250mg, 생지황 1,250mg, 치자 1,250mg, 형개 1,250mg 외 뒷면

<효능 효과> 위열에 의한 치통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용
<포장 단위> 30P X 2

은치환

(주)아이월드제약



(주)아이월드제약



<성분 함량>

당귀 1,250mg, 작약 1,250mg, 황련 1,250mg, 치자 1,250mg, 감초 1,250mg, 목단피 1,250mg, 박하 1,250mg 외 뒷면

<효능 효과> 위열에 의한 치통

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용
<포장 단위> 5P X 40

보화 경옥고

원광대학교 설립
원광제약주식회사



<성분 함량>

인삼 6.2 g, 꿀 41.5 g, 생지황즙 39.9g, 복령12.4 g

<효능 효과> 다음 경우의 자양강장 : 병중·병후, 허약 체질, 육체피로, 권태, 갱년기 장애

<용법 용량> 1일 2회 식전 또는 식간에 복용, 1회 성인 20g, 7~14 세 13.3g(성인 용량의 2/3), 4~6 세 10g(성인 용량의 1/2), 2~3세 6.7 g(성인 용량의 1/3), 1세 이하 5g(성인 용량의 1/4)을 아침, 저녁 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 30P/60P

원광 우황청심원액 (사향대체물질엘-무스콘함유)

원광대학교 설립
원광제약주식회사



<성분 함량>

산약 282mg, 맥문동 60mg, 황금 60mg, 당귀 60mg, 방풍 60mg, 백출 60mg, 시호 50mg, 길경 50mg, 행인 50mg 외 뒷면

<효능 효과> 뇌졸중(전신불수, 수족불수, 언어장애, 혼수, 정신혼미, 안면신경마비), 고혈압, 두근거림, 정신불안 외 뒷면

<용법 용량> 보통 성인 1회 1병, 8~15세 2/3병, 5~7세 1/2병, 2~4 세 1/3병, 1세 이하 1/4병 1일 1~2회 복용 <포장 단위> 50mL

원광 우황청심원현탁액(사향)

원광대학교 설립
원광제약주식회사



<성분 함량>

사향 5mg, 우황 14mg, 산약 282mg, 인삼 97mg, 포황 100mg, 신곡 100mg, 대두황권 70mg, 아교 70mg, 천궁 50mg 외 뒷면

<효능 효과> 뇌졸중(전신불수, 수족불수, 언어장애, 혼수, 정신혼미, 안면신경마비), 고혈압, 두근거림, 정신불안 외 뒷면

<용법 용량> 보통 성인 1일보통 성인 1회 1병, 8~15세 2/3병, 5~7세 1/2병, 2~4세 1/3병, 1세 이하 1/4병 1일 1~2회 복용

<포장 단위> 50mL



<성분 함량>

글루타티온 100mg

<효능 효과> 약물중독

<용법 용량> 성인 : 글루타티온으로서 1회 50-100mg, 1일 1-3회 복용 외 뒷면

<포장 단위> 90T



<성분 함량>

당귀 0.4g, 작약 0.4g, 천궁 0.4g, 치자 0.4g, 연교 0.4g, 박하 0.4g, 생강 0.4g, 형개 0.4g, 방풍 0.4g 외 뒷면

<효능 효과> 고혈압의 동반증상, 비만, 부기, 변비

<용법 용량> 보통 성인 1회 1포를 1일 3회 식전 또는 식간에 복용

<포장 단위> 90P