

Análise Combinatória, Probabilidades e Aplicações - Lista 03

Cleibson Aparecido de Almeida

9 de fevereiro de 2017

Exercício 01 - Para cada um dos experimentos abaixo, descreva o espaço amostral Ω adequado e apresente o número de elementos, quando for o caso.

a - Um dado é lançado três vezes e a sequência de números obtida é anotada.

$$\Omega = \{A \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} : |A| = 3\}$$

Considerando que a ordem importa, pois $[1, 2, 3] \neq [2, 1, 3]$, temos $A_6^3 = 120$ elementos.

b - Numa determinada cidade, no mês de março, conta-se o número de problemas nas tubulações de água do bairro x.

$$\Omega = \{B \subseteq \{0, 1, 2, 3, \dots, n\} : |B| = 1\}$$

Neste caso, teremos $n + 1$ elementos.

c - Um fichário com 13 nomes contém três nomes de mulheres. Seleciona-se uma ficha, até o último nome de mulher ser selecionado, e anota-se o número de fichas selecionadas.

$$\Omega = \{C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 13\} : 3 \leq |C| \leq 13\}$$

Considerando que as fichas são selecionadas sem reposição, temos ???

d - De um grupo de seis pessoas A, B, C, D, E e F, sorteiam-se duas, uma após a outra, sem reposição, e anota-se a configuração formada.

$$\Omega = \{D \subseteq \{A, B, C, D, E, F\} : |D| = 2\}$$

Considerando que o sorteio é sem reposição, o número de elementos será $C_6^2 = 10$ elementos.

e - Como ficaria o espaço amostral do item c se as retiradas fossem com reposição.

???

f - De um pacote contendo 20 jujubas, observa-se quantas tem a cor vermelha.

$$\Omega = \{F \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 20\} : 1 \leq |F| \leq 20\}$$

O número de elementos será 20.

g - Registram-se o número de dias chuvosos e a precipitação total (em centímetros) durante uma semana em uma localidade.

Seja C (dias chuvosos) e P (precipitação em mm), temos o seguinte espaço amostral.

$$\Omega = \{C \in \mathbb{Z}_+, P \in \mathbb{R} \mid C = [0, 7], P = [0, 200]\}$$

h - Um dado é lançado em um alvo circular de raio unitário e observa-se o ponto acertado.

Sendo A (área do círculo $= \pi \times r^2$) e H (ponto acertado) nas posições x (horizontal) e y (vertical), temos:

$$\Omega = \{H \in \mathbb{R}; H \subseteq A | A = \pi \times r^2, H = [x, y], x = [-1, 1], y = [-1, 1]\}$$

Exercício 02 - Em cada um dos casos, verifique se \mathcal{F} é σ -álgebra de subconjuntos de Ω .

a

$$\Omega = \{a, b, c\} \text{ e } \mathcal{F} = \{\{a, b\}, \{c\}, \emptyset\}$$

Não é σ -álgebra, pois $\{a, b, c\} = \Omega$ não pertence a \mathcal{F} .

b

$$\Omega = \{1, 2, 3\} \text{ e } \mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

É σ -álgebra, pois todas as condições abaixo são satisfeitas.

- $\Omega \in \mathcal{F}$;
- Se $A \in \mathcal{F}$, então $A^c \in \mathcal{F}$;
- $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

c

$$\Omega = \mathbb{N} \text{ e } \mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ ou } A^c \text{ é finito}\}$$

É σ -álgebra, pois todas as condições abaixo são satisfeitas.

- $\Omega \in \mathcal{F}$;
- Se $A \in \mathcal{F}$, então $A^c \in \mathcal{F}$;
- $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

d

$\Omega = \mathbb{R}$ e $\mathcal{F} = \mathcal{F}_\infty \cup \mathcal{F}_\epsilon$, em que \mathcal{F}_∞ e \mathcal{F}_ϵ são σ -álgebra de subconjuntos de \mathbb{R}

Não é σ -álgebra, pois $\{a, b, c\} = \Omega$ não pertence a \mathcal{F} .

Exercício 08 - Considere um experimento em que um elemento do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$ é selecionado ao acaso. Neste cenário, os eventos $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{1, 4\}$ são independentes?

Sejam as seguintes probabilidades:

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{4}$$

$$P(B \cap C) = \frac{1}{4}$$

- Verificando se os eventos A e B são independentes se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

$$\text{Então: } P(A \cap B) = \frac{1}{4} \iff P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Portanto A e B são independentes.

- Verificando se os eventos A e C são independentes se $P(A \cap C) = P(A)P(C)$.

$$\text{Então: } P(A \cap C) = \frac{1}{4} \iff P(A)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Portanto A e C são independentes.

- Verificando se os eventos B e C são independentes se $P(B \cap C) = P(B)P(C)$.


Então: $P(B \cap C) = \frac{1}{4} \iff P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Portanto B e C são independentes.

No caso dos três eventos, temos $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$ (devido ao elemento 1 pertencer aos três eventos). Porém, $P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. Portanto, A, B e C não são independentes entre si porque $P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C)$.

Exercício 11 - Alguns amigos estão em uma lanchonete. Sobre a mesa há duas travessas. Em uma delas há 3 pastéis e 5 coxinhas. Na outra há 2 coxinhas e 4 pastéis. Se ao acaso alguém escolher uma destas travessas e também ao acaso pegar um dos salgados, qual a probabilidade de se ter pegado um pastel?

Seja o modelo apresentado na figura a seguir:



Então:

$$P(P) = P(P/T1) + P(P/T2) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{4}{6}\right) = \frac{25}{48}$$

Exercício 12 - Quando $P(A) = 1/2$, $P(B) = 3/4$ e $P(A \cup B) = 1$, quanto vale?

a) $P(A \cap B)$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A)P(B) - P(A \cap B) \\ P(A \cap B) &= P(A)P(B) - P(A \cup B) \\ P(A \cap B) &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} - 1 \\ P(A \cap B) &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

b) $P(A^c \cap B^c)$

$$\begin{aligned} \text{Seja } P(A^c \cap B^c) &= P[(A \cup B)^c] \\ P[A \cup B] &= 1 - P[(A \cup B)^c] \\ P[(A \cup B)^c] &= 1 - P[A \cup B] \\ P[(A \cup B)^c] &= 1 - 1 = \emptyset \end{aligned}$$

c) $P(A \cap B^c)$

Seja $P(A \cap B) = 1/4$

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 1/2 - 1/4 = 1/4$$

d) $P(A^c \cap B)$

Seja $P(A \cap B) = 1/4$

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 3/4 - 1/4 = 1/2$$

e) $P(A|B)$ e $P(B|A)$

Seja $P(A \cap B) = 1/4 = P(B \cap A)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/4}{3/4} = 1/3$$

e

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1/4}{1/2} = 1/2$$