

```
#libraries  
library(here)  
library(tibble)  
library(ggplot2)
```

Num inquérito sobre óculos de sol foram colocadas várias questões aos inquiridos. Para além de características sociodemográficas (sexo, idade e nível de educação), perguntou-se o tipo de óculos de sol que possuíam, quando tinham sido adquiridos, onde tinham sido adquiridos, quanto tinham custado e se eram da marca SoleMio(SM/RB). Para este TPC, irão apenas analisar duas questões: 1. O indicador “Importância do Preço na compra de óculos de sol” – variável Price; e, 2. a questão “are_RB”, que indica se os óculos são ou não da marca SoleMio Para além destas questões, ainda foram colocadas outras que originaram a construção de um conjunto de indicadores, cada um numa escala contínua de 0 a 10 – fatores que influenciam a compra de óculos de sol.

Os “Fatores que influenciam a compra de óculos de sol” são variáveis que assumem valores reais no intervalo 0-10, onde 0 corresponde a “nada importante” e 10 corresponde a “extremamente importante”.

```
df<- readRDS(here('tpc7', 'Estudo_Oculos_Sol.rds'))  
tibble(df)
```

```
## # A tibble: 640 x 16
##   nquest sex      age educ      type when_~1 where~2 cost  are_RB
##   <int> <fct> <int> <fct>    <fct> <fct>    <fct> <fct> <fct> <fct>
##   int> <dbl>
## 1      1 Male      38 Tertiary Spor~ 2+ yea~ Optica~ 200E~ No
##      1 7.51
## 2      2 Male      37 Tertiary Clas~ 2+ yea~ Optica~ 200E~ Yes
##      2 5.80
## 3      3 Male      33 Tertiary Clas~ Last y~ Optica~ 100E~ No
##      1 4.76
## 4      4 Female    25 Profiss~ Spor~ Last y~ Optica~ At l~ No
##      3 0.91
## 5      5 Female    34 Seconda~ Mode~ This y~ Optica~ 100E~ No
##      3 4.66
## 6     12 Female    43 Profiss~ Clas~ 2+ yea~ Optica~ 100E~ No
##      1 4.85
## 7     13 Male      20 Seconda~ Spor~ Last y~ Sports~ Less~ No
##      1 5.80
## 8     14 Male      22 Tertiary Clas~ This y~ Optica~ 200E~ No
##      3 8
## 9     15 Male      23 Profiss~ Clas~ Last y~ Street~ Less~ No
##      1 6.9
## 10    16 Female    24 Tertiary Mode~ This y~ Optica~ 200E~ No
##      2 5.70
## # ... with 630 more rows, 5 more variables: Quality <dbl>, Ergonomy <
##   dbl>,
## #   Price <dbl>, Style <dbl>, Will_buy_RB <fct>, and abbreviated
##   variable names
## #   1: when_bought, 2: where_bought
```

1

Será que a importância concedida ao preço está, em termos médios, acima do ponto intermédio da escala (i.e. 5)?

Escrever as hipóteses

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad (1)$$

$$H_a : \mu > \mu_0 \quad (2)$$

, sendo $\mu_0 = 5$.

Escolher o teste adequado

Como n é suficientemente grande ($n = 640$) e o desvio padrão σ é desconhecida, o teste adequado será:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \overset{!}{\sim} n(0, 1) \quad (3)$$

$$\bar{X} \overset{!}{\sim} n(\mu_0, s/\sqrt{n}) \quad (4)$$

, sendo \bar{X} a média amostral, S o desvio padrão amostral, e n o tamanho da amostra.

Definir a região crítica e não crítica

Este teste designa-se por teste unilateral à direita, conforme a Eq. 1, e o nível de significância será $\alpha = 0.05$, conforme o enunciado. Assim, a região crítica RC e a região de aceitação RA serão:

$$RC = \{\bar{X} : \bar{X} \geq \bar{x}_c\} =]\bar{x}_c; +\infty[\quad (5)$$

$$RA = \{\bar{X} : \bar{X} < \bar{x}_c\} = [-\infty; \bar{x}_c] \quad (6)$$

, sendo $\bar{x}_c = \phi^{-1}(\alpha)$.

```
x<- qnorm(1-0.05, mean = 5, sd = sd(df$Price)/sqrt(nrow(df)))
x<
```

```
## [1] 5.070061
```

$$\bar{x}_c = \phi^{-1}(1 - \alpha) = \phi^{-1}(1 - 0.05) = 5.07 \quad (7)$$

$$\therefore RA = [0; 5.07] \wedge RC =]5.07; +\infty[\quad (8)$$

A regra de decisão será:

1. Se $\bar{X} > 5.07$, rejeitar H_0 (A importância concedida ao preço está, em termos médios, acima do ponto intermédio da escala);

2. Se $\bar{X} \leq 5.07$, não rejeitar H_0 (A importância concedida ao preço não está, em termos médios, acima do ponto intermédio da escala).

Calcular e verificar se o valor do teste(t) está na região crítica ou não, e tomar a decisão

```
t.test(df$Price, mu = 5, alternative = 'greater', conf.level = 0.95)
```

```
##  
## One Sample t-test  
##  
## data: df$Price  
## t = 38.13, df = 639, p-value < 2.2e-16  
## alternative hypothesis: true mean is greater than 5  
## 95 percent confidence interval:  
## 6.553947 Inf  
## sample estimates:  
## mean of x  
## 6.62411
```

Como $\bar{X} = 6.624 > 5.07$, rejeitamos H_0 , ou seja, a importância concedida ao preço não está em termos médios abaixo do ponto intermédio da escala.

2

Será que homens e mulheres diferem, em termos médios, na importância concedida ao preço?

Escrever as hipóteses

$$H_0 : \mu_H = \mu_M \equiv \mu_H - \mu_M = 0 \quad (9)$$

$$H_a : \mu_H \neq \mu_M \equiv \mu_H - \mu_M \neq 0 \quad (10)$$

, sendo μ_H a média da importância concedida ao preço pelos homens e μ_M a média da importância concedida ao preço pelas mulheres.

Escolher o teste adequado

Como n_H e n_M são suficientemente grandes ($n_H = 308$ e $n_M = 332$) e o desvio padrão σ é desconhecido, o teste adequado será:

$$T = \frac{(\bar{X}_H - \bar{X}_M) - (\mu_H - \mu_M)_0}{\sqrt{\frac{S_H^2}{n_H} + \frac{S_M^2}{n_M}}} \overset{\text{d}}{\sim} n(0, 1) \quad (11)$$

$$(\bar{X}_H - \bar{X}_M) \overset{\text{d}}{\sim} n\left(\mu_H - \mu_M, \sqrt{\frac{S_H^2}{n_H} + \frac{S_M^2}{n_M}}\right) \quad (12)$$

Definir a região crítica e não crítica;

Este teste designa-se por teste bilateral, e as regiões crítica e de aceitação são:

$$RC = [\bar{x}_c; +\infty] \cup [-\infty - \bar{x}_c] \quad (13)$$

$$RA =]-\bar{x}_c; \bar{x}_c[\quad (14)$$

, sendo $\bar{x}_c = \phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ o ponto crítico.

```
h <- df[df$sex == 'Male', ]$Price
m <- df[df$sex == 'Female', ]$Price
n <- nrow(df)
xc2 <- qnorm(1-0.025, mean = mean(h) - mean(m), sd= sqrt(((sd(h)^2) / n)
+ ((sd(m)^2) / n)))
xc2
```

```
## [1] 0.286247
```

$$\bar{x}_c = \phi^{-1}(1 - \alpha/2) = \phi^{-1}(0.05/2) = 0.286 \quad (15)$$

$$\therefore RA =]-0.286; 0.286[\wedge RC = [0.286; +\infty] \cup [+ \infty; -0.286] \quad (16)$$

A regra de decisão será:

1. Se $\bar{X}_M - \bar{X}_H \in RC$, rejeitar H_0 (A importância concedida ao preço pelos homens e mulheres difere, em termos médios);
2. Se $\bar{X}_M - \bar{X}_H \notin RC$, não rejeitar H_0 (A importância concedida ao preço pelos homens e mulheres não difere, em termos médios).

Calcular e verificar se o valor do teste(t) está na região crítica ou não, e tomar a decisão

```
t.test(df$Price ~ df$sex, mu = 0, alternative = 'two.sided', conf.level = 0.95)
```

```
##  
##  Welch Two Sample t-test  
##  
## data:  df$Price by df$sex  
## t = -1.9884, df = 638, p-value = 0.0472  
## alternative hypothesis: true difference in means between group Female  
## and group Male is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## -0.335158827 -0.002091658  
## sample estimates:  
## mean in group Female    mean in group Male  
##           6.542959           6.711584
```

Como $\bar{X}_M - \bar{X}_H = -0.169 \notin RC$, não rejeitamos H_0 , ou seja, a importância concedida ao preço pelos homens e mulheres não diferem em termos médios.