

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância

Superintendência de Vigilância em Saúde

Coordenação do Programa de Imunizações

COMUNICADO CPI/SVS nº 05/2026

UTILIZAÇÃO DA VACINA HPV PARA MULHERES COM NIC 2, NIC 3 E ADENOCARCINOMA IN SITU - AIS

Considerando Nota técnica Nº 32/2026 - CGICI/DPNI/SVSA/MS que trata de inclusão de mulheres diagnosticadas com Neoplasia Intraepitelial Cervical de alto grau (NIC 2, NIC 3 e Adenocarcinoma in situ – AIS), submetidas a procedimento excisional do colo do útero(LEEP/conização), como grupo prioritário para vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

1. INDICAÇÕES

Mulheres diagnosticadas com Neoplasia Intraepitelial Cervical de alto grau (NIC 2, NIC 3 e Adenocarcinoma in situ – AIS), submetidas a procedimento excisional do colo do útero(LEEP/conização), **independentemente da idade, mesmo que acima de 45 anos de idade.**

2. ESQUEMA VACINAL

Esquema de 03 doses (0, 2 e 6 meses).

3. REGISTRO

Registro no PEP Vitacare - UAPs:

- Selecionar OUTRAS VACINAS - HPV
- Selecionar Administração
- Selecionar **Estratégia Especial**
- Preencher Data, Validade, Laboratório, Via de Administração, Local da aplicação e Data de aplicação.
- Incluir em “OBSERVAÇÕES” o CID correspondente ao diagnóstico:
 - **NIC 2 - N871**
 - **NIC 3 - N872**
 - **Adenocarcinoma in situ (AIS) - D069**

Registro no SI-PNI - Policlínicas, Hospitais, CRIEs e Super Centros:

- Selecionar **Estratégia Especial**
- Preencher Lote, Dose, Vacinador, Data de Aplicação, Via de Administração, Local da aplicação e Data de aplicação e Condição maternal.
- Selecionar **Categoria Comorbidades**
- Selecionar Grupo de atendimento **Imunocomprometidos**
- Selecionar a **especialidade Enfermeiro**
- Preencher no “MOTIVO INDICAÇÃO” o CID correspondente ao diagnóstico:
 - **NIC 2 - N871**
 - **NIC 3 - N872**
 - **Adenocarcinoma in situ (AIS) - D069**

Coordenação do Programa de Imunizações/SVS/SUBPAV/SMS-Rio

e-mail: imunizacaovs@gmail.com

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenação do Programa de Imunizações

4. RECOMENDAÇÕES

Para vacinação, deverá ser feita prescrição médica (rede pública ou particular), contendo a comprovação da condição clínica contida no item 1, ou seja, documentação com o diagnóstico correspondente ao CID e descrição do tratamento iniciado ou finalizado em até 12 meses.

5. DAS BOAS PRÁTICAS

- Cumprir os passos certos com as boas práticas para vacinação segura;
- Apresentar o frasco da vacina à cliente, explicando sobre a vacina que será realizada, esquema e cuidados pós-vacinação;
- Proceder a administração, conforme normativas técnicas PNI/MS.
- Proceder registro na caderneta individual e sistema de informação.

Rio de Janeiro, 01/04/2026