

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenação do Programa de Imunizações

COMUNICADO CPI/SVS nº 15/2026

NOVA RECOMENDAÇÃO DA VACINA HPV PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE

Considerando que o Papilomavírus Humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e a principal causa do câncer de colo de útero e que a vacina contra o HPV é a medida mais eficaz para prevenir a infecção;

Considerando a Nota Técnica nº 96/2026 - CGICI/DPNI/SVSA/MS, que trata da **inclusão da vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para crianças vítimas de violência sexual, a partir de 2 anos de idade**, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações/PNI;

A Superintendência de Vigilância em Saúde, por meio da Coordenação do Programa de Imunizações (CPI), orientação sobre **NOVA RECOMENDAÇÃO DA VACINA HPV**:

1. NOVA INDICAÇÃO: Crianças vítimas de violência sexual, a partir de 2 anos de idade, com oferta em todas as UAP da APS.

2. ESQUEMA: A partir de 2 anos de idade, vítimas de violência sexual

2.1 A dose feita antes de 9 anos de idade **não deve ser considerada para o esquema básico**. Recomenda-se MANTER a dose prevista para faixa de 9 a 14 anos de idade como rotina;

2.2 No caso da violência sexual ocorrer em crianças previamente vacinada, não está indicada a revacinação.

2.3 A avaliação deve ser no serviço de vacinação ou profissional de saúde responsável pelo atendimento da vítima, registrando a condição clínica que fundamenta a indicação;

2.4 Solicitar o consentimento do responsável legal, quando aplicável, no momento do atendimento.

3. REGISTRO DA VACINA HPV PARA NOVA INDICAÇÃO

A vacina HPV administrada em situação de violência sexual deverá ser registrada na **estratégia ESPECIAL**, tipo de dose **DU** e motivo de indicação **CID 10 (T742)** no SIPNI. Para o sistema PEP VITACARE, aguardamos customização para ativação.

4. VIGILÂNCIA DE ESAVI

Adotar vigilância ativa dos vacinados contra HPV, da nova indicação, com busca de possíveis eventos supostamente atribuíveis à vacinação (ESAVI), num período de 30 dias de acompanhamento.

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenação do Programa de Imunizações

5. OUTROS GRUPOS JÁ ATENDIDOS:

Manter a oferta nos demais grupos já atendidos, conforme estratégias de atendimento, Rotina e Especial, vide abaixo:

1. Na rotina: 9 a 19 anos de idade;

2. Nas indicações especiais:

- Pessoas com imunodeficiência primária ou erro inato da imunidade, de 9 a 45 anos, não vacinadas ou que receberam esquema incompleto de vacinação;
- Pessoas em uso de drogas imunossupressoras de 9 a 45 anos;
- Pessoas de 15 anos a 45 anos, usuárias de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV/Aids;
- Pessoas vivendo com HIV/aids de 9 a 45 anos de idade;
- Transplantados de órgãos sólidos e Transplante de células tronco-hematopoiéticas (TCTH) de 9 a 45 anos de idade;
- Pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica: de 9 a 45 anos de idade;
- Mulheres diagnosticadas com Neoplasia Intraepitelial Cervical de alto grau (NIC 2, NIC 3 e Adenocarcinoma in situ – AIS), submetidas a procedimento excisional do colo do útero(LEEP/conização), independentemente da idade, mesmo que acima de 45 anos de idade;
- Pessoas com Papilomatose Respiratória Recorrente (PRR) a partir de 2 anos de idade;
- Pessoas vítimas de abuso sexual (homens e mulheres), na faixa etária de 9 anos a 45 anos de idade;

Pedimos alinhamento técnico como toda rede de vacinação, para acolhimento, orientação, oferta e efetiva vacinação das indicações, evitando burocratizar a vacinação.

Rio de Janeiro, 16/09/2026

Coordenação do Programa de Imunizações

