

МЛИТА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Что такое множество?

Понятие множества — это фундаментальное, неопределяемое понятие в математике. Мы можем лишь пояснить его, опираясь на интуитивное определение Георга Кантора:

> Под **множеством** будем понимать любое собрание определенных и различимых между собою объектов, мыслимое как единое целое. Эти объекты называются **элементами** множества.

Важно, что собрание предметов воспринимается как один объект. Элементы множества могут быть совершенно разнообразными: от студентов в аудитории до чисел или даже "королей и капусты".



Отношение принадлежности и характеристические свойства

Принадлежность Элемента

Символ ∈ обозначает **отношение принадлежности**. Это также базовое понятие, не требующее формального определения.

- Запись $x \in A$ означает, что элемент x принадлежит множеству A.
- Если элемент x не принадлежит множеству A, то пишут $x \notin A$.


Пример: $1 \in \mathbb{N}$ (1 принадлежит множеству натуральных чисел).

Характеристические Свойства

Множество всех объектов x, обладающих свойством P, обозначается $\{x \mid P(x)\}$.

Если $Y = \{x \mid P(x)\}$, то P(x) называется **характеристическим свойством** множества Y.

Например, свойство "быть четным числом" является характеристическим для множества всех четных чисел.



Интуитивные принципы Кантора

Георг Кантор сформулировал несколько ключевых интуитивных принципов, которые лежат в основе наивной теории множеств:

Принцип Абстракции

Любое характеристическое свойство определяет некоторое множество, состоящее из тех и только тех предметов, для которых это свойство выполнено.

Это означает, что для любого четко определенного свойства всегда существует соответствующее множество.

Принцип Объемности

Множества A и B считаются равными, если они состоят из одних и тех же элементов.

Порядок элементов или их повторение в описании множества не имеет значения.

Пример объемности: множество всех положительных четных чисел равно множеству положительных целых чисел, представимых в виде суммы двух положительных нечетных чисел.

Обозначение множеств и "ИЛИ"

Множество по перечислению элементов

Множество, элементами которого являются объекты $a_1, a_2, \dots, a_n$ и только они, обозначают $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Например, множество $\{1, 2, 3\}$ можно определить характеристическим свойством: $\{x \mid x = 1 \text{ или } x = 2 \text{ или } x = 3\}$.

Важно, что порядок элементов не важен:

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}.$$


И повторения не влияют:

$$\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}.$$

"ИЛИ" в теории множеств

В логике и теории множеств "или" (часто обозначаемое как ∨) является **неразделительным**, то есть означает "A, или B, или A и B вместе".

Например, "число делится на 2 или на 3" включает числа, делящиеся только на 2, только на 3, и на 2 и 3 одновременно (т.е. на 6).



Различие элемента и множества из одного элемента

Это одна из самых тонких, но критически важных концепций для понимания теории множеств:

Сам элемент (x)

Представьте себе шимпанзе.

Это конкретный объект, существующий сам по себе. Он является единицей, которую мы можем рассматривать.

Множество из одного элемента ($\{x\}$)

Представьте шимпанзе, посаженного в клетку в зоопарке.

Это уже не сам шимпанзе, а **множество**, единственным элементом которого является этот шимпанзе. Клетка (множество) — это контейнер, а не содержимое.

Понимание этого различия предотвращает многие ошибки в дальнейшем изучении теории множеств.

Отношение включения (подмножества)


Множество A есть **подмножество** множества B (обозначается $A \subseteq B$), если каждый элемент A является элементом B.

Математически: если $x \in A$, то $x \in B$.

- Каждое множество является подмножеством самого себя: $A \subseteq A$.

- Если A не является подмножеством B, это значит, что существует хотя бы один элемент в A, который не принадлежит B.

Отношение **строгого включения (**собственное подмножество): $A \subset B$, если $A \subseteq B$ и $A \neq B$.



Доказательство равенства множеств

Для доказательства равенства двух множеств A и B необходимо выполнить два этапа, используя отношение включения:

01

Шаг 1: Доказать $A \subseteq B$

Показать, что каждый элемент множества A также является элементом множества B.

02


Шаг 2: Доказать $B \subseteq A$

Показать, что каждый элемент множества B также является элементом множества A.

Если оба условия выполнены, то по принципу объемности множества A и B равны, т.е. $A = B$.

Основные числовые множества

В математике используются основные числовые множества, каждое со своим обозначением и уникальными свойствами.



Натуральные числа ($\mathbb{N}$)

Используются для счета: **1, 2, 3...** (считаем, что **0** не входит).

Целые числа ($\mathbb{Z}$)

Включают натуральные числа, их отрицательные аналоги и ноль: **..., -2, -1, 0, 1, 2,...**

Рациональные числа ($\mathbb{Q}$)


Могут быть выражены как дроби **p/q**, где **p** и **q** — целые числа, а **q ≠ 0**.

Вещественные числа ($\mathbb{R}$)

Включают все рациональные и иррациональные числа (например, **π, √2**).

Комплексные числа ($\mathbb{C}$)


Числа вида **a + bi**, где **a** и **b** — вещественные числа, а **i** — мнимая единица (**$i^2 = -1$**).



Взаимосвязи множеств

Эти множества образуют строгую иерархию включений:

Если множество **A** является подмножеством **B** (**A ⊂ B**), это означает, что каждый элемент **A** также является элементом **B**.



Важное различие

Принадлежность vs. Включение

Принадлежность ($\in$)

Отношение между элементом и множеством. Например, $\mathbf{3} \in \mathbb{N}$ (3 принадлежит множеству натуральных чисел).

Включение ($\subset$)

Отношение между двумя множествами. Например, $\{\mathbf{3}\} \subset \mathbb{N}$ (множество, содержащее только 3, является подмножеством $\mathbb{N}$).

> Важно: $\mathbf{3}$ является элементом $\mathbb{N}$, но $\mathbf{3}$ не является подмножеством $\mathbb{N}$.

Пустое множество и множество-степень

Пустое множество (∅)

Множество, не содержащее ни одного элемента. Оно является подмножеством любого множества.

Все пустые множества равны, так как они определяются тождественно ложным характеристическим свойством.

Множество-степень (P(A))

Множество всех подмножеств данного множества **A**.


Если множество **A** состоит из **n** элементов, то **P(A)** состоит из 2^n элементов.

Например,
если **A = {1, 2}**,
то **P(A) = {∅, {1}, {2}, {1, 2}}**.



Парадоксы теории множеств

В конце XIX - начале XX веков были обнаружены парадоксы, которые поставили под сомнение "наивную" теорию множеств.





Парадокс Бурали-Форти (1879)

Связан с множеством всех порядковых чисел.

Парадокс Рассела (начало XX века)

Связан с множеством всех множеств, которые не содержат себя в качестве элемента.

Кризис математики

Эти парадоксы выявили противоречивость интуитивного изложения теории множеств.

Последствия и решения

Парадоксы Рассела и другие трудности свидетельствовали о кризисе математики на рубеже XIX и XX веков.

Наивная теория множеств оказалась противоречивой, особенно при попытке создать "множество всех множеств".

Решение: аксиоматические теории

Для устранения противоречий были предложены аксиоматические теории множеств (например, Цермело-Френкеля), которые строго определяют правила построения множеств и избегают парадоксов.

Ключевые выводы

1 **Иерархия чисел**

Математика использует четко определенные и вложенные числовые множества от натуральных до комплексных.

2 **Точность определений**


Важно различать принадлежность элемента множеству и включение одного множества в другое.

3 **Значение пустого множества**


Пустое множество — фундаментальное понятие, являющееся подмножеством любого множества.

4 **Развитие теории множеств**

Открытие парадоксов привело к созданию аксиоматических теорий, обеспечивающих непротиворечивость математики.



Кардинальные числа множеств и операции над интервалами



Введение в кардинальные числа

Мера "мощности" множества

Кардинальное число определяет количество элементов.

Георг Кантор (1874)

Доказал, что бесконечные множества имеют разную мощность.

Разные бесконечности


Натуральные числа — счётные, вещественные — несчётные.



Счётные и несчётные множества

Счётные множества

Могут быть поставлены во взаимно-однозначное соответствие с натуральными числами (например, рациональные).




Несчётные множества

Нельзя установить такое соответствие (например, интервал [0,1] на вещественной прямой).
Кантор доказал: мощность интервала [0,1] больше, чем мощность натуральных чисел.

Парадоксы бесконечного

- Действительных чисел на отрезке [0;10] **столько же**, сколько на отрезке [0;1].



соответствует определению!

Невероятно! но…

Будем проектировать точки отрезка [0;1] на отрезок [0;10] из центра проекции, полученного на пересечении прямых, соединяющих концы отрезков

$[0;1] \sim [0;10]$

$(\exists \varphi: [0;1] \to [0;10])\ \varphi(x) = 10x,$
φ – биекция




Иллюстрация: разная "плотность" точек

Что такое Алефы? Введение в бесконечные кардиналы

Последовательность чисел

Алефы — это последовательность чисел, специально разработанная для обозначения мощностей различных бесконечных множеств.

Введены Кантором

Концепция алефов была введена великим математиком Георгом Кантором в конце XIX века. Для их обозначения используется символ — еврейская буква ℵ (алеф).

Алеф-нуль (ℵ0)

Алеф-нуль (ℵ0) представляет собой мощность множества натуральных чисел и является наименьшим из всех бесконечных кардинальных чисел.

ℵ0 — начало бесконечности

Счетная бесконечность

Множества натуральных, целых и рациональных чисел обладают мощностью ℵ0, что делает их "счетно бесконечными".

Пример: Простые числа

Даже множество всех простых чисел, хотя и бесконечно, также является счётным и имеет мощность ℵ0.

Фундамент для понимания

ℵ0 служит фундаментальным понятием для осмысления различных порядков и размеров бесконечных множеств.

ℵ0 закладывает основу для понимания того, как даже в бесконечности существуют свои "размеры".

Следующий уровень: ℵ1 и континуум

ℵ1 — это мощность множества всех счётных ординалов. Он является первым **несчётным** кардиналом, знаменуя собой переход от счётной к более сложной, несчётной бесконечности.

Один из центральных вопросов математики связан с **гипотезой континуума**, которая задаётся вопросом: равна ли мощность континуума (множества действительных чисел) ℵ1? Этот вопрос остаётся одним из самых глубоких и нерешённых в теории множеств.




ℵ1 является важным **порогом**, разделяющим мир счётных бесконечностей от мира несчётных.

Кардинальные числа и интервалы

Мощность континуума

Любой интервал на вещественной прямой обладает мощностью континуума.



Внутри любого интервала [a,b] существует несчётное множество точек.

Иерархия Алефов: бесконечное множество бесконечностей

1

Для каждого ординала

Для каждого ординала, как конечного, так и бесконечного, существует соответствующий алеф, обозначающий его мощность.

2

Лестница мощностей

Это означает, что бесконечность не является чем-то единым; существует целая, бесконечная лестница различных мощностей.

3

Принцип Кантора

Кантор доказал, что мощность множества всех подмножеств (булеана) всегда строго больше мощности исходного множества, создавая бесконечную цепочку возрастающих бесконечностей.

Иерархия алефов показывает, что бесконечность может быть "больше" или "меньше" другой бесконечности.

Визуализация иерархии Алефов

ℵ0: Точка отсчёта


Символизирует множество счётных бесконечностей, таких как натуральные, целые и рациональные числа. Это отправная точка в исследовании бесконечности.

ℵ1: Следующий уровень

Представляет порог несчётной бесконечности, например, мощность множества действительных чисел. Это качественный скачок в масштабах бесконечности.

Дальнейшие Алефы

За ℵ1 следует бесконечная лестница алефов (ℵ2, ℵ3 и т.д.), каждый из которых представляет собой всё более крупные и сложные бесконечные множества. Эта иерархия уходит в самую глубину бесконечности.



Операции с кардинальными числами: сложение и умножение

1

Сложение

Мощность объединения непересекающихся множеств.

Пример: $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$

2

Умножение

Мощность декартова произведения множеств.

Пример: $\aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$

Мощность счётного множества не меняется при этих операциях.

Особенности операций с бесконечными кардиналами

Правило максимума

Для бесконечных κ и λ: $\kappa + \lambda = \max(\kappa, \lambda)$, $\kappa \times \lambda = \max(\kappa, \lambda)$.

Мощность континуума

Мощность вещественных чисел (континуум) = $2^{\aleph_0}$, что больше $\aleph_0$.

Возведение в степень

$2^{\aleph_0}$ — мощность множества всех подмножеств натуральных чисел.

Операции над интервалами и их мощностями



Объединение интервалов

Мощность остаётся континуумом, даже если интервалы не пересекаются.




Декартово произведение

Произведение интервалов (например, прямоугольник) имеет мощность континуума.

Мощность интервалов не меняется при конечных операциях объединения и произведения.

Современные обобщения: интервальные и нечеткие множества

- **Теория интервальных нечетких множеств:** расширяет классические понятия мощности.
- **Обобщённые кардинальные числа:** для описания "мощности" таких объектов.
- **Применение:** в логике, теории информации, вычислительной математике.



Заключение: почему кардинальные числа важны

- Понимание бесконечности

  Позволяют понять разные уровни бесконечности и структуру множеств.

- Ключ к функциям


  Основа для понимания фундаментальных свойств интервалов и функций.

- Научная база

  Фундамент для современных исследований в математике, логике и информатике.

Диаграммы Эйлера: визуализация множеств

Наглядный подход к теории множеств и основам логики



Что такое диаграммы Эйлера?



Введены Леонардом Эйлером для **визуализации множеств**.

Множества изображаются кругами или овальными областями на плоскости.

Элементы множества условно располагаются внутри этих областей.

Принципы построения

Универсум


Все множества размещаются внутри **квадрата или прямоугольника**, представляющего **универсальное множество** (универсум).

Пересечение

Если элементы принадлежат нескольким множествам, области этих множеств **перекрываются**.

Относительный размер

Размер кругов **не имеет значения**, важны только их **взаимное расположение** и **пересечения**.




Наглядная иллюстрация


Пример диаграммы Эйлера, показывающий операции над множествами.

Визуализация помогает понять отношения между множествами.

Роль диаграмм в математике

- **Иллюстрация:** наглядное представление абстрактных кон
- **Представление:** помогают формировать интуитивное пон
- **Доказательство:** могут служить вспомогательным инструментом для проверки или формирования гипотез, аналогично чертежам в геометрии.





Теория множеств: построение новых множеств

Основные операции, их свойства и значимость для различных областей математики.

01

Введение в операции над множествами

Краткий обзор важности операций для конструирования новых множеств.

02

Объединение множеств

Исследование операции объединения и её применение, включая примеры.

03

Пересечение множеств

Детальный анализ пересечения, его свойств и концепции непересекающихся множеств.

04

Разность множеств и относительное дополнение

Понимание разности и относительного дополнения как основы для уточнения множеств.

05

Симметрическая разность

Изучение элементов, уникальных для каждого из множеств.

06

Абсолютное дополнение и универсум

Рассмотрение абсолютного дополнения в контексте универсального множества.

07

Исторический контекст и выводы


Вклад Джузеппе Пеано и ключевые выводы по изученным операциям.

Объединение множеств


Объединением двух множеств A и B называется множество, состоящее из всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из этих множеств. Это означает, что каждый элемент в объединении находится в A, или в B, или в обоих.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$$

Например, если $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{3, 4, 5\}$, то $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Объединение является коммутативной и ассоциативной операцией.



Пересечение множеств



Пересечением двух множеств A и B называется множество, состоящее из всех элементов, которые одновременно принадлежат и A, и B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$$

Например, если $A = \{1, 2, 3, 6\}$ и $B = \{3, 5, 6, 7\}$, то $A \cap B = \{3, 6\}$.

Важным следствием является то, что $A \cap B \subseteq A$ и $A \cap B \subseteq B$.
Два множества называют непересекающимися, если их пересечение является пустым множеством ($A \cap B = \emptyset$).


Разность множеств и относительное дополнение

Разность множеств A и B, обозначаемая $A \setminus B$ или $A - B$, представляет собой множество всех элементов из A, которые не являются элементами B.


$$A \quad B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}$$

Эту операцию также называют относительным дополнением множества B до множества A.

Например, если $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $B = \{3, 5, 6, 7\}$, то $A \setminus B = \{1, 2, 4\}$.



Симметрическая разность



Симметрическая разность множеств A и B, обозначаемая $A \, \Delta B$ или $A \oplus B$, состоит из элементов, которые принадлежат ровно одному из множеств A или B.

Эта операция эквивалентна объединению двух множеств минус их пересечение:

Например, для $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и $B = \{3, 4, 5, 6\}$, симметрическая разность $A \Delta B = \{1, 2, 5, 6\}$.


Абсолютное дополнение и универсум

Абсолютное дополнение множества A, обозначаемое A^c, A' или $\overline{A}$, определяется только тогда, когда фиксирован универсум (U или Ω).

Универсум – это некоторое фиксированное множество, содержащее все рассматриваемые в данном контексте множества как подмножества.

$$A^c = \{x \mid x \in U \text{ и } x \notin A\}$$

Очевидно, что $A^c = U \setminus A$. Важно отметить, что символ A' также используется для обозначения логического отрицания.



Примеры применения

1

Базы данных
Операции над множествами используются в SQL для фильтрации и объединения данных (например, `UNION`, `INTERSECT`, `EXCEPT`).

2


Логика
Теория множеств служит основой для математической логики, где множество истинности высказывания аналогично множеству.

3

Программирование
Многие языки программирования имеют встроенные типы данных для множеств и операции над ними (например, Python's `set`).

4

Статистика
Понятия множеств и их операций применяются для анализа выборок и событий в теории вероятностей.



Исторический Вклад: Джузеппе Пеано



Джузеппе Пеано (1858–1932)

Джузеппе Пеано – выдающийся итальянский математик, логик и философ. В 1888 году в своей книге "Арифметические принципы, новый метод изложения" он представил формальный язык для математики.

Именно Пеано впервые систематически использовал современные символы для операций над множествами, которые мы изучили сегодня: ∪(объединение), ∩(пересечение), ∈(принадлежность) и многие другие. Его обозначения стали общепринятыми и значительно упростили запись математических выражений.

Вклад Пеано выходит за рамки теории множеств; он также известен своими аксиомами для натуральных чисел и работами по математической логике.

Булевы операции

Основные операции над множествами:



Объединение

Все элементы, принадлежащие **хотя бы одному** из множеств.




Пересечение

Элементы, принадлежащие **всем** рассматриваемым множествам.



Дополнение

Все элементы универсума, **не принадлежащие** данному множеству.



Булевы выражения и комбинации

Булевы выражения

Выражения, составленные из множеств с помощью булевых операций.

Например: $A \cup (B \cap C)$

Булевы комбинации

Значение булева выражения, представляющее собой **новое множество**.


Пример: заштрихованная область на диаграмме Эйлера.


Булевы тождества

Равенство двух булевых выражений.

Диаграммы Эйлера могут **наглядно подтвердить** тождества, показывая, что области, соответствующие обеим сторонам равенства, совпадают.

> "Здесь не имеет значения относительный размер кругов либо других замкнутых областей, но лишь их взаимное расположение."





Закон Де Моргана, проиллюстрированный диаграммами Эйлера.

Визуальная Мощность

Диаграммы Эйлера — это мощный инструмент для понимания абстрактных концепций теории множеств.

Основа Логики

Они служат фундаментальной основой для изучения логических операций и булевой алгебры.

Развитие Интуиции

Помогают развивать интуитивное понимание сложных математических отношений.



Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Простейшие булевы тождества

Булевы тождества - это фундаментальные правила, регулирующие операции над множествами. Они аналогичны алгебраическим законам для чисел и служат основой для логических операций и работы с данными. Мы рассмотрим основные тождества, применимые к любым подмножествам A, B и C универсума U.



Коммутативность и ассоциативность

Коммутативность

- $A \cup B = B \cup A$ (для объединения)
- $A \cap B = B \cap A$ (для пересечения)

Порядок элементов не влияет на результат операции объединения или пересечения.

Ассоциативность

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (для объединения)
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (для пересечения)

Группировка элементов не влияет на результат при последовательном выполнении одинаковых операций.

Эти свойства позволяют нам свободно переставлять и группировать множества в выражениях, не изменяя их значения.

Дистрибутивность и элементы-поглотители

Дистрибутивность

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Операции объединения и пересечения распределяются относительно друг друга.

Нейтральные элементы и элементы-поглотители

- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap U = A$
- $A \cup U = U$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$

Пустое множество ($\emptyset$) и универсум (U) ведут себя как нейтральные/поглощающие элементы.

Дистрибутивность является мощным инструментом для упрощения сложных выражений. Понимание роли пустого множества и универсума упрощает многие вычисления.

Дополнения, идемпотентность и законы де Моргана

Дополнения

- $A \cup \neg A = U$ (объединение множества с его дополнением)
- $A \cap \neg A = \emptyset$ (пересечение множества с его дополнением)

Идемпотентность

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

Повторение операции не изменяет результат.

Законы де Моргана

- $\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$
- $\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$

Эти законы связывают операции объединения и пересечения с дополнением.

Законы де Моргана особенно важны в логике и информатике для преобразования выражений.

Законы поглощения и доказательство дистрибутивности

Законы поглощения


- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

Эти законы показывают, как одно множество "поглощает" результат операции с другим множеством.

Пример доказательства:

$A \cup (B \cap C) =$
$(A \cup B) \cap (A \cup C)$


Доказательство этого тождества демонстрирует, как мы можем установить равенство двух множеств, показывая, что каждое из них является подмножеством другого. Мы рассматриваем элемент **x** и показываем, что его принадлежность к левой части выражения влечет за собой принадлежность к правой, и наоборот.





Визуализация множеств: диаграммы Венна

Диаграммы Венна — мощный инструмент для визуализации отношений между множествами. Они помогают понять и доказать булевы тождества, делая абстрактные концепции наглядными.



Построение диаграмм Венна

Для **n** множеств диаграмма Венна должна содержать все возможные пересечения вида $Y_1 \cap Y_2 \cap \ldots \cap Y_n$, где Y_k либо A_k, либо $\neg A_k$. Эти пересечения называются составляющими системы множеств.

Для двух и трех множеств

Для **n=2** и **n=3** множества обычно изображаются кругами. Каждая область на диаграмме соответствует одной составляющей.




Диаграмма Венна для трех множеств

Для четырех и более множеств

Для **n=4** требуются эллипсы или невыпуклые фигуры. Для **n>3** диаграмму Венна невозможно изобразить только кругами, так как не все области пересечений могут быть сформированы.




Диаграмма Венна для четырех множеств

Отношение подмножества и его свойства

Теорема устанавливает эквивалентность между различными утверждениями об отношении подмножества между множествами A и B.

1

$A \subseteq B$

A является подмножеством B.

2

$A \cap B = A$

Пересечение A и B равно A.

3

$A \cup B = B$

Объединение A и B равно B.

Эти эквивалентности являются мощным инструментом для преобразования утверждений о подмножествах в выражения с операциями объединения и пересечения, что упрощает доказательства и анализ множеств.

Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Понятие высказывания

В математической логике основным неопределяемым понятием является «высказывание». Высказывание — это любое повествовательное предложение, которое утверждает что-либо и может быть однозначно определено как истинное или ложное. Эти два состояния называются логическими значениями.

Примеры истинных высказываний

- Великий Новгород стоит на Волхове. (Истина)
- Число 6 делится на 2 и на 3. (Истина)

Примеры ложных высказываний

- Париж – столица Англии. (Ложь)
- Карась не рыба. (Ложь)

Что не является высказыванием

- Да здравствуют наши спортсмены! (Восклицание)
- Сколько времени? (Вопрос)

Простые и сложные высказывания

Простые (элементарные) высказывания

Простое высказывание представляет собой одно утверждение, которое не может быть разложено на более простые логические компоненты.

> Примеры:
>
> - «Идет дождь.»
> - «Небо голубое.»

В алгебре логики элементарные высказывания обозначаются малыми латинскими буквами:
$x, y, z, x_1, x_2, \ldots$

Сложные (составные) высказывания

Сложные высказывания образуются из элементарных с помощью грамматических связок, которые в логике называются логическими операциями.

> Основные связки:
>
> - «не» (отрицание)
> - «и» (конъюнкция)
> - «или» (дизъюнкция)
> - «если ..., то ...» (импликация)
> - «тогда и только тогда» (эквиваленция)

Логическое значение высказывания, будь то истина или ложь, является единственным аспектом, рассматриваемым в алгебре логики, отвлекаясь от его повседневного содержания.

Базовые логические операции

Отрицание: НЕ (NOT)

Отрицание высказывания x (обозначается $\bar{x}$ или $\neg x$) — это новое высказывание, которое истинно, если x ложно, и ложно, если x истинно. Читается как «не x» или «неверно, что x».

x	$\bar{x}$
Истина (1)	Ложь (0)
Ложь (0)	Истина (1)

Двойное отрицание: Высказывание (двойное отрицание x) имеет то же логическое значение, что и исходное высказывание x. Например, «Неверно, что река Волхов не вытекает из озера Ильмень» эквивалентно «Река Волхов вытекает из озера Ильмень».

Конъюнкция: И (AND)

Конъюнкция (логическое умножение) двух высказываний x и y (обозначается $x \wedge y$ или $x \& y$) истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания x и y истинны. В остальных случаях конъюнкция ложна.

x	y	$x \wedge y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Пример: Высказывание «Число 6 делится на 2 **и** число 6 делится на 3» истинно, так как оба его члена истинны.

В отличие от повседневной речи, в алгебре логики можно соединять конъюнкцией любые высказывания, независимо от их содержания. Например, $x \wedge \bar{x}$ всегда ложно.

Дизъюнкция: ИЛИ (OR)

Дизъюнкция (логическое сложение) двух высказываний x и y (обозначается $x \vee y$) истинна, если хотя бы одно из высказываний x или y истинно. Она ложна только в том случае, если оба высказывания ложны.

x	y	$x \vee y$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Пример: Высказывание «В треугольнике DFE угол D **или** угол E острый» истинно.

В алгебре логики союз «или» всегда используется в неисключающем смысле (т.е. оба высказывания могут быть истинными). Высказывание $x \vee \bar{x}$ всегда истинно.

Импликация: ЕСЛИ... ТО (IF... THEN)

Импликация двух высказываний x (посылка) и y (заключение) (обозначается $x \rightarrow y$) считается ложной только в одном случае: если посылка x истинна, а заключение y ложно. Во всех остальных случаях импликация истинна.

x	y	$x \rightarrow y$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Пример: Высказывание «**Если** число 12 делится на 6, **то** оно делится на 3» истинно.

В математической логике, в отличие от обыденной речи, смысл высказываний в импликации не рассматривается, и заключение y не обязано "вытекать" из x по содержанию. Импликация критически важна в доказательствах.

Эквиваленция: тогда и только тогда, когда (IFF)

Эквиваленция (обозначается $x \leftrightarrow y$) истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания x и y имеют одинаковое логическое значение (оба истинны или оба ложны). В остальных случаях эквиваленция ложна.

x	y	$x \ (\leftrightarrow) \ y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Пример: «Треугольник SPQ равнобедренный **тогда и только тогда, когда** $\angle P = \angle Q$» является истинной эквиваленцией.

Эквивалентность играет фундаментальную роль в математических доказательствах, особенно при формулировании теорем в виде необходимых и достаточных условий.

Формулы алгебры логики

Формула алгебры логики — это любое сложное высказывание, полученное из элементарных высказываний с помощью логических операций.

1 Примеры построения формул

Из высказываний x, y, z можно построить:

- $(x \vee y) \wedge \bar{z}$
- $x \to \left(\overline{\{y \wedge (x \vee z)\}}\right)$

2 Приоритет операций

Для упрощения записи формул используются соглашения о приоритете:

1. Отрицание (выполняется первым).
2. Конъюнкция.
3. Дизъюнкция.
4. Импликация.
5. Эквиваленция (выполняется последней).

Скобки могут быть опущены с учетом этих правил.

Логическое значение формулы полностью определяется логическими значениями входящих в нее элементарных высказываний.

Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Таблицы истинности и эквивалентность формул в логике



Таблицы истинности

Таблицы истинности являются фундаментальным инструментом в логике, позволяющим полностью описать все возможные логические значения формулы на основе значений входящих в нее элементарных высказываний.

x	y	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$\overline{x} \vee y$	$x \wedge \overline{y}$	$\overline{x} \vee y \to x \wedge \overline{y}$
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1

Для формулы с n элементарными высказываниями таблица истинности содержит 2^n строк, каждая из которых представляет уникальную комбинацию значений истинности.

ПРИОРИТЕТ ОПЕРАЦИЙ

Правила расстановки скобок

В сложных логических формулах, содержащих различные связки, крайне важна корректная расстановка скобок для определения порядка операций. Чтобы сократить их количество, применяются правила приоритета:

1 **Отрицание ($\overline{x}$)**

Имеет наивысший приоритет, применяется первым.

2 **Конъюнкция (&)**

Применяется второй по приоритету.

3 **Дизъюнкция ($\vee$) и исключающее ИЛИ ($\oplus$)**

Следующие по приоритету. Между ними нет устоявшегося правила, поэтому рекомендуется использовать скобки.

4 **Импликация ($\rightarrow$)**

Имеет самый низкий приоритет, применяется последней.

Совет: Для связок одного приоритета (например, $\vee$ и $\oplus$) или нескольких импликаций подряд, всегда лучше добавить лишнюю пару скобок для ясности, если нет четкого правила слева направо.

Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Эквивалентность логических формул

Две формулы алгебры логики *A* и *B* называются равносильными (эквивалентными), если они принимают одинаковые логические значения при любых наборах значений входящих в них элементарных высказываний. Равносильность обозначается знаком ≡ .

Примеры равносильных формул:

- $\overline{x} \equiv x$
- $x \vee x \equiv x$
- $(x \wedge \overline{x}) \vee y \equiv y$



ключевые понятия эквивалентности

Тавтологии и противоречия

Тождественно истинная формула (тавтология)

Формула A называется тождественно истинной (или тавтологией), если она принимает значение 1 при всех возможных значениях входящих в нее переменных.

> Примеры:
>
> - $x \vee \overline{x}$
> - $x \to (y \to x)$

Тождественно ложная формула (противоречие)

Формула A называется тождественно ложной, если она принимает значение 0 при всех возможных значениях входящих в нее переменных.

> Пример:
>
> - $x \wedge \overline{x}$

Важно: Отношение равносильности является рефлексивным, симметричным и транзитивным. Между понятиями равносильности и эквивалентности существует прямая связь: формулы A и B равносильны тогда и только тогда, когда формула A

Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Логика высказываний и теория множеств

Между теоретико-множественными тождествами и тождествами логики высказываний существует глубокая связь. Эта связь позволяет использовать аппарат логики для доказательства тождеств теории множеств.

теория множеств

Оперирует с объединением (∪), пересечением (∩), дополнением (¯) и равенством (=) множеств.



логика высказываний


Использует дизъюнкцию (∨), конъюнкцию (∧), отрицание (¬) и эквивалентность (≡ или ~) формул.

Многие тождества обеих теорий имеют схожую структуру, что указывает на их фундаментальное сходство.

сходства в тождествах

Параллели между теориями

Разница между выражениями состоит в прямой замене символов: переменные, обозначающие множества (A, B, C), заменяются на пропозициональные переменные (A, B, C).



Теоретико-множественные тождества

- $(A \cup (B \cup C)) = ((A \cup B) \cup C)$
- $(A \cap (B \cup C)) = ((A \cap B) \cup (A \cap C))$
- $\overline{A \cup B} = (\overline{A} \cap \overline{B})$
- $\overline{\overline{A}} = A$

Соответствующие тождества логики высказываний

- $(A \vee (B \vee C)) \sim ((A \vee B) \vee C)$
- $(A \wedge (B \vee C)) \sim ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$
- $\neg(A \vee B) \sim (\neg A \wedge \neg B)$
- $\neg\neg A \sim A$

формальное определение

Термы теории множеств

Для формализации преобразований необходимо определить "термы" теории множеств, которые являются аналогами алгебраических выражений.

01

Простейшие термы

Переменные (например, A, B, C), обозначающие множества, являются термами.

02

Построение новых термов

Если t_1 и t_2 являются термами, то $(t_1 \cup t_2)$, $(t_1 \cap t_2)$ и $\bar{t}_1$ также являются термами.

03

Индуктивное определение

Данное определение полностью описывает процесс построения термов.

Значение терма $t(A_1, \ldots, A_n)$ — это множество, полученное последовательным применением теоретико-множественных операций.

отображение ρ: $T \rightarrow F$

Преобразование термов в формулы

Отображение $\rho: T \rightarrow F$ (из множества термов теории множеств T во множество формул логики высказываний F) определяется следующим образом:

1

Преобразование простейших термов

$\rho(A) = A$, $\rho(B) = B$, $\rho(C) = C$ и т.д. для всех переменных, обозначающих множества.

2

Преобразование составных термов

- $\rho(t_1 \cup t_2) = (\rho(t_1) \vee \rho(t_2))$
- $\rho(t_1 \cap t_2) = (\rho(t_1) \wedge \rho(t_2))$
- $\rho(\bar{t}_1) = \neg\rho(t_1)$

Пример:

$\rho((A \cup B) \cap (A \cup C)) = ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$

Данное отображение позволяет формально переводить выражения из одной теории в другую, сохраняя их логическую структуру.

Теорема об эквивалентности

Теорема

Рассмотрим два произвольных терма $t_1, t_2 \in T$. Имеет место теоретико-множественное тождество $t_1 = t_2$тогда и только тогда, когда в логике высказываний верна эквивалентность $\rho(t_1) \sim \rho(t_2)$.

Эта теорема подчеркивает глубокую взаимосвязь между, казалось бы, разными областями математической логики и открывает возможности для применения методов одной области для доказательства утверждений в другой.

Лекция 2. Основы теории множеств

2.1. Множества и операции над ними

2.2. Простейшие тождества


2.3. Понятие формулы

2.4. Таблицы истинности

2.5. Эквивалентность формул

2.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

2.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств



Основы логики высказываний и теории множеств



Основные тождества алгебры логики

В логике высказываний существуют базовые равносильности, которые позволяют упрощать логические выражения и доказывать их эквивалентность. Эти тождества можно разделить на несколько групп, каждая из которых отражает определенные свойства логических операций.



I. Основные равносильности (группа 1)

1 **Законы идемпотентности**

- $x \,\&\, x \equiv x$
- $x \vee x \equiv x$

Эти законы утверждают, что повторение одного и того же высказывания в конъюнкции или дизъюнкции не изменяет его истинностного значения.

2 **Законы нейтрального и поглощающего элементов**

- $x \,\&\, И \equiv x$
- $x \vee И \equiv И$
- $x \,\&\, Л \equiv Л$
- $x \vee Л \equiv x$

Они показывают, как истинное (И) и ложное (Л) значения влияют на логические операции.

3 **Законы противоречия и исключенного третьего**

- $x \,\&\, \neg x \equiv Л$
- $x \vee \neg x \equiv И$

Первый гласит, что высказывание не может быть истинным и ложным одновременно, второй — что оно либо истинно, либо ложно.

4 **Закон снятия двойного отрицания**

- $\neg(\neg x) \equiv x$

Двойное отрицание утверждения эквивалентно самому утверждению.

Основные равносильности (группа 2)

1

Законы поглощения

- $x \& (y \vee x) \equiv x$
- $x \vee (y \& x) \equiv x$

Эти законы показывают, как одна переменная может "поглощать" другую в определенных комбинациях логических операций.

2

Доказательство закона поглощения: $x \& (y \vee x) \equiv x$

- Если $x = И$, то $y \vee И = И$, и $И \& И = И$. (Обе части равны И)
- Если $x = Л$, то $Л \& (y \vee Л) = Л$, так как конъюнкция с Л всегда Л. (Обе части равны Л)

Таким образом, значения формулы всегда совпадают со значениями x.



II. Равносильности, выражающие одни логические операции через другие

Эти тождества демонстрируют взаимосвязь между различными логическими операциями и позволяют выражать их в различных формах. Это ключевой аспект для построения минимальных базисов логических функций.



Важные равносильности для преобразований

Эквивалентность через импликацию

- $x \leftrightarrow y \equiv (x \rightarrow y) \,\&\, (y \rightarrow x)$

Эквивалентность двух высказываний означает, что они имплицируют друг друга.

Импликация через дизъюнкцию и отрицание

- $x \rightarrow y \equiv \neg x \vee y$

Это тождество позволяет представить импликацию как дизъюнкцию отрицания первого аргумента и второго аргумента.

Законы де Моргана

- $\neg(x \,\&\, y) \equiv \neg x \vee \neg y$
- $\neg(x \vee y) \equiv \neg x \,\&\, \neg y$

Эти законы описывают, как отрицание распределяется по конъюнкции и дизъюнкции.

Выражение конъюнкции и дизъюнкции через отрицание

- $x \,\&\, y \equiv \neg(\neg x \vee \neg y)$
- $x \vee y \equiv \neg(\neg x \,\&\, \neg y)$

Эти тождества показывают, что все базовые операции могут быть выражены через отрицание и одну из операций (конъюнкцию или дизъюнкцию).

Доказательства ключевых равносильностей

Доказательство: $x \leftrightarrow y \equiv (x \rightarrow y) \,\&\, (y \rightarrow x)$

- Если x и y имеют одинаковые значения (И,И или Л,Л):
  - $x \leftrightarrow y$ истинно.
  - $(x \rightarrow y)$ истинно, $(y \rightarrow x)$ истинно, следовательно, их конъюнкция истинна.
- Если x и y имеют разные значения (И,Л или Л,И):
  - $x \leftrightarrow y$ ложно.
  - Одна из импликаций $(x \rightarrow y)$ или $(y \rightarrow x)$ будет ложной, делая конъюнкцию ложной.

Доказательство: $\neg(x \,\&\, y) \equiv \neg x \vee \neg y$ (закон де Моргана)

- Если x = И, y = И:
  - $\neg(И \,\&\, И) = \neg И = Л$
  - $\neg И \vee \neg И = Л \vee Л = Л$
- Если хотя бы одно из x или y ложно:
  - $\neg(x \,\&\, y)$ истинно.
  - $\neg x \vee \neg y$ истинно (поскольку хотя бы одно из $\neg x$ или $\neg y$ будет истинным).

Эти доказательства демонстрируют, как таблица истинности позволяет верифицировать эквивалентность логических выражений.



Минимальные базисы логических операций

Из рассмотренных равносильностей следует, что любую формулу алгебры логики можно выразить через **конъюнкцию и отрицание**, или через **дизъюнкцию и отрицание**. Это означает, что эти пары операций образуют так называемые "функционально полные" системы, или минимальные базисы.

Штрих Шеффера: универсальная операция

Существуют операции, с помощью которых может быть выражена любая из пяти основных логических операций. Одной из таких уникальных операций является "Штрих Шеффера", обозначаемая $x \mid y$. Она определяется как $\neg(x \& y)$.

1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

Из таблицы видно, что:

- $\neg x \equiv x \mid x$
- $x \& y \equiv (x \mid y) \mid (x \mid y)$

Это доказывает, что Штрих Шеффера **сам по себе** является функционально полным базисом. Аналогично, операция $\varphi(x,y) \equiv \neg(x \vee y)$, известная как **Стрелка Пирса**, также образует функционально полный базис.

III. Основные законы булевой алгебры

1

Коммутативность

Порядок операндов не влияет на результат:

$$x \,\&\, y \equiv y \,\&\, x$$

$$x \vee y \equiv y \vee x$$

2

Ассоциативность

Группировка операндов не влияет на результат:

$$x \,\&\, (y \,\&\, z) \equiv (x \,\&\, y) \,\&\, z$$

$$x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$$


3

Дистрибутивность

Распределение одной операции над другой:

$$x \,\&\, (y \vee z) \equiv (x \,\&\, y) \vee (x \,\&\, z)$$

$$x \vee (y \,\&\, z) \equiv (x \vee y) \,\&\, (x \vee z)$$



Доказательство дистрибутивности дизъюнкции

Рассмотрим закон: $x \vee (y \,\&\, z) \equiv (x \vee y) \,\&\, (x \vee z)$

Если **x=1**, обе части выражения становятся истинными, поскольку $1 \vee (y \,\&\, z)$ всегда истинно, и $(1 \vee y) \,\&\, (1 \vee z)$ также всегда истинно.

Это подтверждает равносильность при значении x=1, независимо от значений y и z.

Если $x = 0$, закон преобразуется к

$0 \vee (y \,\&\, z) \equiv (0 \vee y) \,\&\, (0 \vee z)$.

Что упрощается до $y \,\&\, z \equiv y \,\&\, z$.

Таким образом, при x=0 обе части равносильны одной и той же формуле, подтверждая тождественность.

Равносильные преобразования

Используя законы булевой алгебры, мы можем заменять части формул или целые формулы на равносильные им выражения. Эти преобразования называются равносильными и являются основой для манипуляций с логическими выражениями.

Основная цель равносильных преобразований — доказательство тождественности формул, приведение их к заданному виду (например, дизъюнктивной нормальной форме) и упрощение.

ⓘ Ключевой принцип: формула считается проще, если она содержит меньше букв (переменных) и меньше логических операций.

Пример 1: доказательство равносильности биимпликации

Докажем, что $x \leftrightarrow y \equiv \bar{x}\,\&\bar{y} \vee x\&y$.



Пример 2: упрощение логической формулы

Упростим формулу: $(\overline{x \vee y} \rightarrow x \vee y) \,\&\, y$


$(\overline{x \vee y} \rightarrow x \vee y) \,\&\, y$

$\equiv (\overline{x \vee y} \vee x \vee y) \,\&\, y$ (закон импликации: $A \rightarrow B \equiv \bar{A} \vee B$)

$\equiv (x \vee y \vee x \vee y) \,\&\, y$ (закон двойного отрицания: $\bar{\bar{A}} \equiv A$)

$\equiv (x \vee y) \,\&\, y$ (закон идемпотентности: $A \vee A \equiv A$)

$\equiv y$ (закон поглощения: $(A \vee B) \,\&\, B \equiv B$)



Это упрощение показывает, как можно значительно сократить логическое выражение, сохраняя при этом его логическое значение.

Пример 3: доказательство тождественной истинности

Докажем тождественную истинность формулы:
$(x \to y) \to \big((y \to z) \to (x \vee y \to z)\big)$

$$
\begin{aligned}
&(x \to y) \to \big((y \to z) \to (x \vee y \to z)\big) \\
&\equiv \overline{\bar{x} \vee y} \vee (\overline{\bar{y} \vee z} \vee \overline{x \vee y} \vee z) \\
&\equiv (\bar{\bar{x}} \,\&\, \bar{y}) \vee \big((\bar{\bar{y}} \,\&\, \bar{z}) \vee (\bar{x} \,\&\, \bar{y}) \vee z\big) \\
&\equiv (x \,\&\, \bar{y}) \vee \big((y \,\&\, \bar{z}) \vee (\bar{x} \,\&\, \bar{y}) \vee z\big) \\
&\equiv (x \,\&\, \bar{y} \vee \bar{x} \,\&\, \bar{y}) \vee (y \,\&\, \bar{z} \vee z) \\
&\equiv \bar{y} \,\&\, (x \vee \bar{x}) \vee (y \vee z) \,\&\, (\bar{z} \vee z) \\
&\equiv \bar{y} \,\&\, 1 \vee (y \vee z) \,\&\, 1 \equiv \bar{y} \vee y \vee z \\
&\equiv (\bar{y} \vee y) \vee z \\
&\equiv 1 \vee z \\
&\equiv 1
\end{aligned}
$$



Фундаментальные тождества

Основа упрощения и анализа логических выражений. Их знание критически важно для работы с логикой и множествами.

Взаимосвязь операций

Понимание того, как одни логические операции выражаются через другие, позволяет создавать эффективные логические схемы и алгоритмы.

Функциональная полнота

Существование универсальных операций, таких как Штрих Шеффера, подчеркивает элегантность и мощь алгебры логики.

- Практика: Решайте задачи на упрощение логических выражений и построение логических схем.
- Изучение: Погрузитесь в более сложные темы, такие как предикатная логика и теория алгоритмов.
- Применение: Изучите, как логика высказываний применяется в информатике, искусственном интеллекте и проектировании цифровых систем.