

Μεταθετική Άλγεβρα

Εργασία 5

Όνομ/νο: Νούλας Δημήτριος
ΑΜ: 1112201800377
email: dimitriosnoulas@gmail.com



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

Άσκηση 6.4) Έστω L, N υποπρότυπα του R -πρωτύπου M . Δείξτε ότι αν τα $M/L, M/N$ είναι της Noether (αντίστοιχα του Artin), τότε και τα $M/L \cap N, M/L + N$ είναι της Noether (αντίστοιχα του Artin).

Απόδειξη.

Έχουμε την ακριβή ακολουθία R -πρωτύπων

$$0 \longrightarrow \frac{M}{L \cap N} \longrightarrow \frac{M}{N} \oplus \frac{M}{L} \longrightarrow \frac{M}{N + L} \longrightarrow 0$$

Αν τα $M/N, M/L$ είναι R -πρότυπα της Noether (αντ. του Artin) τότε θα είναι και το ευθύ άθροισμά τους πρότυπο της Noether (αντ. του Artin) από την πρόταση 6.7. Παίρνουμε τα ζητούμενα αποτελέσματα από την πρόταση 6.6 εφόσον το κέντρο της ακολουθίας είναι της Noether (αντ. του Artin) έπεται ότι θα είναι και τα άκρα.

Αρκεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια της ακολουθίας. Οι απεικονίσεις είναι οι εξής:

$$\begin{aligned} \phi : \frac{M}{L \cap N} &\longrightarrow \frac{M}{N} \oplus \frac{M}{L} \\ m + (L \cap N) &\longmapsto (m + N, m + L) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi : \frac{M}{N} \oplus \frac{M}{L} &\longrightarrow \frac{M}{N + L} \\ (m_1 + N, m_2 + L) &\longmapsto (m_1 - m_2) + (N + L) \end{aligned}$$

Για την ϕ :

Καλά ορισμένη:

$$\begin{aligned} x + (N \cap L) = m + (N \cap L) &\implies x - m + (N \cap L) = N \cap L \implies x - m \in N \cap L \\ \implies (x - m + N, x - m + L) &= (N, L) \implies (x + N, x + L) = (m + N, m + L) \end{aligned}$$

Ομομορφισμός R -πρωτύπων:

$$\begin{aligned} \phi([m_1] + [m_2]) &= \phi([m_1 + m_2]) = (m_1 + m_2 + N, m_1 + m_2 + L) = \\ &= (m_1 + N, m_1 + L) + (m_2 + N, m_2 + L) = \phi([m_1]) + \phi([m_2]) \end{aligned}$$

$$\phi(r[m]) = \phi([rm]) = (rm + N, rm + L) = r(m + N, m + L) = r\phi([m])$$

Μονομορφισμός:

$$\begin{aligned} \phi([m]) = (N, L) &\implies (m + N, m + L) = (N, L) \implies m \in N, m \in L \\ \implies m &\in N \cap L \implies [m] = 0 \end{aligned}$$

Με εικόνα:

$$Im\phi = \{(m + N, m + L) : m \in M\}$$

Για την π έχουμε εργαστεί όμοια για να δείξουμε ότι είναι καλά ορισμένος ομομορφισμός R -προτύπων στην άσκηση 10 της εργασίας 5, με την διαφορά ότι εκεί είχαμε πεπερασμένο ευθύ γινόμενο το οποίο ταυτίζεται με το πεπερασμένο ευθύ άθροισμα. Υπενθυμίζουμε ότι είναι επιμορφισμός εφόσον για το τυχαίο $m + (N + L)$ έχουμε

$$\pi(m + N, L) = m + (N + L)$$

Μαζί με το προφανές $Im\phi \subseteq ker\pi$, έχουμε και την αντίστροφη σχέση. Αν θεωρήσουμε $(m_1 + N, m_2 + L) \in ker\pi$, τότε

$$m_1 - m_2 \in N + L \implies m_1 - m_2 = n + \ell \implies m_1 - n = m_2 + \ell$$

$$(m_1 + N, m_2 + L) = (m_1 - n + N, m_2 + \ell + L) = (m_1 - n + N, m_1 - n + L) \in Im\phi$$

□

Άσκηση 6.6) Έστω M ένα πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο του Artin. Δείξτε ότι ο δακτύλιος $R/\text{ann}(M)$ είναι του Artin.

Απόδειξη.

Το M είναι πεπερασμένα παραγόμενο, δηλαδή υπάρχουν $m_1, m_2, \dots, m_k \in R$ τέτοια ώστε

$$M = (m_1, m_2, \dots, m_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k r_i m_i : r_i \in R \right\}$$

Ορίζουμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R &\longrightarrow \bigoplus_{i=1}^k M \\ r &\longmapsto (rm_1, rm_2, \dots, rm_k) \end{aligned}$$

Είναι ομομορφισμός προτύπων εφόσον:

$$\begin{aligned} \phi(r_1 + r_2) &= ((r_1 + r_2)m_1, (r_1 + r_2)m_2, \dots, (r_1 + r_2)m_k) = \\ &= (r_1 m_1, r_1 m_2, \dots, r_1 m_k) + (r_2 m_1, r_2 m_2, \dots, r_2 m_k) = \phi(r_1) + \phi(r_2) \\ \phi(r'r) &= (r'rm_1, r'rm_2, \dots, r'rm_k) = r'(rm_1, rm_2, \dots, rm_k) = r'\phi(r) \end{aligned}$$

Επιπλέον έχουμε ότι

$$\text{ann}(M) = \{r \in R : rm = 0 \quad \forall m \in M\} = \{r \in R : rm_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k\}$$

Έτσι $\text{ann}(M) \subseteq \ker \phi$. Για την αντίστροφη σχέση, αν $r \in \ker \phi$ τότε θα ισχύει $rm_i = 0$ για όλα τα i , δηλαδή $r \in \text{ann}(M)$. Άρα $\text{ann}(M) = \ker \phi$. Από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμών προτύπων έπεται ότι

$$\frac{R}{\text{ann}(M)} \simeq \text{Im} \phi \leq \bigoplus_{i=1}^k M$$

Έχουμε την ακριβή ακολουθία R -προτύπων

$$0 \rightarrow \frac{R}{\text{ann}(M)} \simeq \text{Im} \phi \hookrightarrow \bigoplus_{i=1}^k M \rightarrow \frac{\bigoplus_{i=1}^k M}{\text{Im} \phi} \rightarrow 0$$

Εφόσον το M είναι R -πρότυπο του Artin, τότε θα είναι και το ευθύ άθροισμα των k αντιγράφων του. Το κέντρο της ακριβής ακολουθίας είναι πρότυπο του Artin άρα θα είναι και τα άκρα του.

Συγκεκριμένα το $R/\text{ann}(M)$ θα είναι R -πρότυπο του Artin. Κάνοντας την αλλαγή δακτυλίου σε R/I -πρότυπο με $I = \text{ann}(M)$ που είναι ιδεώδες του R , έχουμε από παρατήρηση που έγινε στις διαλέξεις του κεφαλαίου 6 ότι το $R/\text{ann}(M)$ θα είναι και $R/\text{ann}(M)$ -πρότυπο του Artin. Δηλαδή όπως έχει οριστεί θα είναι και δακτύλιος του Artin. \square

Άσκηση 6.7) Έστω R μη μηδενικός δακτύλιος της Noether. Δείξτε ότι υπάρχει πρώτο ιδεώδες \mathfrak{p} του R τέτοιο ώστε υπάρχει μονομορφισμός R -προτύπων της μορφής και $f : R/\mathfrak{p} \rightarrow R$.

Απόδειξη.

Θεωρούμε το σύνολο των ιδεωδών του R

$$\{ann(x) : x \in R, x \neq 0\}$$

το οποίο είναι μη κενό καθώς περιέχει το τετριμμένο ιδεώδες $(0) = ann(1)$. Εφόσον ο δακτύλιος R είναι της Noether, θα υπάρχει μέγιστο στοιχείο έστω $\mathfrak{p} = ann(x)$. Θα δείξουμε ότι είναι πρώτο ιδεώδες. Αρχικά είναι γνήσιο ιδεώδες και όχι όλο το R καθώς αν ήταν όλο το R θα ίσχυε $1 \cdot x = 0$, δηλαδή $x = 0$ το οποίο είναι άτοπο.

Έστω $ab \in \mathfrak{p}$, δηλαδή $abx = 0$. Αν $a \notin \mathfrak{p}$, τότε

$$b(ax) = 0 \implies b \in ann(ax)$$

και από τον ορισμό του μηδενιστή έχουμε την σχέση υποσυνόλων

$$\mathfrak{p} = ann(x) \subseteq ann(ax)$$

και εφόσον το \mathfrak{p} είναι μέγιστο, παίρνουμε την ισότητα $\mathfrak{p} = ann(ax) \ni b$. Όμοια, αν $b \notin \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p}$.

Έχουμε ότι ο ομομορφισμός R -προτύπων

$$\phi : R \longrightarrow R$$

$$r \longmapsto rx$$

έχει πυρήνα το \mathfrak{p} και έτσι μέσα από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμών προτύπων παίρνουμε τον ζητούμενο μονομορφισμό:

$$\frac{R}{\mathfrak{p}} \simeq Im\phi \hookrightarrow R$$

δηλαδή έχουμε ως μονομορφισμό R προτύπων την καλά ορισμένη απεικόνιση

$$r + \mathfrak{p} \mapsto rx \in R$$

□

Άσκηση 6.10) Δείξτε ότι το μήκος

- (1) του $\mathbb{R}[x]$ -προτύπου $\mathbb{R}[x]/(x^4 + 2x^2 + 1)$ είναι 2,
- (2) του $\mathbb{C}[x]$ -προτύπου $\mathbb{C}[x]/(x^4 + 2x^2 + 1)$ είναι 4, και
- (3) του $\mathbb{Z}[x]$ -προτύπου $\mathbb{Z}[x]/(x^4 + 2x^2 + 1)$ είναι ∞ .

Απόδειξη.

- (1) Αρκεί να βρούμε μια συνθετική σειρά με μήκος 2 και από την θεωρία αυτό αρκεί για να έχουν όλες μήκος 2. Έχουμε λοιπόν την συνθετική σειρά με μήκος 2:

$$0 \subseteq \frac{(x^2 + 1)}{((x^2 + 1)^2)} \subseteq \frac{\mathbb{R}[x]}{((x^2 + 1)^2)}$$

Το πηλίκο από την πρώτη σχέση υποσυνόλου είναι απλό εφόσον αν έχουμε I ιδεώδες του $(x^2 + 1)/((x^2 + 1)^2)$ τότε από το θεώρημα αντιστοιχίας ιδεωδών θα είναι της μορφής

$$I = \frac{J}{((x^2 + 1)^2)} \quad \text{με} \quad ((x^2 + 1)^2 \subseteq J \subseteq (x^2 + 1))$$

και επειδή το $\mathbb{R}[x]$ είναι περιοχή κυρίων ιδεωδών, έχουμε $J = (f(x))$ και από τις παραπάνω σχέσεις παίρνουμε

$$x^2 + 1 | f(x) \implies f(x) = (x^2 + 1)g(x) \quad (g(x), x^2 + 1) = 1$$

$$f(x) = (x^2 + 1)g(x) | (x^2 + 1)^2 \implies g(x) | (x^2 + 1)$$

και το $x^2 + 1$ είναι ανάγωγο, άρα $g(x) = \pm 1$ ή $\pm(x^2 + 1)$. Δηλαδή σε καμία περίπτωση το I δεν είναι γνήσιο ιδεώδες.

Το ιδεώδες $(x^2 + 1)$ του $\mathbb{R}[x]$ είναι μέγιστο, και το πηλίκο από την δεύτερη σχέση του υποσυνόλου είναι ισόμορφο με το $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, αν επικαλεστούμε το τρίτο θεώρημα ισομορφισμών προτύπων. Άρα από την πρόταση 6.1 έπεται ότι και αυτό το πηλίκο είναι απλό.

- (2) Έχουμε την συνθετική σειρά με μήκος 4:

$$0 \subseteq \frac{(x^2 + 1)(x - i)}{((x^2 + 1)^2)} \subseteq \frac{(x^2 + 1)}{((x^2 + 1)^2)} \subseteq \frac{(x - i)}{((x^2 + 1)^2)} \subseteq \frac{\mathbb{C}[x]}{((x^2 + 1)^2)}$$

Το πηλίκο στην τέταρτη θέση είναι απλό καθώς το $(x - i)$ είναι μέγιστο ιδεώδες του $\mathbb{C}[x]$. Για τα πηλικά στις πρώτες τρεις θέσεις δουλεύουμε όμοια με το προηγούμενο παράδειγμα χρησιμοποιώντας το τρίτο θεώρημα ισομορφισμών. Δηλαδή δείχνουμε την απλότητα στην τρίτη θέση ως εξής και όμοια στις άλλες δύο:

$$\frac{\frac{(x-i)}{((x^2+1)^2)}}{\frac{(x^2+1)}{((x^2+1)^2)}} \simeq \frac{(x-i)}{(x^2+1)}$$

που έχει ιδεώδη $\frac{J}{(x^2+1)}$ με

$$(x^2 + 1) \subseteq J \subseteq (x - i) \quad \text{και} \quad J = (g(x))$$

αφού $\mathbb{C}[x]$ είναι περιοχή κυρίων ιδεωδών. Επιπλέον $(x - i) | g(x)$ και $g(x) | (x - i)(x + i)$, δηλαδή $g(x) = \pm 1$ ή $\pm(x - i)$ και άρα δεν υπάρχουν ενδιάμεσα ιδεώδη.

(3) Έχουμε την ακριβή ακολουθία $\mathbb{Z}[x]$ -προτύπων:

$$0 \rightarrow ((x^2 + 1)^2) \rightarrow \mathbb{Z}[x] \rightarrow \frac{\mathbb{Z}[x]}{((x^2 + 1)^2)} \rightarrow 0$$

και τα άκρα θα είναι $\mathbb{Z}[x]$ -πρότυπα του Artin αν και μόνο αν το $\mathbb{Z}[x]$ είναι $\mathbb{Z}[x]$ -πρότυπο του Artin. Ισοδύναμα το $\mathbb{Z}[x]$ να είναι δακτύλιος του Artin. Αυτό δεν ισχύει καθώς

$$\frac{\mathbb{Z}[x]}{(x)} \simeq \mathbb{Z}$$

είναι περιοχή και όχι σώμα, δηλαδή το ιδεώδες (x) είναι πρώτο και όχι μέγιστο. Εφόσον σε έναν δακτύλιο του Artin τα πρώτα ιδεώδη με τα μέγιστα ταυτίζονται, το $\mathbb{Z}[x]$ δεν είναι δακτύλιος του Artin και άρα το $\mathbb{Z}[x]/((x^2 + 1)^2)$ δεν είναι $\mathbb{Z}[x]$ -πρότυπο του Artin. Συνεπώς, δεν μπορεί να έχει συνθετική σειρά και άρα το μήκος του είναι άπειρο.

□

Άσκηση 7.1) Ποιοι από τους παρακάτω δακτύλιους είναι του Artin; Ποιες είναι οι διαστάσεις Krull αυτών;

- (1) $\mathbb{C}[x, y]/(x^2, y^3)$
- (2) $\mathbb{Z}_{(2)}$ (τοπικοποίηση).
- (3) R/\mathfrak{m}^t , όπου \mathfrak{m} μέγιστο ιδεώδες δακτυλίου R της Noether.

Απόδειξη.

- (1) Έχουμε ότι ο δακτύλιος $\mathbb{C}[x, y]$ είναι της Noether από το θεώρημα βάσης του Hilbert και έτσι και το πηλίκο $\mathbb{C}[x, y]/(x^2, y^3)$ είναι της Noether. Έχουμε ότι το ιδεώδες $\mathfrak{m} = (x, y)/(x^2, y^3)$ είναι μέγιστο εφόσον

$$\frac{\mathbb{C}[x, y]/(x^2, y^3)}{(x, y)/(x^2, y^3)} \simeq \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x, y)} \simeq \mathbb{C}$$

από το τρίτο θεώρημα ισομορφισμών δακτυλίων.

Επιπλέον, $\mathfrak{m}^5 = 0$ αφού οι γεννήτορες του \mathfrak{m}^5 θα είναι τα στοιχεία $x^a y^b + (x^2, y^3)$ με $a + b = 5$, δηλαδή $x^a y^b \in (x^2, y^3)$ αφού θα ισχύει τουλάχιστον ένα από τα $a \geq 2$ ή $b \geq 3$.

Καθώς ο δακτύλιος είναι της Noether και υπάρχουν μέγιστα ιδεώδη που το γινόμενο τους κάνει 0, έχουμε ότι ο δακτύλιος είναι του Artin. Έτσι και η διάσταση Krull του είναι 0.

- (2) Αν θεωρήσουμε $R = \mathbb{Z}$ και $S = \mathbb{Z} - (2)$, τότε ο δακτύλιός μας είναι ο $S^{-1}R$. Γνωρίζουμε από την θεωρία ότι για τον φυσικό ομομορφισμό $x \mapsto \frac{x}{1} \in S^{-1}R$ οι συστολές και οι επεκτάσεις είναι σε 1-1 και επί αντιστοιχία. Επιπλέον, τα πρώτα ιδεώδη του $S^{-1}R$ είναι της μορφής P^e για μοναδικό πρώτο ιδεώδες P του R με $P \cap S = \emptyset$.

Έτσι, ο δακτύλιος $S^{-1}R$ που έχει μοναδικό μέγιστο ιδεώδες

$$\mathfrak{m} = \left\{ \frac{2a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, \quad 2 \nmid b \right\}$$

έχει και τα πρώτα ιδεώδη $(3)^e, (5)^e, (7)^e, \dots$ τα οποία δεν είναι μέγιστα και άρα ο δακτύλιος δεν είναι του Artin.

Έχουμε

$$0 = (0)^e \subseteq (3)^e$$

η οποία είναι γνήσια σχέση και άρα $\dim(S^{-1}R) \geq 1$. Αν τώρα υποθέσουμε ότι υπάρχει γνήσια αλυσίδα πρώτων ιδεωδών με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του 2 τότε μέσα από τις συστολές θα την απεικονίζουμε σε γνήσια αλυσίδα πρώτων ιδεωδών του \mathbb{Z} με ίδιο μήκος. Αυτό είναι άτοπο καθώς αυτές οι αλυσίδες στο \mathbb{Z} έχουν το πολύ μήκος 1. Άρα $\dim(S^{-1}R) = 1$.

- (3) Όμοια με το (1), ο R είναι δακτύλιος της Noether και άρα το ίδιο ισχύει για το πηλίκο R/\mathfrak{m}^t . Αν θέσουμε

$$\overline{\mathfrak{m}} = \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^t}$$

τότε το $\overline{\mathfrak{m}}$ είναι μέγιστο από το τρίτο θεώρημα ισομορφισμών καθώς

$$\frac{R/\mathfrak{m}^t}{\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^t} \simeq \frac{R}{\mathfrak{m}} \quad \text{που είναι σώμα αφού } \mathfrak{m} \text{ μέγιστο}$$

επιπλέον έχουμε $(\overline{\mathfrak{m}})^t = 0$ και άρα ο δακτύλιος είναι του Artin εφόσον είναι της Noether και υπάρχουν μέγιστα ιδεώδη που έχουν γινόμενο 0. Άρα και η διάσταση Krull είναι 0.

□

Άσκηση 7.2) Δείξτε ότι κάθε γνήσιο ιδεώδες τοπικού δακτυλίου του Artin είναι πρωταρχικό.

Απόδειξη.

Έχουμε δείξει σε προηγούμενη εργασία ότι αν το ριζικό ενός ιδεωδούς \sqrt{I} είναι μέγιστο, τότε το ιδεώδες είναι πρωταρχικό. Έχουμε ότι ο δακτύλιος που έχει την ιδιότητα Artin έχει και την ιδιότητα Noether και άρα κάθε γνήσιο ιδεώδες I έχει πρωταρχική ανάλυση από το θεώρημα Lasker-Noether. Θεωρούμε μια πρωταρχική ανάλυση

$$I = Q_1 \cap Q_2 \cap \dots \cap Q_k$$

με $\sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}_i$ πρώτο ιδεώδες. Εφόσον ο δακτύλιος είναι του Artin, κάθε πρώτο ιδεώδες είναι μέγιστο. Άρα έχουμε για κάθε $i = 1, 2, \dots, k$ ότι $\sqrt{Q_i} = \mathfrak{m}$ και \mathfrak{m} είναι το μοναδικό μέγιστο ιδεώδες του δακτυλίου.

$$\sqrt{I} = \sqrt{Q_1 \cap Q_2 \cap \dots \cap Q_k} = \sqrt{Q_1} \cap \sqrt{Q_2} \cap \dots \cap \sqrt{Q_k} = \mathfrak{m} \text{ μέγιστο} \implies I \text{ πρωταρχικό}$$

□

Άσκηση 7.6) Έστω R δακτύλιος του Artin. Δείξτε ότι ως R -πρότυπο, το R έχει πεπερασμένο μήκος. Στη συνέχεια δείξτε ότι κάθε πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο έχει πεπερασμένο μήκος.

Απόδειξη.

Ο R ως δακτύλιος του Artin είναι και δακτύλιος της Noether. Ως δακτύλιος του Artin είναι και R -πρότυπο του Artin και ως δακτύλιος της Noether είναι και R -πρότυπο της Noether. Από αυτά τα δύο έπεται ότι το R ως πρότυπο υπεράνω του εαυτού του έχει συνθετική σειρά και άρα το μήκος του είναι πεπερασμένο.

Έστω $M = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ένα πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο. Αν θεωρήσουμε τον επιμορφισμό R -προτύπων

$$\phi : \bigoplus_{i=1}^n R \longrightarrow M$$

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) \longmapsto r_1 x_1 + r_2 x_2 + \dots + r_n x_n$$

έτσι από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμών προτύπων έχουμε ότι το M είναι ισόμορφο με πηλίκο του $\bigoplus_{i=1}^n R$. Αυτό είναι R -πρότυπο της Noether και του Artin αφού είναι η κάθε συνιστώσα του.

Άρα και το οποιοδήποτε πηλίκο του παραμένει R -πρότυπο της Noether και R -πρότυπο του Artin. Αυτό προκύπτει αν πάρουμε ακριβείς ακολουθίες με κέντρο το Artin (αντ. Noether) R -πρότυπο και βάλουμε αριστερά την εμφύτευση του υποπροτύπου και δεξιά την προβολή στο πηλίκο. Επιχειρηματολογώντας διαφορετικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αντιστοιχία των υποπροτύπων ενός προτύπου πηλίκου στις αύξουσες και φθίνουσες αλυσίδες. Έτσι έχουμε ότι το M είναι R -πρότυπο της Noether και του Artin, άρα έχει συνθετική σειρά και έτσι πεπερασμένο μήκος. \square

Άσκηση 7.7) Έστω R δακτύλιος της Noether και I γνήσιο ιδεώδες του R . Δείξτε ότι το R -πρότυπο R/I έχει πεπερασμένο μήκος αν και μόνο αν το σύνολο $\text{Ass}I$ αποτελείται από μέγιστα ιδεώδη.

Απόδειξη.

Εφόσον το I είναι γνήσιο και ο R δακτύλιος της Noether, από το θεώρημα Lasker-Noether έχουμε την ύπαρξη μιας ελάχιστης πρωταρχικής ανάλυσης. Έστω

$$I = Q_1 \cap Q_2 \cap \dots \cap Q_n$$

και $\text{Ass}I = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$.

Αν υποθέσουμε ότι $\ell_R(R/I) = n < \infty$, δηλαδή θα υπάρχει συνθετική σειρά με μήκος n (άρα κάθε συνθετική σειρά θα έχει μήκος n) έχουμε ότι το R/I είναι R -πρότυπο του Artin και της Noether. Ισοδύναμα, το R/I είναι R/I -πρότυπο του Artin και της Noether. Δηλαδή το R/I είναι δακτύλιος του Artin και της Noether. Το ότι είναι και δακτύλιος της Noether το είχαμε και ως πηλίκο του R . Μας χρειάζεται ότι το R/I είναι δακτύλιος του Artin και άρα κάθε πρώτο του ιδεώδες είναι και μέγιστο.

Έστω $p_i \in \text{Ass}I$, το p_i είναι πρώτο ιδεώδες του R και περιέχει το I . Άρα το p_i/I είναι πρώτο ιδεώδες του R/I εφόσον το R/p_i είναι περιοχή και έχουμε τον ισομορφισμό δακτυλίων

$$\frac{R/I}{p_i/I} \simeq R/p_i$$

Ωστόσο το p_i/I θα είναι και μέγιστο ως πρώτο ιδεώδες του R/I , δηλαδή ο παραπάνω ισομορφισμός είναι μεταξύ σωμάτων και έτσι το p_i είναι και αυτό μέγιστο.

Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι κάθε $p_i \in \text{Ass}I$ είναι μέγιστο. Επειδή ο R είναι δακτύλιος της Noether θα είναι και το πηλίκο R/I . Για να δείξουμε ότι $\ell_R(R/I)$ με βάση τον προηγούμενο συλλογισμό με την αλλαγή δακτυλίου και την ύπαρξη συνθετικής σειράς, αρκεί να δείξουμε ότι ο R/I είναι δακτύλιος του Artin. Έχουμε

$$p_1 p_2 \cdots p_n \subseteq p_1 \cap p_2 \cap \dots \cap p_n = \sqrt{I}$$

και το \sqrt{I} είναι πεπερασμένο παραγόμενο αφού βρισκόμαστε σε δακτύλιο της Noether. Αν είναι $a_j, j = 1, 2, \dots, k$ οι γεννήτορες του \sqrt{I} , τότε θα υπάρχουν m_j τέτοια ώστε $a_j^{m_j} \in I$. Συνεπώς, για μεγάλο N (π.χ. $N = k \cdot \max\{m_1, m_2, \dots, m_k\}$) θα έχουμε ότι $(\sqrt{I})^N \subseteq I$.

Όμοια με την πρώτη κατεύθυνση, εφόσον τα p_i είναι μέγιστα ιδεώδη του R θα είναι και τα p_i/I μέγιστα ιδεώδη του R/I . Έχουμε ότι

$$\frac{p_1^N}{I} \cdot \frac{p_2^N}{I} \cdots \frac{p_n^N}{I} = \frac{(p_1 p_2 \cdots p_n)^N}{I} \subseteq \frac{(\sqrt{I})^N}{I} \subseteq \frac{I}{I} = 0$$

άρα ο R/I ως δακτύλιος είναι της Noether και έχει μηδενικό γινόμενο μεγίστων ιδεωδών. Από αυτό έπεται ότι είναι δακτύλιος του Artin. \square