



Шановні лікарі та медсестри!

В Україні високий ризик спалаху кору. Нещеплені діти та дорослі у небезпеці.
Ви можете допомогти вберегти їх від важкої хвороби!

ПОЯСНІТЬ БАТЬКАМ НЕБЕЗПЕКУ КОРУ:

- ✓ Кір небезпечний для всіх невакцинованих дітей і дорослих. Захворювання може призвести до пневмонії, запалення мозку (енцефаліту), інших серйозних ускладнень, навіть до інвалідності та смерті. З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, в 1 розвивається енцефаліт, а 50 отримують важкі ускладнення.
- ✓ Кір — надзвичайно заразний та швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. З 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим, 9 захворіють.
- ✓ Специфічних ліків проти кору не існує. Але кору можна ефективно запобігти — зробити щеплення!

Наголошуйте на простоті та безпеці вакцинації порівняно з лікуванням хвороби та її ускладненнями: "Вакцинація — це безпечно та швидко. Важко — лікувати хворобу та її ускладнення". Вакцина проти кору є в Україні.

ГОВОРІТЬ ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ.

- ✓ В Україні застосовуються бельгійська вакцина "Пріорикс" та американська вакцина "М-М-Р II" — обидві безпечні, ефективні та якісні.
- ✓ Ці вакцини взаємозамінні. Можна отримати першу дозу однієї вакцини, а другу — вакцини, яка є в наявності.
- ✓ Обидві вакцини захищають від трьох інфекцій — кору, епідпаротиту ("свинки") та краснухи.

Завжди чесно обговорюйте реакції, які можуть бути спричинені вакцинами: незначне почервоніння та біль у місці ін'єкції, температура, головний біль — це можливі реакції на щеплення. Ці симптоми зазвичай минають самі без будь-яких наслідків для здоров'я.

Детально опишіть можливі реакції (це не означає, що у дитини будуть усі або деякі з них). Це рідкісні реакції, але можливі:

- біль, набряк або почервоніння в місці уколу протягом першої-другої доби;
- підвищення температури на 7-й-10-й день з тривалістю 2-3 дні, але не раніше від 4 доби після вакцинації (у 2-5 дітей зі 100 щеплених);
- головний біль, дратівливість, порушення сну, збільшення лімфатичних вузлів (можуть спостерігатися у період між 4-м та 10-м днем);
- висипання (на 7-10-у добу);
- кашель, нежить, набряк (між 6-ю та 15-ю добою);
- біль у м'язах та суглобах (на 4-10-у добу).

Поясніть, як потрібно діяти у разі високої температури (прийняти парацетамол чи ібупрофен), як батьки можуть зв'язатися з вами, якщо їх щось непокоїть.





Щоб наголосити, настільки рідко можуть траплятися серйозні реакції, наведіть приклади зі своєї практики: наприклад, розкажіть, якщо за час своєї роботи ви не бачили серйозних реакцій на щеплення.

Поясніть, що хронічні захворювання НЕ є протипоказаннями до вакцинації: діти, які мають бронхіальну астму, цукровий діабет, муковісцидоз, онкологічні, неврологічні (наприклад, епілепсію), серцево-судинні чи інші хронічні захворювання, насамперед потребують щеплення, адже ризик важкого перебігу кору і розвитку серйозних ускладнень через хворобу в них значно вищий.

РОЗКАЖІТЬ, ЯКІ Є ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ КОРУ:

- гостре захворювання з температурою вище за 38°C;
- анафілактична реакція на попередню дозу вакцини КПК;
- вагітність;
- важкі захворювання, які сильно ослаблюють імунітет людини;
- під час хіміотерапії в онкологічних хворих;
- при вживанні великих доз стероїдних гормонів;
- при вживанні ліків, що значно пригнічують імунітет (наприклад, цитостатичні препарати);
- при важких імунодефіцитних станах;
- при введенні препаратів крові.

Наголосіть, що після гострих захворювань щеплення можна робити одразу після одужання. Так само після операції: не потрібно чекати, наприклад, місяць — щеплення можна робити, щойно дитина почне почуватися добре після хірургічного втручання (але варто врахувати факт введення препаратів крові під час оперативного втручання).

Не слід відмовлятися від вакцинації живою вакциною і перед плановим оперативним втручанням: якщо дитина почувається добре, відкладати щеплення КПК немає причин.

До вакцинації не потрібно готуватися, здавати аналізи крові чи сечі.

ЩОДО ДЕЯКИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ПОВ'ЯЗКУЮТЬ ЧАСТО З ВАКЦИНОЮ КПК

Коровий енцефаліт та підгострий склерозуючий паненцефаліт (ПСПЕ) — одне з грізних ускладнень, спричинене вірусом кору "дикого" типу. Ці патології є рідкісними як ускладнення кору, але загрожують життю. Якщо коровий енцефаліт розвивається під час гострої фази захворювання, то ПСПЕ є віддаленим наслідком перенесеного кору, що зазвичай розвивається через 5-10 років. Але є випадки, коли ПСПЕ розвивався через кілька місяців й навіть років. У групі ризику — діти першого року життя, які захворіли на кір. Захворювання на сьогодні не має ефективного лікування, має 100% летальність. Наразі відсутні підтвердження, що вірус, який є у складі вакцини, може викликати ПСПЕ. У тих випадках, коли ПСПЕ розвинувся у вакцинованих, з мозкової тканини виділявся саме вірус кору "дикого" типу. Проведена вакцинація трактувалася як неефективна у цих випадках.

Деякі батьки можуть хвилюватися, що вакцина КПК викликає аутизм. Ознаки аутизму зазвичай з'являються приблизно в той самий час, коли дітям рекомендують отримати перше щеплення проти кору, епідпаротиту, краснухи (комбінованою вакциною КПК). На сьогодні результати численних досліджень та висновки експертів однозначні — вакцина КПК не є причиною збільшення кількості дітей з аутизмом, не призводить до розвитку аутизму. Обвинувачення щодо зв'язку щеплення КПК та розвитком аутизму у вакцинованих, які були висунуті раніше Ендрю Вейкфілдом, спростовані. Дії Ендрю Вейкфілда були трактовані Генеральною медичною радою Британії як шахрайство, а трибунал при Генеральній медичній раді Великої Британії визнав Вейкфілда винним за 36 пунктами обвинувачення, включаючи звинувачення в нечесності та жорстокості щодо дітей з особливими потребами. Ендрю Вейкфілд був позбавлений медичної акредитації у Британії.