

ВАКЦИНА ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ
Листок-вкладиш: інструкція з медичного застосування

Термін придатності

Термін придатності складає 36 місяців.

Особливі застереження під час зберігання

Вакцину необхідно зберігати при температурі від 2 до 8°C. Не заморозувати.

Після відкриття багатодозового флакон (що містить 5 доз) зберігати при температурі від 2 до 8°C і використати протягом 28 днів.

Пакування

Вакцина розповсюджується у флаконі (гідролітичне скло типу 1), що закривається гумовою пробкою (без латексу) та алюмінієвим відкидним ковпачком, і містить 0,5 мл вакцини (однодозовий флакон) або 2,5 мл вакцини (багатодозовий флакон).


Особливі вказівки щодо використання та утилізації

Спеціальних вимог немає.

Флаконний термоіндикатор (за наявності):

Флаконний термоіндикатор (ФТІ) представлений на флаконі у вигляді кольорової точки. Це точка, чутлива до температури та часу, що вказує на сукупний тепловий вплив, здійснений на флакон. ФТІ попереджає кінцевого користувача, коли вплив тепла, ймовірно, призведе до погіршення ефективності та якості вакцини до неприйнятного рівня.

Інтерпретація ФТІ нескладна. Слід подивитися на квадрат по центру. Його колір буде поступово змінюватися. Вакцину можна використовувати, якщо колір цього квадрата світліший за колір кола. Щойно колір квадрата збігається з кольором кола або стає темнішим, флакон слід утилізувати.



Оригінал	Переклад
Use	Можна використовувати
Square is lighter than outer circle	Колір квадрату світліший за колір зовнішнього кола.
The color of the inner circle of the VVM begins with a shade that is lighter than the outer circle and continues to darken with time and/or exposure to heat.	Колір внутрішньої частини ФТІ починається з відтінку, який є світлішим за колір зовнішнього кола, він продовжує темніти з часом та/або під дією тепла.
Do not use	Не можна використовувати
Square matches circle	Колір квадрату такий самий, як і колір зовнішнього кола
Square is darker than circle	Колір квадрату темніший за колір зовнішнього кола
Discard point	Точка утилізації
Once a vaccine has reached or exceeded this discard point, the color of the inner circle will be the same color or darker than the outer circle.	Після того, як вакцина досягне або перевищить точку утилізації, колір внутрішньої частини буде таким самим або темнішим за колір зовнішнього кола.
Inform your supervisor	Проінформуйте свого керівника
Cumulative heat exposure over time	Сукупний вплив тепла з часом

ВЛАСНИК ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОДАЖ

Bilthoven Biologicals B.V. (Білтовен Біолоджикалз Б.В.)
Адреса: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9-13 3721 MA Bilthoven
The Netherlands (Нідерланди)
Телефон: +31 (0)30 8004800

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОДАЖ

Вакцина проти поліомієліту ліцензована в Нідерландах під номером RVG 17642
Багатодозова вакцина проти поліомієліту ліцензована в Нідерландах під номером RVG 114720

ДАНІ ВИДАЧІ ПЕРШОЇ ЛІЦЕНЗІЇ АБО ПОНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Перша ліцензія на одноразову вакцину видана 2 грудня 1993 року, поновлення ліцензії: 25 серпня 1994 року
Перша ліцензія на багатодозову вакцину (5 доз) видана 12 листопада 2014 року

РЕДАКЦІЯ

Редакція листка-вкладиша ВООЗ від серпня 2020 року

НАЗВА

Вакцина проти поліомієліту, суспензія для ін'єкцій

СКЛАД

Одна доза (0,5 мл) вакцини проти поліомієліту містить наступні активні компоненти:

Інактивовані вірус поліомієліту типу 1 (Mahoney)*	40 одиниць D-антигену
Інактивовані вірус поліомієліту типу 2 (MEF 1)*	8 одиниць D-антигену
Інактивовані вірус поліомієліту типу 3 (Saukett)*	32 одиниць D-антигену

Перелік допоміжних речовин див. у розділі фармацевтичних даних.

*) Культивовані в культурі клітин Vero.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СКЛАД

Суспензія для ін'єкцій. Препарат представлений у вигляді суспензії інактивованого та очищеного формальдегідом вірусу в одноразовому або багатодозовому (5 доз) флаконі. Колір вакцини варіює від оранжево-жовтого до оранжево-червоного.

КЛІНІЧНІ ДАНІ

Терапевтичні показання

Активна імунізація проти поліомієліту.

Спосіб застосування та дози

Одна доза становить 0,5 мл як для дітей, так і для дорослих. Вакцину вводять підшкірно або внутрішньом'язово. Перша серія імунізації складається з трьох щеплень, які проводяться з мінімальним інтервалом у 4 тижні. Немовлята повинні отримати першу серію протягом перших 6 місяців життя. Після завершення першої серії імунізації бустерну дозу можна вводити не менше ніж через шість місяців. Якщо місцеві органи влади рекомендують графік вакцинації, який починається у віці від 2 місяців, та/або якщо інтервал між дозами становить менше 8 тижнів, бустерну дозу слід вводити не раніше ніж у 9 місяців. Цю вакцину необхідно використовувати відповідно до чинних національних рекомендацій та згідно з рекомендаціями ВООЗ. Особам, які повністю імунізовані проти поліомієліту та виїжджають до районів з високим рівнем захворюваності на поліомієліт, рекомендується повторна вакцинація однією дозою вакцини проти поліомієліту приблизно за 1 місяць до від'їзду, особливо якщо остання вакцинація відбувалася понад 15 років тому.

Протипоказання

Загальні протипоказання, що застосовуються до кожної вакцини:

- Попередня тяжка реакція після щеплення цією ж вакциною.
- Відомо гіперчутливість до одного або кількох компонентів вакцини.
- Не вводити, якщо вакцинований страждає від тяжкої інфекції, що супроводжується лихоманкою.

Запобіжні заходи перед введенням вакцини

Колір вакцини може варіювати від оранжево-жовтого до оранжево-червоного. Не можна використовувати вакцину з яскраво жовтим або фіолетовим забарвленням. Не вводити, якщо вакцинований страждає від тяжкої інфекції, що супроводжується лихоманкою. Діти старшого віку і дорослі після щеплення можуть знепритомніти. Зазвичай це відбувається незабаром після щеплення і може виникнути одночасно з нудотою та блювотою. Якщо під час попередніх щеплень виникала непритомність або спостерігалися симптоми, що вказують на непритомність, людину слід вакцинувати в положенні сидячи або лежачи. За жодних обставин не вводити вакцину проти поліомієліту внутрішньосудинно. Як і під час вакцинації будь-якою вакциною, необхідно забезпечити адекватне лікування на випадок, якщо після вакцинації виникне анафілактична реакція. За потреби можна зробити ін'єкції епінефрину або кортикостероїдів у дозі відповідно до віку та/або маси тіла. Особи, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), як безсимптомні, так і ті, в яких є симптоми, повинні бути імунізовані інактивованою вакциною проти поліомієліту згідно зі стандартними графіками. Якщо вакцина проти поліомієліту вводиться особам з імунодефіцитом або тим, хто проходить будь-який тип імуносупресивної терапії, очікувана імунна відповідь може не відбутися. Потенційний ризик розвитку апное та необхідність респіраторного моніторингу протягом 48-72 годин слід враховувати при проведенні першої серії імунізації для дуже недоношених немовлят (народжені на ≤ 28 тижні вагітності), особливо з незрілою дихальною системою в анамнезі. Оскільки користь від вакцинації є високою для цієї групи немовлят, не слід відкладати вакцинацію.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодії

Вакцину проти поліомієліту можна вводити одночасно з іншими вакцинами в різні місця введення.

Вагітність та грудне вигодовування

Дані щодо великої кількості вакцинованих вагітних вказують на відсутність негативного впливу вакцини проти поліомієліту на вагітність або здоров'я плода/новонародженої дитини. Однак вакцину проти поліомієліту слід застосовувати під час вагітності лише за наявності явного ризику інфікування. Вакцину проти поліомієліту можна використовувати в період грудного вигодовування.

Вплив на навички водіння або здатності керувати механізмами

Малоймовірно, що вакцина проти поліомієліту впливає на навички водіння або керування механізмами.

Несприятливі реакції

На підставі постмаркетингової інформації (добровільне повідомлення) було встановлено, що можливі наступні несприятливі реакції. Несприятливі події після імунізації вакциною проти поліомієліту, про які повідомляли, здебільшого виникали протягом перших трьох днів після вакцинації та мали тимчасовий характер.

Загальні розлади та реакції:

Місцеві реакції:

Рідко (>1/10 000, <1/1 000): Набряк, почервоніння та біль у місці введення вакцини.

Системні реакції:

Рідко (>1/10 000, <1/1 000): Лихоманка, дискомфорт.

Неврологічні розлади:

Дуже рідко (< 1/10.000): (Полі-) нейропатія.

Дихальні, торакальні та середостінні розлади:

Апное дуже недоношених немовлят (народжені на ≤ 28 тижні вагітності).

Передозування

Про випадки передозування не повідомлялося.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Фармакодинамічні аспекти

Фармакотерапевтична група: Вірусні вакцини, код АТХ: J07BF03.

У тварин (мавп або шурів) введення вакцини призводить до утворення нейтралізуючих антитіл.

Введення вакцини у людини призводить до утворення антитіл та імунологічної пам'яті. Введення другої дози вакцини призводить до вторинної відповіді, що характеризується швидким підвищенням рівня антитіл, що вказує на наявність імунологічної пам'яті.

Загалом рівень антитіл є показником захисту. Для поліомієліту титр (реципрокне розведення в аналізі нейтралізації) ≥ 8 є захисним. Проходження повної серії імунізації вакциною проти поліомієліту, як правило, забезпечує захисні титри проти поліомієліту типу 1, 2 і 3.

Відсоток серопротекції в загальній популяції Нідерландів вивчався в 1995-1996 pp. (Immunity to Poliomyelitis in the Netherlands, Am.J.Epid., 2001:153,3). Протягом десяти років, що передували цьому дослідженню, рівень вакцинації в рамках первинної імунізації комбінованою вакциною для профілактики дифтерії, правця, кашлюка та поліомієліту (DTP-IPV) (3 дози з інтервалом через 3, 4 і 5 місяців) національної програми імунізації Нідерландів становив 97%. Вік обстежених коливався від 1 до 79 років. Рівень серопротекції може залежати від моменту забору зразків крові після вакцинації, який не був, як у більшості клінічних досліджень, через 1 місяць після вакцинації. Інтервал забору зразків крові після вакцинації змінювався залежно від віку людини.

Крім того, слід зазначити, що дані отримані як після використання звичайної вакцини проти поліомієліту, так і після використання комбінованої вакцини з компонентом проти поліомієліту. Відсоток серопротекції, виміряний у цьому дослідженні, наведено в наступній таблиці.

	серопротекція	95% довірчий інтервал
Поліомієліт типу 1	96,6 %	95,9 – 97,2 %
Поліомієліт типу 2	93,4 %	92,3 – 94,5 %
Поліомієліт типу 3	89,7 %	88,3 – 91,0 %

Фармакокінетика

Не застосовується для вакцин.

Доклінічні дослідження безпеки

Доклінічні дослідження не демонструють особливого ризику для людини. Ці результати отримані в рамках звичайних досліджень в області фармакологічної безпеки та токсикології при повторному введенні.

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ДАНІ**Перелік допоміжних речовин**

Формальдегід (12,5 мкг) (E240), 2-феноксіетанол (2,5 мг), середовище 199, яке в основному складається з амінокислот, мінералів і вітамінів (0,1 мл), динатрію гідрофосфату дегідрат (E339), калію хлорид (E508), натрію хлорид, дигідрофосфат калію (E340), полісорбат 80 (E433), кальцію хлорид (E509), феноловий червоний та вода для ін'єкцій.

Випадки несумісності

Не застосовується.

Пробний макет		
УВАГА! Нам потрібне погодження макету, перш ніж ми зможемо розпочати виробництво. Будь ласка, розбірливо заповніть цю форму.		
Дата:	24.08.2020	Макет № 2
№ замовлення:	388406	
Код продукту:	200459 IPV 1d-5d ENG WHO	
Артикул «Dobber Healthcare Leaflets BV.»: S00636		
Розмір:	168 x 160 мм	DOBBER HEALTHCARE LEAFLETS Dobber Healthcare Leaflets BV Адреса: Westerwerf 13 1911 JA Uitgeest Телефон: +31 (0)251 31 19 50 E-mail: info@dobberpharma.com www.dobberhealthcare.com
У складеному стані:	83(+2) x 20 мм	
Колір(и) друку		
Лицьова сторона:	Чорний/PMS 186	
Зворотна сторона:	Чорний	
Квадрат (перехід):	-	
Оптичний код:	-	
Фармацевтичний код:	200459	
Шрифт:	The Sans	
Розмір шрифту:	6 pt	
Міжрядковий інтервал:	8 pt	
Заповнюється клієнтом		
Погоджено: ☐ TAK ☐ NI		Kwaliteit Duurzaamheid ISO 9001 ISO 14001
Дата:		
Ім'я та підпис:		
(Ця форма належить SOP "Werkzaamheden DTP-Studio").		