

ЕМПОКС (англ. МРОХ) оголошено надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC) — рекомендації для Європейського регіону ВООЗ

КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ ВООЗ

15 серпня 2024 р

ЧОМУ БУЛА ОГОЛОШЕНА PHEIC?

- 14 серпня трох¹, відома раніше як віспа мавп (monkey pox), удруге за два роки була оголошена надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC), після нещодавніх спалахів у кількох країнах Африки.
- Із початку року Демократична Республіка Конго (ДРК) повідомила про понад 14 000 випадків захворювання і понад 500 смертей серед дорослих і дітей (штами clade² Ia та Ib).
- Збільшення кількості повідомлень про випадки трох зумовлюється двома пов'язаними спалахами:
 1. Спалахами в історично ендемічних частинах ДРК, які вражають переважно дітей;
 2. Швидко поширюваним спалахом захворювання, спричиненого новим штамом трох clade I, який отримав назву clade Ib; цей штам передається переважно статевим шляхом через мережі спільних сексуальних контактів, географічно поширюючись у східних провінціях ДРК, а тепер вже і в сусідніх країнах. В Уганді, Кенії, Руанді та Бурунді зафіксовано перші за весь час випадки трох.
- **Сьогодні³ Швеція стала першою країною за межами Африки, яка підтвердила випадок захворювання на трох, спричинене вірусом clade Ib, у людини, яка подорожувала до Центральної Африки.** Шведській системі охорони здоров'я вдалося виявити випадок, і людина вже отримує необхідне лікування.
- Враховуючи взаємозв'язки в сучасному світі, новий(-і) штам(-и) трох може(-уть) поширюватися в Європейському регіоні ВООЗ, якщо не буде вжито термінових запобіжних заходів.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Європейське регіональне бюро (ЄРБ) ВООЗ активно співпрацює з органами влади у сфері охорони здоров'я Швеції, щоб забезпечити максимально ефективне ведення першого підтвердженого випадку трох clade Ib, а також надає рекомендації державам-членам щодо подальших дій.
- Підтвердження випадку трох clade I, у Швеції унаочнює наявність глобальних взаємозв'язків і необхідності партнерства та солідарності у життєво важливих питаннях громадського здоров'я. Ми дякуємо Швеції за швидке, відкрите та прозоре реагування, що є прикладом для всіх країн. Ми закликаємо інші держави-члени діяти подібним чином у разі виявлення нових випадків трох clade I.
- Найімовірніше, протягом найближчих днів і тижнів у Європейському регіоні ВООЗ з'являться нові завезені випадки трох clade I, тому вкрай важливо запобігати стигматизації мандрівників або країн / регіонів. Тільки працюючи разом, обмінюючись даними та вживаючи необхідних заходів у сфері громадського здоров'я, ми зможемо контролювати поширення цього вірусу. Обмеження на подорожі та закриття кордонів не є ефективними і їх слід уникати.
- У Європейському регіоні ВООЗ уже зафіксовано спалах трох, здебільшого серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками (ЧСЧ) (щомісяця реєструють приблизно 100 нових випадків трох clade II).
- Найкращою стратегією боротьби з трох у Європейському регіоні ВООЗ є дотримання чинних Постійних рекомендацій ВООЗ, виданих минулого року ([посилання](#)).
- Штаб-квартира ВООЗ випустить нові / оновлені Постійні рекомендації після повторного оголошення PHEIC (наразі не опубліковані).
- Наступні завезені випадки трох clade I до Європи можуть відрізнятися від випадків clade II, що відображатиме епідемічну ситуацію в Африці, де інфікуються люди усіх вікових груп.

ЕПІДНАГЛЯД

¹ (укр.) емпокс

² (укр.) клад

³ 15 серпня 2024 року

- Вірус трох clade II вже деякий час циркулює в Європейському регіоні ВООЗ, насамперед у спільноті ЧСЧ, а також серед медичних працівників і секс-працівників. Загалом цей штам спричиняє захворювання з менш тяжким перебігом, ніж clade I. Відомо, що він передається статевим шляхом або через контакт «шкіра до шкіри».
- Нові дані свідчать про те, що clade I може передаватися як статевим, так і *не*-статевим шляхом, зокрема при побутових контактах (можливо, через одяг, постільну білизну та посуд), а також у закладах охорони здоров'я.
- Під час спалаху в Європейському регіоні ВООЗ у 2022 р., під час якого вірус поширювався переважно серед ЧСЧ, епіднадгляд здебільшого здійснювався через мережі та клініки охорони сексуального здоров'я. Можливо, його необхідно буде розширити, якщо випадки інфікування clade I будуть підтверджені в різних групах ризику.
- Виявлення трох може ускладнюватися через те, що часто маргіналізовані групи (спільноти іммігрантів або ЧСЧ) можуть неохоче звертатися по медичну допомогу чи вакцинацію, щоб уникнути стигматизації та дискримінації.
- Якщо випадки захворювання, спричинені clade I, будуть підтверджені в Європейському регіоні ВООЗ, епіднадгляд необхідно буде розширити, щоб охопити більші та різноманітніші групи населення, включно з жінками і дітьми, особливо серед населення африканської діаспори та інших людей, які подорожували до постраждалих країн.
- ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі.

ВАКЦИНАЦІЯ

- Існує дві вакцини проти трох, схвалені національними регуляторними органами, включеними до списку ВООЗ, і рекомендовані Стратегічною консультативною групою експертів з імунізації ВООЗ (SAGE). Це вакцини:
 - MVA-BN виробництва «Bavaria Nordic»;
 - LC16 виробництва «KM Biologics».
- Із них лише вакцина MVA-BN ліцензована Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА). Наразі постачання цих вакцин у Європейському регіоні ВООЗ обмежене і, можливо, потребуватиме розширення.
- Немає спеціальної вакцини проти трох clade I. Очікується, що наявні вакцини проти натуральної віспи, які використовують для профілактики трох, будуть такими ж ефективними проти нього, як і проти трох clade II.
- Якщо вам робили щеплення проти натуральної віспи в дитинстві, воно певною мірою захищатиме від трох.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ ВООЗ

- Забезпечте у країні лабораторні спроможності діагностувати трох і секвенувати для визначення clade.
- Розгляньте доцільність попередження фахівців у сфері охорони сексуального здоров'я та лікарів загальної практики, які можуть надавати послуги в громадах, пов'язаних із постраждалими африканськими країнами, про можливі випадки захворювання у мандрівників.
- Забезпечте систему охорони здоров'я вакцинами проти трох і противірусними препаратами для людей і громад, які можуть піддатися ризику, а також для постраждалих людей і громад; організуйте їх справедливий розподіл серед усіх груп, які можуть піддатися ризику; при цьому демонструйте солідарність із країнами Африки, у яких тривають спалахи.
- Продовжуйте тісно взаємодіяти зі спільнотами, для яких існує ризик, зокрема чоловіками, які практикують секс із чоловіками, і секс-працівниками, щоб покращити розуміння ризику та сприяти застосуванню запобіжних заходів. Розширте інформаційно-просвітницьку роботу, щоб охопити діаспору з країн, у яких циркулює трох, і мандрівників, які подорожують до таких країн.
- Переконайтеся, що комунікація та втручання здійснюються без стигматизації та з повагою, є інклюзивними та запобігають посиленню впливу негативних стереотипів і дискримінації.
- Забезпечте своєчасний і прозорий обмін даними про всі підозрювані випадки захворювання відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП).
- Забезпечте тверду політичну прихильність на найвищому рівні, необхідну для серйозного сприйняття ептрот. У жодному разі не можна дозволити трох циркулювати в Європейському регіоні ВООЗ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

- Рекомендації у сфері громадського здоров'я, надані у зв'язку з поточною циркуляцією clade II в Європейському регіоні ВООЗ, значною мірою залишаються незмінними. Виявлення тרוх clade Ib, у мандрівника в Швеції без доказів подальшого поширення не є підставою для зміни рекомендацій у сфері громадського здоров'я на цьому етапі.
- тרוх може передаватися через прямий контакт із інфікованою людиною. На сьогодні статевий контакт є основним шляхом передавання серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками, та секс-працівників.
- Основні заходи з профілактики інфікування, як і раніше, включають:
 - вибір менш ризикованої сексуальної поведінки;
 - обмеження кількості сексуальних партнерів;
 - дотримання правил гігієни рук.
- Зробіть щеплення проти тרוх, якщо маєте таку можливість. При цьому ВООЗ не рекомендує вакцинуватися проти тרוх людям, які не належать до груп ризику і не отримували щеплення проти тרוх після початку спалаху в 2022 р. Люди, які перенесли тרוх clade II, або були вакциновані проти тרוх, повинні бути захищені від тяжкого перебігу тרוх clade I.
- Наразі тרוх clade I циркулює в кількох країнах Африки, зокрема в ДРК, Бурунді, Руанді, Уганді, Південній Африці та Кенії. Люди, які подорожують до цих країн, повинні ознайомитися з рекомендаціями щодо подорожей і вживати запобіжних заходів, наприклад, уникати близького контакту з людьми, у яких є висип, схожий на той, що виникає при трох.
- У разі появи симптомів важливо своєчасно ізолюватися, сповістити близьких контактних осіб і звернутися по медичну допомогу.