

Результати епідеміологічного нагляду за гострими в'ялими паралічами та поліомієлітом в 2024 році

З метою посилення епідеміологічного нагляду за гострими в'ялими паралічами (далі – ГВП) та поліомієлітому в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської області, затверджено «План заходів щодо попередження захворювання на поліомієліт». В Івано-Франківській області на момент узагальнення інформації план перебував на розгляді Департаменту охорони здоров'я.

Крім того, в усіх регіонах, за винятком Луганської області, наявні чинні накази затверджені Департаментами охорони здоров'я адміністративно-територіальних одиниць «Про визначення закладів охорони здоров'я для госпіталізації дітей з підозрою на ГВП», що гарантують належну організацію медичної допомоги та спостереження.

У 2024 році в Україні закладами охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) активно виявлено 162 випадки ГВП у 23 регіонах, з яких у 13 зареєстровано 18 «гарячих» випадків ГВП (по 3 випадки у Львівській та Харківській областях, по 2 у Чернігівській, Рівненській областях, по 1 випадку у Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській, Хмельницькій, Житомирській областях та м. Києві) (Рисунк 1).




Рис.1 Реєстрація випадків ГВП, в т.ч. «гарячих» випадків ГВП в розрізі регіонів України

Динаміка виявлення випадків ГВП в Україні в період з 2018 по 2024 роки демонструє поступове зростання після спаду в 2020 році, що, ймовірно, було пов'язано з пандемією COVID-19. Зростання показника на 100 тис. дитячого населення (з 1,2 у 2020 році до 2,65 у 2024 році) є позитивним індикатором ефективності моніторингу, що дозволяє швидко виявляти випадки та оцінювати ризики циркуляції поліовірусу. Ця тенденція підтверджує важливість підтримання високого рівня контролю для запобігання потенційним спалахам (Рисунок 2).




Рис. 2 Динаміка показників виявлення випадків ГВП в Україні, 2018-2024 роки

Виконання індикаторів якості епідеміологічного нагляду за ГВП та порівняння з 2022-2023 роками наведено в таблиці:

Індикатор епіднагляду	Цільовий показник	Роки		
		2022	2023	2024
Чутливість (ключовий показник)	≥ 3	1,9	2,52	2,65
Своєчасність реєстрації випадку (7 днів від початку паралічів)	$\geq 80\%$	98	98	98
Своєчасність проведення розслідування випадку, % (48 годин)	$\geq 80\%$	100	100	100
Своєчасність повторного клінічного обстеження, % (з 60 до 70 дня від початку паралічів)	$\geq 80\%$	100	100	100
Своєчасність відбору зразків фекалій	$\geq 80\%$	98,4	97,7	91,3
Адекватність відбору зразків фекалій (ключовий показник)	$\geq 80\%$	100	99,4	95,5

Показник виявлення випадків ГВП в Україні у 2024 році становив 2,65 при цільовому – 3,0 на 100 тис. дітей віком до 15 років. Цільовий показник ≥ 3 випадків ГВП на 100 000 дітей у віці до 15 років був досягнутий у 13 областях України (у 2023 році в 11 областях). Найвищий показник зареєстрований у Сумській (5,28), Миколаївській (4,85), Житомирській (4,72), Рівненській (4,36) та Чернігівській (3,99) областях. У 5 областях України він склав – 2 і більше. Найнижчий показник виявлення випадків ГВП відмічався у Донецькій (0,72), Полтавській (1,06), Черкаській (1,27), Закарпатській (1,65) та Івано-Франківській (1,78) областях. У 2 регіонах країни (Луганська та Херсонська області) не було зареєстровано жодного випадку ГВП (Рисунок 3).




Рис.3 Показник повідомлених випадків ГВП на 100 тис. осіб до 15 років, Україна, 2024 рік

Епідеміологічне розслідування усіх зареєстрованих випадків ГВП проводилось своєчасно та розпочиналося не пізніше 48 годин після первинної реєстрації випадку. Індикатор своєчасності реєстрації випадку склав 98% випадків ГВП, зареєстрованих протягом 7 днів з моменту виникнення паралічу. Індикаторний показник своєчасності розслідування становив 100%.

Із 18 зареєстрованих «гарячих» випадків ГВП у 12 дітей відсутні взагалі щеплення проти поліомієліту, 4 дітей отримали 2 щеплення та 2 дітей мають лише 1 щеплення. Із 162 зареєстрованих випадків ГВП 88,8% дітей були щеплені 3 дозами вакцини, 2,5% - 2 дозами, 1,2% - 1 дозою та 7,5% не мали жодного щеплення (Рисунки 4, 5).



Рис. 4 Розподіл випадків ГВП за вакцинальним статусом, Україна, 2024 рік




Рис. 5 Розподіл випадків ГВП за вакцинальним статусом та віком, Україна, 2024 рік

Система активного епідеміологічного нагляду за поліомієлітом та ГВП охоплює всі регіони України та здійснюється шляхом регулярних моніторингових візитів до ЗОЗ, в тому числі визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою на ГВП/поліомієліт, та аналіз звітів щодо ГВП, з метою ретроспективного пошуку таких випадків. На території України визначено 61 ЗОЗ для госпіталізації дітей з підозрою на ГВП. За 2024 рік було здійснено 7052 візити у 398 ЗОЗ України, під час цих візитів виявлено 27 потенційних випадків ГВП. За рік було зареєстровано 39 випадків захворювання дітей на синдром Гієна-Барє. У всіх випадках було здійснено відбір проб фекалій для подальшого лабораторного дослідження та отримано негативні результати (Рисунок 6).




Рис. 6 Реєстрація синдрому Гієна-Барре серед дітей в розрізі регіонів України, 2024 рік

На території України в 2024 році було зареєстровано 153 випадки захворювання на гострий моно-, пара- та тетрапарез. У 151 хворого результати обстеження на поліовіруси негативні. При вірусологічному дослідженні проб фекалій на культурах клітин, що рекомендовані ВООЗ і проведенні внутрішньотипової диференціації, отримано 1 позитивний результат у 2-х пробах щодо вакцинного поліовірусу типу 3 та один позитивний результат на НПЕВ-ентеровірус (неполіомієлітний етеровірус) (Рисунок 7).




Рис. 7 Кількість дітей з гострими в'ялим моно-, пара- і тетрапарезами в розрізі регіонів України, 2024 рік

У 2024 році всього зареєстровано 272 випадки захворювання дітей на неврит лицьового нерву. У 61 відібраному для тестування зразку результат

обстеження на поліовіруси негативний, у 211 зразках дослідження на поліовіруси не проводилося у зв'язку з ефективними лікувальними заходами (Рисунок 8).




Рис. 8 Кількість дітей з невритом лицьового нерва в розрізі регіонів України, 2024 рік

В надісланих інформаціях від регіонів зазначається про проведення нарад, онлайн-нарад з медичними працівниками ЗОЗ, з представниками освіти та місцевими органами влади, на яких обговорювалися питання щодо стану епіднагляду за поліомієлітом/ГВП. В регіонах проводилися селекторні наради з керівниками відокремлених підрозділів ЦКПХ з питань епіднагляду за ГВП, збору зразків біологічного матеріалу від осіб з ГВП, контактних осіб та їх доставки до вірусологічної лабораторії.

У 2024 році проводилося навчання медичних працівників з ключових аспектів імунопрофілактики, епідеміологічного нагляду за поліомієлітом та ГВП, клінічної діагностики, протиепідемічних заходів і реагування на надзвичайні ситуації. Особливу увагу приділено збору та транспортуванню біоматеріалу, лабораторній діагностиці, критеріям визначення «гарячого» випадку поліомієліту та алгоритму дій медичних працівників.

Навчальними заходами було охоплено 15489 медичних працівників ЗОЗ, з них 705 епідеміологів, 546 неврологів, 176 дитячих неврологів, 199 дитячих інфекціоністів, 1877 педіатрів та 12021 інших фахівців.

Область	Кількість проведених навчальних заходів	Кількість фахівців, які пройшли навчання	З них:					
			Епідеміологів	Неврологів	Дитячих неврологів	Дитячих інфекціоністів	Педіатрів	Інших фахівців
Вінницька	6	289	60	0	0	8	47	174
Волинська	21	250	11	15	5	8	77	127
Дніпропетровська	122	2813	29	65	25	45	137	2512
Донецька	22	494	18	9	6	6	56	399

Житомирська	47	295	39	11	7	7	63	168
Закарпатська	8	166	20	0	0	0	12	146
Запорізька	15	436	8	6	6	8	75	333
Івано-Франківська	42	187	6	26	4	4	88	59
Київська	41	472	13	30	6	8	38	377
Кіровоградська	78	2763	12	19	5	13	192	2535
Луганська	1	120	2	1	1	2	28	86
Львівська	48	475	110	7	10	15	98	235
м. Київ	9	100	5	12	11	11	25	47
Миколаївська	37	269	5	1	1	0	0	263
Одеська	1	212	65	19	13	8	86	21
Полтавська	3	152	8	25	5	3	42	74
Рівненська	53	902	32	40	12	3	64	751
Сумська	10	565	42	130	13	7	159	214
Тернопільська	12	48	16	4	2	4	12	10
Харківська	153	1761	11	22	20	12	272	1424
Херсонська	9	164	9	3	2	3	38	109
Хмельницька	2	95	15	12	8	9	23	28
Черкаська	2	221	94	3	1	5	38	80
Чернівецька	9	95	57	4	4	4	4	22
Чернігівська	82	2145	18	82	9	6	203	1827
Всього по Україні	833	15489	705	546	176	199	1877	12021

Стан охоплення щепленнями проти поліомієліту.

Аналіз даних моніторингу основних показників імунопрофілактики проведено на підставі отриманих від регіонів аналітичних таблиць обліково-звітних форм планування і виконання профілактичних щеплень «Укрвак-08», без урахування даних з тимчасово окупованих територій (АР Крим, м. Севастополь, Луганської області та частини районів Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської областей).

Впродовж 2024 року через міграційні процеси, які впливали на зміну як кількості осіб, що підлягають щепленням, в розрізі регіонів та районів України, так і на кількість вакцинованих осіб, виникали обставини, які не дають змоги достовірно визначити чисельність вікових груп населення та застосовувати офіційні статистичні дані Державної служби статистики (станом на 2021 рік) для планування відповідних заходів з організації імунопрофілактики.

На сьогодні, достовірно оцінити охоплення щепленнями населення не є можливим.

Проте, попри нестабільну безпекову ситуацію на території України, численні ракетні обстріли та значні пошкодження інфраструктури, які призводили до нестабільного електропостачання, здійснення національної програми імунізації із забезпечення вакцинації населення не переривалося.

Слід зазначити, що очікуваними результатами реалізації [Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб](#),

яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 № 562-р, є, серед іншого, забезпечення стабільно високого рівня охоплення вакцинацією трьома дозами вакцини проти дифтерії, правця, кашлюка та поліомієліту, досягнення стабільно високого рівня охоплення вакцинацією проти кору, паротиту та краснухи на рівні **не менш як 95 відсотків** цільової групи населення; забезпечення охоплення вакцинацією **не менш як 80 відсотків** цільових груп населення за віком, які пропустили планову імунізацію у попередні роки проти поліомієліту, дифтерії, правця, кору, краснухи та епідемічного паротиту, шляхом здійснення додаткових заходів з імунопрофілактики; охоплення ревакцинацією проти дифтерії та правця **не менш як 80 відсотків** дорослого населення.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (далі-Наказ) затверджено Календар профілактичних щеплень в Україні (далі -Календар), яким визначено перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення, в тому числі й проти поліомієліту.

Відповідно до Календаря, щеплення проти поліомієліту проводяться у віці 2 та 4 місяців інактивованою поліомієлітною вакциною, у 6, 18 місяців, 6 та 14 років – оральною поліомієлітною вакциною.

Щомісячно всі заклади охорони здоров'я, які є надавачами послуг з імунізації та отримують імунобіологічні препарати, в тому числі приватні медичні заклади і фізичні особи підприємці, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, звітують про охоплення щепленнями.

Рівні імунізації населення згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні проти поліомієліту, відповідно до даних надавачів медичних послуг з імунопрофілактики (бази даних УкрВак-08), у 2024 році наведені в таблиці:

Найменування області / міста	Поліо-3 (до року)	Поліо-4 (18 міс.)	Поліо-5 (6 р.)	Поліо-6 (14 р.)
	%	%	%	%
Вінницька	91,5	91,7	85,3	75,7
Волинська	88,8	88,5	89,2	90,3
Дніпропетровська	91,8	89,7	92,2	88,8
Донецька	92,1	93,0	99,1	97,3
Житомирська	92,5	95,5	87,7	83,7
Закарпатська	84,1	79,9	75,4	69,5
Запорізька	91,6	93,5	98,2	97,0
Ів.-Франківська	85,6	81,7	70,2	65,2
Київська	83,5	86,4	83,0	81,1
Кіровоградська	98,1	93,3	98,3	93,9

Львівська	75,0	74,9	57,6	51,3
Миколаївська	93,9	92,9	94,0	96,1
Одеська	74,2	71,0	69,3	66,8
Полтавська	90,5	90,9	87,7	89,9
Рівненська	94,3	93,9	96,6	93,7
Сумська	91,2	91,8	90,3	88,7
Тернопільська	94,3	93,5	94,3	88,9
Харківська	84,0	87,5	94,5	90,8
Херсонська	99,3	99,8	100,0	98,0
Хмельницька	93,8	87,4	79,6	74,8
Черкаська	90,9	92,3	86,0	85,1
Чернівецька	78,1	80,2	75,9	67,7
Чернігівська	96,0	95,6	96,7	94,3
м.Київ	96,4	97,2	93,8	93,7
Україна	87,8	87,3	83,6	80,8

Рівні охоплення щепленнями проти поліомієліту оцінювались відповідно до визначених у регіонах обсягів профілактичних щеплень на 2024 рік, та наданих до Центру за підписами керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров'я військової адміністрації та керівника регіонального центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

По Україні, у жодній з вікових груп не досягнуто показника охоплення щепленнями проти поліомієліту, відповідно до Календаря - 95%, що є недостатніми для забезпечення епідемічного благополуччя в країні.

Не досягнуто показника 80% охоплення щепленнями проти поліомієліту у всіх вікових групах у Львівській та Одеській областях, що викликає занепокоєння та може спричинити ризики для погіршення епідемічної ситуації у країні.

Серед дітей до року, трьома дозами проти поліомієліту в країні щеплено 87,8% від запланованих на щеплення дітей (Рисунок 9).

Реєструються низькі показники у Одеській (74,2%), Львівській (75%), Чернівецькій (78,1%), Київській (83,5%), Харківській (84%), Закарпатській (84,1%), Івано-Франківській (85,6%) областях.

Слід зазначити, що щеплення отримані дітьми протягом першого року життя є важливим для формування імунітету.




Рис. 9 Охоплення щепленнями проти поліомієліту у 2024 році серед дітей віком до року в розрізі регіонів України

Четверту дозу щеплення проти поліомієліту, у віці 18 місяців, отримали 87,3% запланованих на щеплення у 2024 році дітей (Рисунок 10).

Низькі показники реєструються у Одеській (71%), Львівській (74,9%), Закарпатській (79,9%), Чернівецькій (80,2%), Івано-Франківській (81,7%), Київській (86,4%) областях.




Рис. 10 Охоплення щепленнями проти поліомієліту у 2024 році серед дітей у віці 18 місяців в розрізі регіонів України

У 6 років, п'ятою дозою проти поліомієліту охоплено 83,6% дітей (Рисунок 11).

Наднизькі показники реєструються у Львівській (57,6%), Одеській (69,3%), Івано-Франківській (70,2%), Закарпатській (75,4%), Чернівецькій (75,9%), Хмельницькій (79,6%), Київській (83%) областях.




Рис. 11 Охоплення щепленнями проти поліомієліту у 2024 році серед дітей у віці 6 років в розрізі регіонів України

Показник охоплення щепленнями проти поліомієліту шостою дозою серед дітей у віці 14 років складає 80,8% (Рисунок 12).

Відмічаються наднизькі показники у Львівській (51,3%), Івано-Франківській (65,2%), Одеській (66,8%), Чернівецькій (67,7%), Закарпатській (69,5%), Хмельницькій (74,8%), Вінницькій (75,7%) областях.




Рис. 12 Охоплення щепленнями проти поліомієліту у 2024 році серед дітей у віці 14 років в розрізі регіонів України

Діти, які не отримали щеплення відповідно до віку дощеплюються з порушенням Календаря профілактичних щеплень в Україні, з дотриманням мінімальних інтервалів між дозами.

Так, у 2024 році проти поліомієліту дощеплено 209 302 дитини, які не отримали щеплення за віком, що складає 68,5% від запланованих на

щеплення у 2024 році. Зокрема, серед дітей у віці 1 рік і старші трьома дозами (поліо-3) щеплено 50 020 дітей (65%); старші 2 років отримали чотири дози (поліо-4) 50 061 дитина (74,5%); старші 6 років п'ятою дозою (поліо-5) щеплено 64 418 дітей (73,6%); старші 14 років шостою дозою (поліо-6) щеплено 44 803 дитини (60,7%).

Найбільш активно дощеплювалися у Донецькій, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській областях та у м. Києві.

Низькі показники доохоплення щепленнями проти поліомієліту спостерігались в Івано-Франківській, Житомирській, Львівській, Чернігівській, Чернівецькій, Одеській, Хмельницькій, Черкаській областях.

	Поліо - 3 (1 р і старші)	Поліо - 4 (ст 2 років)	Поліо- 5 (ст 6 років)	Поліо- 6 (ст 14 років)
Найменування області/міста	%	%	%	%
Вінницька	73,0	88,4	88,6	85,3
Волинська	85,4	72,8	87,5	67,7
Дніпропетровська	71,5	87,9	99,2	88,3
Донецька	98,2	98,5	96,2	96,3
Житомирська	46,1	68,9	54,4	34,8
Закарпатська	75,1	81,2	92,1	59,9
Запорізька	82,1	85,8	87,0	90,9
Ів.-Франківська	47,3	35,5	42,7	28,6
Київська	78,0	74,3	73,9	68,3
Кіровоградська	86,5	92,8	89,6	98,4
Львівська	56,4	68,6	61,5	29,9
Миколаївська	92,3	88,9	99,7	87,5
Одеська	53,2	78,2	55,7	56,9
Полтавська	80,9	85,1	85,3	80,8
Рівненська	73,2	80,7	95,9	67,8
Сумська	72,0	93,1	92,7	91,5
Тернопільська	94,8	95,7	94,5	91,7
Харківська	66,6	83,3	84,6	80,6
Херсонська	81,5	65,4	88,5	79,6
Хмельницька	53,2	70,9	74,5	49,7
Черкаська	60,6	75,9	70,9	64,5
Чернівецька	69,6	71,1	54,9	38,5
Чернігівська	44,3	64,7	65,7	47,4
м.Київ	94,5	78,4	92,8	92,5
Україна	65,0	74,5	73,6	60,7

У 2024 році найбільше дощеплювались діти у віці 6 років і старші, отримуючи п'яту дозу щеплення проти поліомієліту, найменше – діти у віці 1 рік і старші.

З віком кількість не щеплених дітей зменшується за рахунок доохоплення їх щепленнями у старших вікових групах.

За інформацією центрів контролю та профілактики хвороб зареєстровано 32 192 випадки відмов від вакцинації. Найбільша кількість відмов від вакцинації реєструється у Львівській (12 365), Дніпропетровській (4 255), Тернопільській (3 050), Київській (2 747), Одеській (1 958), Рівненській (1588), Житомирській (1533), Чернівецькій (1207) областях.

Випадків не проведення щеплень за наявності обґрунтованості медичних протипоказань найбільше реєструється у Дніпропетровській (533), Полтавській (332), Львівській (327), Київській (301), Івано-Франківській (291), Харківській (265) областях.

Для забезпечення проведення профілактики інфекцій, включених до Календаря профілактичних щеплень в Україні, ЗОЗ забезпечуються медичними імунобіологічними препаратами, відповідно до потреб здійснюється їх поповнення.

З метою підвищення рівня охоплення дитячого населення профілактичними щепленнями в ЗОЗ постійно проводилась роз'яснювальна робота серед населення про важливість проведення імунопрофілактики та небезпеки переривання імунізації, зокрема роз'яснення ризиків поширення інфекційних хвороб, яким можливо запобігти шляхом проведення імунопрофілактики. В регіонах організовувались виїзні заходи до громад, які віддалені від районних центрів. Постійно через засоби масової інформації відбувалися виступи на телебаченні, радіо, опублікування на офіційних сторінках в мережі Інтернет, поширюється актуальна інформація з питань імунопрофілактики.

Впродовж року за допомогою електронної розсилки поширювались скрипти для лікарів з метою комунікації з батьками, які відмовляються вакцинувати дітей. В центрах первинної медико – санітарної допомоги для відвідувачів транслуються відеоролики з питань вакцинації. На офіційних сайтах та /або на інформаційних стендах закладів охорони здоров'я розміщуються матеріали (плакати, повідомлення, листівки) щодо попередження виникнення інфекційних хвороб та необхідності проведення профілактичних щеплень.

Також, для лікарів первинної медичної допомоги, працівників центрів контролю та профілактики хвороб протягом року проводилися навчання та кураторська підтримка за підтримки міжнародних партнерів.

Аналіз результатів лабораторних досліджень щодо поліовірусу та ГВП.

У 2024 році дослідження зразків фекалій від хворих на ГВП та контактних з ними проводили у референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру та Одеської регіональної лабораторії, що акредитовані в лабораторній мережі з діагностики поліомієліту Європейського Регіонального Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі – ЄРБ ВООЗ).

Від 162 випадків ГВП досліджено 323 зразки фекалій та 519 зразків від контактних осіб. Зі зразків хворих на ГВП ізолювано: 5 (1,55 %) штамів поліовірусу типу 3 (Івано-Франківська область - 1, Запорізька область – 2, Одеська область - 2), ентеровірус типу ЕСНО 11 – 2 (0,62 %) штамп (Вінницька область). Від 1 контактного з хворими на ГВП із Тернопольської області виділено 1 (0,19 %) штамп поліовірусу типу 3.

У своїй роботі при ізоляції поліо/ентеровірусів референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру, Одеська регіональна лабораторія та вірусологічні лабораторії центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України застосовують алгоритм, рекомендований ВООЗ із використанням перещеплюваних ліній культур клітин L20В та RD.

У звітному році з метою моніторингу циркуляції поліо/ентеровірусів серед здорових, хворих, включаючи епідеміологічний нагляд за ГВП/поліомієлітом та контактними, обстежено 3726 осіб, від яких ізолювали 21 (0,56 %) штамів вірусів, у т.ч. 14 (0,37 %) штамів поліовірусів, 7 (0,19 %) штамів неpolіомієлітних ентеровірусів. Проведено лабораторне обстеження **462 хворих із нейроінфекціями**, зокрема 105 осіб із серозними менінгітами, від яких ізолювано 1 штамп (0,95 %) ентеровірусу групи ЕСНО 11.

При обстеженні **643 хворих із гострими кишковими інфекціями** позитивні результати щодо поліовірусу типу 3 одержані у 2-х випадках (0,31 %).

При дослідженні **386 проб від хворих на ГРВІ** позитивних проб не виявлено.

З профілактичною метою обстежено **1557 здорових осіб**. Позитивні результати виявлення вірусів одержані у 10 випадках (0,64 %), у т.ч. поліовірус типу 1 – 5 (0,32 %); типу 3 – 1 (0,06 %); нетиповані ентеровіруси - 4 (0,26 %).

При дослідженні **2455 проб господарсько-побутових стічних вод** ізолювано 82 штами вірусів (3,34 %): 78 ентеровірусів (3,18%), у т.ч. 21 штамп поліовірусів типу 1, 24 штами поліовірусів типу 3, 10 штамів вірусів групи ЕСНО-11, 1 штамп вірусу групи ЕСНО-25, 22 штами нетипованих ентеровірусів, а також 4 (0,16 %) штами аденовірусів.

При дослідженні **572 проб води відкритих водоймищ** ізольовано 2 (0,35 %) штамів вірусів, у т.ч. по 1 штам (0,18 %) штаму поліовірусу типу 1 та 1 (0,17 %) штам аденовірусу.

Отже, при проведенні моніторингу циркуляції поліо- та інших ентеровірусів виділено 60 штамів поліовірусів:

- 5 - від випадків ГВП,
- 1 – від контактного з ГВП,
- 2 – від хворих з гострими кишковими інфекціями,
- 6 – від здорових осіб,
- 45 – із проб стічної води,
- 1 – із проб води відкритих водоймищ.

Із 60 штамів поліовірусів ідентифіковано як поліовіруси типу 1 - 27, а типу 3 – 33 штамів.

Всі ізольовані штами пройшли ідентифікацію та внутрішньотипову диференціацію у референс-лабораторії ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру з підтвердженням у РРЛ ВООЗ (Хельсінкі, Фінляндія) і віднесені до вакцинних. Таким чином, у звітному періоді, «диких» поліовірусів в Україні не виявлено.

Резюме.

Попри активні зусилля з моніторингу, цільовий показник виявлення (3,0 на 100 тис. дітей до 15 років) не було досягнуто, і він склав 2,65 на 100 тис. дітей. У низці регіонів, зокрема в Сумській (5,28), Миколаївській (4,85), Житомирській (4,72), Рівненській (4,36) та Чернігівській (3,99) областях, показники значно перевищили цільові, що може свідчити про посилення якості активного епідеміологічного нагляду. Водночас, низькі рівні виявлення в Донецькій (0,72), Полтавській (1,06), Черкаській (1,27), Закарпатській (1,65) та Івано-Франківській (1,78) областях потребують додаткового аналізу щодо ефективності епіднагляду та можливого недообліку випадків.

Загалом, результати епідеміологічного нагляду демонструють позитивну динаміку у вдосконаленні системи виявлення випадків ГВП, однак існують регіональні диспропорції, які потребують подальшого аналізу та посилення заходів. Пріоритетом на 2025 рік залишається підвищення якості активного епіднагляду, особливо у регіонах з низькими показниками виявлення, а також зміцнення лабораторної діагностики та подальше навчання медичних працівників для забезпечення оперативного реагування на потенційні загрози поліомієліту.

У 2024 році, по Україні, у жодній з вікових груп не досягнуто показника охоплення щепленнями проти поліомієліту, відповідно до Календаря - 95%, що є недостатніми для забезпечення епідемічного благополуччя в країні.

Враховуючи низькі показники охоплення щепленнями проти поліомієліту та велику кількість відмов, в тому числі з наявними медичними протипоказаннями до вакцинації, необхідно

керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) обласних державних адміністрацій провести аналіз встановлених медичних протипоказів до вакцинації, наявності обґрунтованих підстав, відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.10.2019 № 2070 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень» у розрізі надавачів медичних послуг та лікарів. За результатами проведеного аналізу провести наради з керівниками закладів охорони здоров'я, організувати та провести навчання для працівників, які надають первинну медико-санітарну допомогу та спеціалізовану медичну допомогу з питань обґрунтованості встановлення медичних протипоказань, залучивши профільних експертів.

керівникам центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України постійно проводити моніторинг стану охоплення профілактичними щепленнями та стану забезпеченості закладами охорони здоров'я, що проводять вакцинацію, імунобіологічними препаратами, здійснювати своєчасне їх поповнення, інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення та проводити навчання для медичних працівників.