

Патологогістологічне дослідження № 14255

Заклад	КНП "Золочівська центральна районна лікарня", хір	Клінічні дані
ПІБ пацієнта	Гендзьора Дмитро Степанович	Дата отримання матеріалу 11.06.2025
Вік	1961 р.н.	Біопсія <u>первинна</u> , вторинна (підкреслити)
Стать	Чол.	При вторинній біопсії вказати номер і дату первинної
Телефон замовника		Біопсія діагностична
Лікуючий лікар	Задорожний	Дата і вид операції 06.06.2025 Біопсія простати
Клінічний діагноз	Са простати	

Дані про патологогістологічне дослідження

Маркування матеріалу, кількість об'єктів	Біоптат простати
Нумерація гістологічних блоків	54826-54829
Кількість блоків	4
Метод забарвлення	Гематоксилін/еозин
Макро і -мікроскопічний опис	В матеріалі біоптати тканини простати з нерівномірними скупченнями ацинусів різного розміру обмежених строю, з формуванням нодулярних структур. Частина ацинусів розташовані тісно з вузькими прошарками строми, в поодиноких нодулярних структурах ацинуси з нерівномірно вираженими прошарками строми. Ацинарний епітелій в дрібноацинарних структурах низький або сплюснений з округлими ядрами. Частина ядер гіперхромні, частина з дрібнодисперсним хроматином, ядра орієнтовані базально. Базальний шар в більшості ацинусів відсутній. В стромі вогнищева нерівномірно виражена лімфогістіоцитарна інфільтрація. Наявні нодулі з атрофією ацинусів, які мають вигляд епітеліальних тяжів з вузьким просвітом, згладженою поверхнею; перифокально зон атрофії ділянки проліферації дрібних ацинусів. Ділянки периневральної інвазії.
Патологогістологічний висновок (діагноз)	В матеріалі біоптати тканини простати з нерівномірними скупченнями ацинусів різного розміру обмежених строю, з формуванням нодулярних структур. Частина ацинусів розташовані тісно з вузькими прошарками строми, в поодиноких нодулярних структурах ацинуси з нерівномірно вираженими прошарками строми. Ацинарний епітелій в дрібноацинарних структурах низький або сплюснений з округлими ядрами. Частина ядер гіперхромні, частина з дрібнодисперсним хроматином, ядра орієнтовані базально. Базальний шар в більшості ацинусів відсутній. В стромі вогнищева нерівномірно виражена лімфогістіоцитарна інфільтрація. Наявні нодулі з атрофією ацинусів, які мають вигляд епітеліальних тяжів з вузьким просвітом, згладженою поверхнею; перифокально зон атрофії ділянки проліферації дрібних ацинусів. Ділянки периневральної інвазії.
Категорія складності	IV Категорія складності
Архівування вологого матеріалу	ні

Лікар-патологоанатом:

Міщенко К. С.
+380681475411

Лаборант:



Кальчун О. Б.

Лікар-патологоанатом:

Дем'янчук Д. М.
+380991579886Завідувач
гістологічної
лабораторії:Міщенко К.С.
+380681475411

Дата виконання: 13.06.2025

ФСУ - 7.4.010

Редакція 1 від 06.01.2025

Сторінки 1 з 1